



Stadium	Fungizide (l, kg/ha)	Insektizide, Akarizide, Ernährung (l, kg/ha)	Ergänzungen (l, kg/ha)	Bemerkungen
Austrieb	Schorf Kocide 2000 2,0–4,0 kg oder Bordeaux S 4,0–8,0 kg oder Oxykupfer 35 2,0 kg Cupric Flow 4,0–8,0 l Atollan 0,8 kg oder Venturex 1,2 l	Austernschildläuse / Frostspanner / Rote Spinne Napfschildläuse / Gallmilben Zofal D 56,0 l (Stadium B–C) oder Zofal R 30,0–40,0 l (Stadium B–C) Blütenstecher Gazelle SG 0,32 kg oder Elvis 0,32 l	Zofal D : Rote Spinne 32 l (Stad. D) Zofal D : Rote Spinne 16 l (Stad. E) Atollan : Nicht mit Zofal D mischen. Nach der Blüte: Max. 4,85 kg / ha / Jahr Kocide 2000, Oxykupfer 35, Bordeaux S Max. 1,5 kg Reinkupfer / ha / Jahr	
Vorblüte	Schorf: Vorbeugende Wirkung Atollan 0,8 kg oder Venturex 1,2 l Echter Mehltau Cyflamid 0,5 l oder Sufralo 3,2 kg oder Tofa 0,21 l Slick 0,24 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg	Frostspanner Elvis 0,32 l oder Wormox 0,8 kg Schalenwickler Elvis 0,32 l oder Wormox 1,0 kg Sicid Neem (Mehlige Blattlaus) 1,5 l Läuse Gazelle SG 0,24 kg oder Pirimor 0,64 kg Oleate 20 5–15 l/ha (Blattläuse, Spinnmilben) Rote Spinne Nissostar 0,32 l Ernährung: Goëmar Start / Goëmar Multi 2,0 l Naturamin WSP 1,0 kg Feuerbrand (Teilwirkung) Vacciplant 0,75 l Alternanzbrechung Dartilon 0,3 l	Kocide 2000 : Vor der Blüte 1–2 kg Bordeaux S : Vor der Blüte 2–4 kg Oxykupfer 35 : Vor der Blüte 2 kg Cupric Flow : Vor der Blüte 2–4 l Fruchtwanzen Elvis 0,32 l Sufralo : Max. 5 kg / Behandlung Nebenwirkung Rostmilben Naturamin WSP : Prävention Frost Vacciplant : Ab Grünknospen Stadium mit jeder Behandlung. Dartilon : Alternanzbrechung 0,3 l/ha (nicht bei Golden)	
Blüte	Schorf: Vorbeugende Wirkung Atollan 0,8 kg oder Captan S WG 2,4 kg Schorf / Kelchfäule (Teilwirkung) Folpet 80 WDG 2,0 kg Echter Mehltau Tofa 0,21 l Schorf / Mehltau Tofa 0,21 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg Ausdünnen Armicarb 10–20 kg	Goëmar Start / Goëmar Multi 2,0 l Naturamin WSP 1,0 kg Apfelwickler (Verwirrung) CheckMate Dispenser CM-XL oder CheckMate Puffer CM Apfelwickler, Schalenwickler (Verwirrung) CheckMate Puffer Leaf Multi Apfelwickler, Kl. Frucht- & Pfirsichwickler (Verw.) CheckMate Puffer Fruit Multi Feuerbrand (Teilwirkung) Vacciplant 0,75 l Ab Blüte Teilwirkung Schorf, Echter Mehltau Vacciplant 1,0 l Novagib 0,5 l	Goëmar Start : Algenfiltrat mit Bor, Mg, Mo, SO ₃ Goëmar Multi : Algenfiltrat mit Bor Ab Ballonstadium bis abgehende Blüte Goëmar Produkte: Verhindert Blattfall CheckMate CM / Leaf Multi / Fruit Multi Kontakt mit Stähler Aussendienst! Montage : Vorblüte GreenOn Plus : Mehrenährstoffdünger mit Mg 1–3× 0,5 kg/ha Novagib : Vorbeugend gegen Fruchtberostung auf Äpfel (Solobehandlung: 4–5× Jahr)	
Nachblüte	Schorf: Vorbeugende Wirkung Atollan 0,8 kg oder Folpet 80 WDG 2,0 kg oder Captan S WG 2,4 kg oder Venturex 1,2 l Echter Mehltau Cyflamid 0,5 l oder Sufralo 2,0 kg Schorf: TW, Echter Mehltau Armicarb 3–4,8 kg/ha + Sufralo 3,2 kg/ha Schorf / Mehltau Tofa 0,21 l + Atollan 0,48 kg oder Captan S WG 1,6 kg Schorf / Echter Mehltau: abstoppend vorbeugend Slick 0,24 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg	Goëmar Start / Goëmar Multi 2,0 l ReadiCal 2,0 kg Feuerbrand (Teilwirkung) Hemmung des Triebwachstums (max. 3 kg) Regalis Plus 2,5 kg / Jahr Ausdünnen Dirigol N 120–320 g Röhrenläuse / Sägewespe Gazelle SG 0,24 kg Rote Spinne Kanemite 1,8 l Oleate 20 5–15 l/ha (Blattläuse, Spinnmilben) Fruchtwanzen Elvis 0,32 l Apfelwickler und Pfirsichwickler Carpovirusine Evo2 1,0 l + Lufix 1,0–2,0 l/ha Qualität und Calciumernährung Calshine 2,4 l	Regalis Plus : Splittbehandlungen Technischs Merkblatt beachten! Kanemite : Auf mobile Stadien unmittelbar nach der Blüte od. 3 Wochen nach der Blüte + Sticker 0,15 l. Nur in Anlagen. 1× / Jahr Sicid Neem : Gegen Mehlig Apfelblattlaus bis Ende Mai. Calshine/ReadiCal : CA bei Zellteilung 1–2×	
Bis Triebabschluss	Schorf: Vorbeugende Wirkung Atollan 0,8 kg oder Captan S WG 2,4 kg oder Folpet 80 WDG 2,0 kg Echter Mehltau Cyflamid 0,5 l oder Sufralo 2,0 kg Schorf / Echter Mehltau: 3–4 Tage abstoppend, vorbeugend 6–8 Tage. Slick 0,24 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg	Schalenwickler Wormox 1,0 kg oder Elvis 0,32 l Apfelwickler / kleiner Fruchtwickler / Schalenwickler Atac 3,2 kg oder Elvis 0,32 l Läuse Gazelle SG 0,24 kg ab Juli 0,16 kg oder Pirimor 0,64 kg ab Juli 0,32 kg Rote Spinne (Notfall) Kanemite 1,8 l + Nissostar 0,32 l Oleate 20 5–15 l/ha (Blattläuse, Spinnmilben)	Atac : Nur in Obstanlagen, WF 3 Wochen Allgemeinverfügung BLV Pfirsichwickler Atollan : Bis Ende Juni Pirimor : Zur Haftverstärkung Sticker 0,15 l 2× / Jahr Nissostar : 1× / Jahr. Bis Ende Juni Kanemite : Nur in Obstanlagen Zur Haftverstärkung Sticker 0,15 l Oleate 20 : WF 3 Wochen Slick : Bis Ende Juli	
Ab Triebabschluss	Schorf / Lagerkrankheiten Captan S WG 2,4 kg oder Folpet 80 WDG 2,0 kg Schorf / Echter Mehltau / Lagerschorf / Regenflecken Armicarb 3,2–4,8 kg + Sufralo 3,2 kg (Armicarb 3,2 kg + Stamina S 3,2 l (Schorf)) Vorzeitiger Fruchtfall Dirigol N 160 g / ha	Apfelwickler / Schalenwickler Atac 3,2 kg oder Elvis 0,32 l Schalenwickler Wormox 1,0 kg Apfelwickler und Pfirsichwickler Carpovirusine Evo2 1,0 l + Lufix 1,0–2,0 l/ha Qualität und Calciumernährung Calshine 2,4 l	Captan S WG, Folpet 80 WDG : WF 3 Wo. Wormox : Wartefrist 2 Tage Carpovirusine Evo2 : Mind. 3× + Lufix (UV-Schutz) Calshine : 2–6×, WF 2 Wochen Mischbar mit Fungiziden, Insektiziden Armicarb + Sufralo : WF 8 Tage, TW (Armicarb + Stamina S : WF 3 Wochen)	
Nach der Ernte		Ernährung: Goëmar Start 2,0 l oder Goëmar Opti 2,0 l	Goëmar Opti : Algenfiltrat mit Mg, Zink, SO ₃ N-Power : 5–10 l/ha	

Herbizide

Bis August

Behandelte Fläche

Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha
(ab 2. Standjahr)
Natrel 16 l (ab 2. Standjahr)
Mizuki 1,5–2,5 l/ha (ab 3. Standjahr) 2× / Jahr
Exelor 1,5–2,5 l/ha (ab 1. Standjahr) 1× / Jahr
Select 0,5–1,0 l/ha (ab 1. Standjahr) 1× / Jahr
(Gräser und Hirsen)
Xenturion 1,0–3,0 l/ha (ab 1. Standjahr) 1× / Jahr
(Gräser und Hirsen)

Verschiedenes

Gondor 0,5 l/ha
Lufix 1,0–2,0 l/ha
Heliofix 0,5 l/ha
Sticker 0,15 l/ha
Triagol 2,5 l/ha / **Radi S** 3× 3–5 l/ha
Prosulf GR / Sulfo S 2,0–3,0 l/ha
X-Change 0,15–0,2 l/100 l
Anti-Mousse S 10–45 ml/200 l
Vapi Clean 500 ml/100 l

Fördert die Benetzung, reduziert Abdrift
UV-Schutz
Netzmittel
Verbessert die Haftfähigkeit
Bodenverbesserer, Mikronährstoffe
Granulierter und flüssiger Schwefelblattdünger
Korrigiert Wasserhärte und ph-Wert
Schaumstopp, vor PSM in den Tank
Spezialreiniger für Pflanzenschutz-Spritzgeräte



Produkte	W-Nummer	kg, l / ha	%	kg, l / ha	%	Formul.	Gewässer Abstand	Spezielle Auflagen	Einschränkungen (ÖLN)	Behandlungen max. / Jahr	Wartezeit (Wochen)	Gefährlich für Bienen
Armicarb	W-6432	3,2	0,2			SP			Tankmischung mit Stamina S	6	3	
Armicarb	W-6432	3,2–4,8	0,2–0,3			SP			Tankmischung mit Sufralo		8 Tage	
Atollan	W-5417-1	0,8	0,05	0,48	0,03	WG	50 m		max. 4,85 kg/ha nach der Blüte		bis Ende Juni	
Bordeaux S	W-2116-1	4–8	0,25–0,5	2,0–4,0	0,125–0,25	WG			max. 1,5 kg RK / ha / Jahr			
Captan S WG	W-6246	2,4	0,15	1,6	0,1	WG	20 m			10	3	
Captan WG	W-7201	2,4	0,15	1,6	0,1	WG	20 m			10	3	
Cupric Flow	W-2710-4	4,0–8,0	0,25–0,5	2,0–4,0	0,125–0,25	SC			max. 1,5 kg RK / ha / Jahr			
Cyflamid	W-6592	0,5	0,03			EW				2	3	
Folpet 80 WDG	W-6660-1	2,0	0,125	1,4	0,1	WG	20 m				3	
Kocide 2000	W-7010-1	2,0–4,0	0,125–0,250	1,0–2,0	0,06–0,125	WG			max. 1,5 kg RK / ha / Jahr		3	
Oxykupfer 35	W-7315-1	2,0	0,125			WP			max. 1,5 kg RK / ha / Jahr			
Slick	W-5056-2	0,24	0,015			EC	20 m	1 P. AS	+ Mischpartner, Ende Juli	4	3	
Stamina S	W-6841	3,2	0,2			SL				6	2	
Sufralo	W-18-1	3,2	0,2	2,0	0,125	WG					3	
Tofa	W-7134-2	0,21	0,013			SC	20 m		+ Mischpartner	3	5	
Venturex	W-7213-2	1,2	0,075			SC	20 m		Behandlungen bis zum Abblühen	3		
Calshine		2,4	0,15			SC					2	
Dartilon	W-3064-1	0,3				SL			Blüten / Fruchtausdünnung			
Dirigol N	W-3004	0,12–0,32		0,08–0,16		WP					10 Tage	
Goëmar Start/Multi		2,0	0,125			SC						
GreenOn Plus		0,5	0,03			SG						
Heliofix	W-7491	0,5				EC					15 Tage	
Lufix		2,0				EC						
Naturamin WSP		1,0				WSP						
N-Power		5,0–10,0				SL						
Novagib	W-7344	0,5				SL						
Prosulf GR / Sulfo S		2,0–3,0				GR / ST						
ReadiCal		2,5				WP						
Regalis Plus	W-7110-1	2,5				WG			2,5 kg/ha (max. 3,0 kg/ha)		Splittbehandlungen	
Triagol		2,5				EL						
Vacciplant	W-6724	0,75	0,04	Hochst.	0,075	SL					3 Tage	
Vapi Clean		0,5		1 l/100 l		ST						
Vitex – Die homöopathische Produktlinie										Kontakt mit Stähler Aussendienst		
Atac	W-6748-3	3,2	0,2			SG	50 m	100 m, Biotop	Nur in Obstanlagen	2	3	•
Carpovirusine Evo2	W-6831	1,0	0,06			SC					1	
CheckMate Puffer CM	W-7222					VP			Kontakt mit Stähler Aussendienst			
CheckMate Leaf Multi	W-7523					VP			Kontakt mit Stähler Aussendienst			
CheckMate Fruit Multi	W-7635					VP			Kontakt mit Stähler Aussendienst			
Cobra Forte	W-7606	3–5 Pellets	pro 3–10 m			GE						
Elvis	W-6020-2	0,32	0,02			SC	20 m			2		•
Gazelle SG	W-6581	0,32	0,02	0,24	0,015	SG	20 m		1 Beh. / Jahr / Blattlausart	2	3	•
Gazelle SG (ab Juli)	W-6581			0,16	0,01	SG	20 m		1 Beh. / Jahr / Blattlausart	2	3	•
Kanemite	W-6632	1,8	0,12			SC	20 m	nur Anlage	1 Behandlung		3	
Nissostar	W-6982	0,32	0,02			SC	50 m		1 Behandlung bis Ende Juni		3	
Oleate 20	W-5761	5–15				SC			max. 30 l/ha (3%)		3	
Pirimor	W-1899-1	0,64	0,04	0,32	0,02	SG	50 m	20 m, Biotop	1 Beh. / Jahr / Blattlausart	2	3	•
Sicid Neem	W-7490-1	1,5	0,09			EC				2	bis Ende Mai	
Wormox	W-7380	0,8	0,05	1,0	0,06	WP					2 Tage	
Zofal D	W-1526	56,0	3,5	32,0	2,0	EC			nicht mit Atollan mischen			
Zofal R	W-5168-3	30,0	2,0	40,0	2,50	EC						
Exelor	W-4220	1,5–2,5				SL		Anw.-Schutz	ab 1. Standjahr, 1 Behandlung	1		
Mizuki	W-7340-1	1,5–2,5	0,5			EC	20 m, 3 P. AS		ab 3. Standjahr	2		
Natrel	W-7319	16				EC			ab 2. Standjahr	2	Mai–August	
Roundup PowerMax	W-6646-1	1,5–7,5				SL			ab 2. Standjahr		bis Ende August	
Select	W-6010	0,5		1,0		EC	6 m, 20 m B.	Verbot S 2	ab 1. Standjahr	1		
Xenturion	W-6085-3	1,0–3,0				EC			ab 1. Standjahr	1	4	

Anwenderschutz der Stähler Produkte auf den Sicherheitsdatenblättern und den Technischen Merkblättern beachten.

Reihenfolge der Produktzugabe bei Tankmischungen Etikettentext und Technisches Merkblatt beachten!

1. Tank 3/4 mit Wasser füllen, Wasseroptimierer (reduzieren Wasserhärte oder pH mit **X-Change**), **Anti-Mousse S**
2. Granulate und Pulver (**WP, WG, SG**) oder andere, nicht erwähnte Formulierungen (**ST**)
3. Suspensionskonzentrate (**SC**) oder andere, nicht erwähnte flüssige Formulierungen
4. Emulsionskonzentrate (**EC**). Vorsicht bei Tankmischungen
5. Haftmittel (Netzmittel), Öle oder **Lufix / Heliofix**
6. Flüssigdünger
7. Brühe sofort ausbringen / Tank reinigen

Problematische Punkte

Bei folgenden Produkten ist erhöhte Vorsicht geboten:

- Blattdünger mit hohen Salzgehalten (= hoher Gesamtgehalt an Nährstoffen)
Diese Produkte können heute oft mit folgenden Stähler-Produkten ersetzt werden:
Calshine bei CA-Behandlungen
Goëmar-Produkte zur Ernährung

Angaben zum Betrieb

Produktionsform (z.B. OELN, SwissGap, IP Suisse, Abnehmer)
Gewässerabstand, Abschwemmung (Parzelle, Kultur)
Baumvolumen (1. Austrieb, 2. nach der Blüte)
Verwirrung (Apfelwickler, Schalenwickler, Kl. Fruchtwickler und Pfirsichwickler)
Diverses
Probleme Vorjahr

Allgemeinverfügungen BLV / Jahr sind nicht komplett aufgeführt!