

## 3. 고식적 내분비요법(palliative endocrine therapy)

- 호르몬 수용체 양성인 유방암을 대상으로 하며, 환자 상태에 따라 2~6개월 간격으로 반응평가를 할 수 있음(everolimus 및 CDK4/6 inhibitor 포함 요법 제외) (제2020-155호: 2020.6.1.)
- 투여단계는 고식적 항암화학요법(chemotherapy)과 별도로 적용함. 단 'CDK4/6 inhibitor + letrozole or anastrozole' 병용요법의 경우 고식적 항암화학요법을 투여하지 않은 사람을 대상으로 함 (폐경 전 'ribociclib + letrozole or anastrozole' 병용요법 제외) (제2021-150호: 2021.6.1.)

## 가. 투여단계: 1차(first line)

연번	항암요법	투여대상
3	abemaciclib + letrozole	<p>아래의 조건을 모두 만족하는 폐경 후 전이성, 재발성 유방암</p> <p>① HER2 음성</p> <p>② 호르몬 수용체 양성</p> <p>③ 이전에 비스테로이드성 aromatase inhibitor를 투여받은 적이 없는 경우 (수술후보조요법 또는 선행화학요법으로 비스테로이드성 aromatase inhibitor를 사용한 경우에는 투여 종료 후 1년 이후 재발한 경우도 인정함)</p>
	(제2020-155호: 2020.6.1.)	
4	abemaciclib + anastrozole	<p>아래의 조건을 모두 만족하는 전이성, 재발성 유방암</p> <p>① HER2 음성</p> <p>② 호르몬 수용체 양성</p> <p>③ 이전에 내분비요법 후 진행된 경우 (고식적요법 투여 중 또는 종료 후 1달 이내에 진행된 경우, 수술후보조요법 투여 중 또는 종료 후 1년 이내에 진행된 경우도 인정함)</p> <p>④ 이전에 CDK4/6 inhibitor 또는 fulvestrant를 투여받은 적이 없는 경우</p> <p>※ 폐경 전 여성의 경우 4주 간격의 goserelin 혹은 leuprolide를 함께 투여해야 함</p>
	(제2020-155호: 2020.6.1.)	

## 다. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
8	abemaciclib + fulvestrant	<p>아래의 조건을 모두 만족하는 전이성, 재발성 유방암</p> <p>① HER2 음성</p> <p>② 호르몬 수용체 양성</p> <p>③ 이전에 내분비요법 후 진행된 경우 (고식적요법 투여 중 또는 종료 후 1달 이내에 진행된 경우, 수술후보조요법 투여 중 또는 종료 후 1년 이내에 진행된 경우도 인정함)</p> <p>④ 이전에 CDK4/6 inhibitor 또는 fulvestrant를 투여받은 적이 없는 경우</p> <p>※ 폐경 전 여성의 경우 4주 간격의 goserelin 혹은 leuprolide를 함께 투여해야 함</p>
	(제2020-155호: 2020.6.1.)	