

Abemaciclib 정(상품명: 버제니오정) 급여 세부인정기준

9. 유방암(Breast Cancer)

[2군 항암제를 포함한 요법]

3. 고식적요법(palliative)

가. 투여단계: 1차(first-line)

항암요법	투여대상
abemaciclib + letrozole or anastrozole	아래의 조건을 모두 만족하는 폐경기 이후 전이성, 재발성 유방암 ① HER2 음성 ② 호르몬 수용체 양성 ③ 이전에 비스테로이드성 aromatase inhibitor를 투여 받은 적이 없는 경우 (수술후보조요법 또는 선행화학요법으로 비스테로이드성 aromatase inhibitor를 사용한 경우에는 투여 종료 후 1년 이후 재발한 경우도 인정함)

라. 투여단계: 2차 이상

항암요법	투여대상
abemaciclib + fulvestrant	아래의 조건을 모두 만족하는 전이성, 재발성 유방암 ① HER2 음성 ② 호르몬 수용체 양성 ③ 이전에 내분비요법 후 진행된 경우 (고식적 요법 투여 중 또는 투여 종료 후 1달 이내에 진행된 경우, 수술 후 보조요법 투여 중 또는 투여 종료 후 1년 이내에 진행된 경우도 인정함) ④ 이전에 CDK inhibitor 또는 fulvestrant를 투여 받은 적이 없는 경우 ※ 폐경기 전 및 주폐경기 여성의 경우 LHRH agonist를 함께 투여해야함