



VOQUEZNA[®]

(vonoprazan) tablets ^{10mg}_{20mg}

Para la curación y el alivio de la acidez en adultos con esofagitis erosiva, y para el alivio de la acidez en adultos con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) no erosiva

VOQUEZNA COMBATE LA ACIDEZ

EL PRIMER Y ÚNICO

tratamiento de su tipo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), un bloqueador del ácido competitivo con el potasio (BACP).

Los pacientes elegibles pueden pagar solo \$25* con la tarjeta de ahorro VOQUEZNA.

* Los pacientes deben tener un seguro comercial para ser elegibles. Se aplican otras reglas de elegibilidad. Consulte voquezna.com/savings/#terms para ver los términos y condiciones completos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No tome VOQUEZNA si:

- es alérgico al vonoprazan o a cualquiera de los demás componentes de VOQUEZNA. Los síntomas de la reacción alérgica pueden incluir dificultad para respirar, erupción cutánea, picor e hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta.
- está tomando un medicamento que contiene rilpivirina (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY) usado para tratar el HIV-1 (virus de inmunodeficiencia humana).

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción](#) completa de VOQUEZNA.

VOQUEZNA COMBATE LA ACIDEZ

INDICACIÓN

¿Qué es VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) es un medicamento con receta que se utiliza en adultos:
 - durante 8 semanas para curar el daño relacionado con el ácido en el revestimiento del esófago (llamado esofagitis erosiva) y para aliviar la acidez relacionada con la esofagitis erosiva.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción](#) completa de VOQUEZNA.

ÍNDICE

- 4 [VOQUEZNA FUNCIONA DE FORMA DIFERENTE](#)
- 8 [CURACIÓN](#)
- 10 [ALIVIO DE LA ACIDEZ](#)
- 16 [CÓMO TOMAR VOQUEZNA](#)
- 18 [CONSEJOS ÚTILES](#)
- 20 [INFORMACIÓN DE SEGURIDAD](#)
- 22 [ACERCA DE LA ERGE](#)
- 30 [AHORROS Y APOYO](#)



VOQUEZNA®
(vonoprazan) tablets 10mg
20mg



VOQUEZNA FUNCIONA DE FORMA DIFERENTE

VOQUEZNA (vonoprazan) es el primer y único tratamiento de su tipo aprobado por la FDA. No todos los tratamientos funcionan para todas las personas. Si está teniendo síntomas en curso, hable con su médico sobre sus opciones.



Con o sin alimentos

VOQUEZNA es un tipo de medicamento llamado bloqueador del ácido competitivo con el potasio (BACP). A diferencia de la mayoría de los inhibidores de la bomba de protones (IBP), los BACP se pueden tomar con o sin alimentos.

INDICACIÓN (CONTINUACIÓN)

¿Qué es VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) es un medicamento con receta que se utiliza en adultos:
 - hasta 6 meses para mantener la curación de la esofagitis erosiva y para aliviar la acidez relacionada con la esofagitis erosiva.

VOQUEZNA en acción



Después de tomar VOQUEZNA, el medicamento viaja al estómago, donde se une a las bombas de protones.



Aquí, VOQUEZNA bloquea la unión del potasio a las bombas. Esto impide que las bombas de protones funcionen.



Cuando las bombas de protones no funcionan, ya no pueden producir ácido. VOQUEZNA puede ayudar a suprimir el ácido durante 24 horas.

INDICACIÓN (CONTINUACIÓN)

¿Qué es VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) es un medicamento con receta que se utiliza en adultos:
 - durante 4 semanas para el alivio de la acidez relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Se desconoce si VOQUEZNA es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la Información para el paciente y la Información de prescripción completa de VOQUEZNA.



VOQUEZNA®
(vonoprazan) tablets 10mg
20mg



VOQUEZNA comienza a reducir rápidamente el ácido

En un ensayo clínico de adultos sanos, se ha demostrado que VOQUEZNA (vonoprazan) reduce el ácido en 2-3 horas y mantiene la supresión del ácido durante 24 horas.

 **Reducción del ácido en** 
2-3 HORAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Antes de tomar VOQUEZNA, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene niveles bajos de magnesio, calcio o potasio en la sangre, o está tomando un medicamento para aumentar la orina (diurético).
- tiene problemas de hígado o riñón.



VOQUEZNA curó mi ERGE erosiva.*

KEVIN, paciente del ensayo clínico de VOQUEZNA con ERGE erosiva



* Los resultados individuales pueden variar. Phathom compensó al paciente por el tiempo que dedicó a compartir su experiencia individual en el ensayo.

[Vea más sobre la historia de Kevin](#)


Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente y la Información de prescripción completa de VOQUEZNA](#).

 **VOQUEZNA[®]**
(vonoprazan) tablets ^{10mg}_{20mg}



VOQUEZNA PUEDE COMBATIR LA ACIDEZ Y AYUDAR A CURAR Y MANTENER LA CURACIÓN DE LA ERGE EROSIVA

Se ha demostrado que VOQUEZNA (vonoprazan) ayuda a la mayoría de los adultos con ERGE erosiva (también conocida como esofagitis erosiva, o EE) a lograr una curación completa que puede perdurar.



Representación de una **erosión esofágica**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Antes de tomar VOQUEZNA, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- está embarazada, cree que podría estar embarazada o planifica quedar embarazada. Se desconoce si VOQUEZNA dañará al feto.

Curación probada de ERGE erosiva

VOQUEZNA se evaluó en un ensayo clínico de adultos con EE confirmada mediante endoscopia. Un grupo tomó VOQUEZNA 20 mg una vez al día durante 2 a 8 semanas durante la fase de curación. **El 93 % de los adultos que tomaron VOQUEZNA para la EE experimentaron curación a los 2 meses** (en comparación con el 85 % que tomó otro tratamiento*).

Algunos adultos que se curaron con VOQUEZNA u otro tratamiento durante la fase de curación tomaron después VOQUEZNA 10 mg una vez al día durante 6 meses durante la fase de mantenimiento. **El 79 % de los adultos se mantuvo curado durante 6 meses con el tratamiento de mantenimiento con VOQUEZNA** (en comparación con el 72 % que tomó otro tratamiento*).



93% DE ADULTOS

QUE TOMARON VOQUEZNA LOGRARON LA CURACIÓN DE LA EE A LOS 2 MESES, FRENTE AL 85 % QUE RECIBIERON OTRO TRATAMIENTO*

Y DE AQUELLOS CURADOS



79% DE ADULTOS

QUE TOMARON VOQUEZNA SE MANTUVIERON CURADAS DURANTE 6 MESES FRENTE AL 72 % QUE RECIBIERON OTRO TRATAMIENTO*

* Lansoprazol

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- **Registro de exposición durante el embarazo:** Hay un registro de embarazos para mujeres que toman VOQUEZNA durante el embarazo. La finalidad de este registro es recopilar información sobre su salud y la de su bebé.

Consulte la **Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción](#) completa de VOQUEZNA.**



VOQUEZNA[®]
(vonoprazan) tablets ^{10mg}/_{20mg}



AYUDA A LOS PACIENTES A LOGRAR DÍAS SIN ACIDEZ GÁSTRICA

Se demostró que VOQUEZNA (vonoprazan) ayuda a los adultos con ERGE erosiva* o no erosiva a lograr días sin acidez gástrica.

* La ERGE erosiva también se conoce como esofagitis erosiva o EE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Antes de tomar VOQUEZNA, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- está amamantando o planifica hacerlo. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si tomará VOQUEZNA mientras amamanta.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Lleve una lista de ellos para mostrar a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.



**SE HA DEMOSTRADO
QUE AYUDA
A ALIVIAR
LA ACIDEZ
EN LA ERGE**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

VOQUEZNA puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar al funcionamiento de VOQUEZNA. En particular, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos que contienen rilpivirina (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY).


Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente y la Información de prescripción completa de VOQUEZNA.](#)



VOQUEZNA®
(vonoprazan) tablets 10mg
20mg

Alivio de la acidez gástrica en adultos con ERGE no erosiva

En un ensayo clínico de adultos con ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico) no erosiva que tomaban VOQUEZNA (vonoprazan), se pidió a los sujetos que llevaran un registro de los días en que experimentaron **acidez y la gravedad de los síntomas de acidez**. Se comprobaron los diarios al fin del tratamiento para identificar cuántos días se notificaron como sin acidez.



El 45 % de los días de VOQUEZNA estuvieron libres de acidez durante 24 horas (en comparación con el 28 % de los días de placebo).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA?


VOQUEZNA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Un tipo de problema renal (nefritis tubulointersticial aguda):** algunas personas que toman VOQUEZNA pueden desarrollar un problema renal llamado nefritis tubulointersticial aguda. Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta una disminución de la cantidad de orina o si observa sangre en la orina.
- **Diarrea causada por una infección (*Clostridioides difficile*) en sus intestinos:** llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene deposiciones acuosas, dolor de estómago y fiebre que no desaparece.
- **Fracturas óseas (cadera, muñeca o columna):** pueden producirse fracturas óseas en la cadera, la muñeca o la columna vertebral en personas que toman varias dosis diarias de otro tipo de medicamento que reduce el ácido del estómago



Me complace informar que, gracias a VOQUEZNA, mi acidez gástrica ya no ocupa el lugar central en mi vida.*

CARSON, paciente del ensayo clínico VOQUEZNA con ERGE no erosiva



* Los resultados individuales pueden variar. Phathom compensó al paciente por el tiempo que dedicó a compartir su experiencia individual en el ensayo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

conocido como inhibidores de la bomba de protones (IBP) durante un largo período (un año o más). Informe a su proveedor de atención médica si tiene una fractura ósea, especialmente en la cadera, la muñeca o la columna.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la Información para el paciente y la Información de prescripción completa de VOQUEZNA.



VOQUEZNA[®]
(vonoprazan) tablets 10mg
20mg

Alivio de la acidez gástrica en adultos con ERGE erosiva

En un ensayo clínico de adultos con ERGE erosiva (también conocida como esofagitis erosiva o EE) que tomaban VOQUEZNA (vonoprazan), se pidió a los sujetos que llevaran un registro de los días en que experimentaron **acidez y la gravedad de los síntomas de acidez**. Se comprobaron los diarios al fin del tratamiento para identificar cuántos días se notificaron como sin acidez.



Durante la fase de curación de 2 meses, **el 67 % de los días de VOQUEZNA estuvieron libres de acidez durante 24 horas** (en comparación con el 64 % de los días de otro tratamiento*). Durante la fase de mantenimiento de 6 meses, **el 81 % de los días de VOQUEZNA estuvieron libres de acidez durante 24 horas** (en comparación con el 79 % de los días de otro tratamiento*).

* Lansoprazol

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

VOQUEZNA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Reacciones cutáneas graves:** VOQUEZNA puede causar reacciones cutáneas raras pero graves que pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Es posible que estas reacciones cutáneas graves requieran tratamiento en un hospital y sean potencialmente mortales:
 - Erupción cutánea que puede tener ampollas, descamación o sangrado en cualquier parte de la piel.
 - También puede tener fiebre, escalofríos, dolores corporales, dificultad para respirar o agrandamiento de los ganglios linfáticos.

Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar VOQUEZNA y llame a su proveedor de atención médica inmediatamente. Estos síntomas pueden ser el primer signo de una reacción cutánea grave.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

VOQUEZNA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Niveles bajos de vitamina B-12:** VOQUEZNA reduce la cantidad de ácido en el estómago. El ácido del estómago es necesario para absorber correctamente la vitamina B12. Informe a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de niveles bajos de vitamina B12, incluidos latidos cardíacos irregulares, falta de aliento, aturdimiento, hormigueo o entumecimiento en brazos o piernas, debilidad muscular, palidez de la piel, sensación de cansancio o cambios de humor. Hable con su proveedor de atención médica sobre el riesgo de tener niveles bajos de vitamina B12 si ha estado tomando VOQUEZNA durante mucho tiempo.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción](#) completa de VOQUEZNA.



VOQUEZNA[®]
(vonoprazan) tablets 10mg
20mg



Plan de administración de dosis

ALIVIO DE LA ACIDEZ RELACIONADA CON LA ERGE NO EROSIVA



Un comprimido de 10 mg
Una vez al día
Durante 4 semanas

CURACIÓN DE LA ERGE EROSIVA Y ALIVIO DE LA ACIDEZ RELACIONADA



Un comprimido de 20 mg
Una vez al día
Durante 8 semanas

MANTENIMIENTO DE LA ERGE EROSIVA CURADA Y ALIVIO DE LA ACIDEZ RELACIONADA



Un comprimido de 10 mg
Una vez al día
Hasta 6 meses

Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.

Hable con su médico para determinar un plan de tratamiento adecuado para usted.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- **Crecimientos del estómago (pólipos de la glándula fúndica):** puede producirse un cierto tipo de crecimiento estomacal llamado pólipos de la glándula fúndica en personas que toman otro tipo de medicamento que reduce el ácido de su estómago, conocido como inhibidores de la bomba de protones (IBP) durante mucho tiempo. Hable con su proveedor de atención médica sobre la posibilidad de que se produzcan pólipos en la glándula fúndica si ha estado tomando VOQUEZNA durante mucho tiempo.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa de VOQUEZNA](#).

CÓMO TOMAR VOQUEZNA



VOQUEZNA (vonoprazan) es un comprimido que se toma una vez al día en adultos con acidez gástrica relacionada con ERGE tanto erosiva como no erosiva. **Se puede tomar con o sin alimentos.** Su régimen de administración de dosis puede tener un aspecto similar al descrito en la página siguiente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

VOQUEZNA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Las personas que toman VOQUEZNA** pueden tener niveles bajos de magnesio en el organismo. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene síntomas de niveles bajos de magnesio, incluidos convulsiones, mareos, latidos cardíacos irregulares, agitación, dolores o debilidad musculares, o espasmos de manos, pies o voz.



CONSEJOS ÚTILES PARA CUANDO TOME VOQUEZNA



Flexibilidad para tomar con o sin alimentos



VOQUEZNA (vonoprazan) es un comprimido que se puede tomar una vez al día con o sin alimentos, a diferencia de la mayoría de los inhibidores de la bomba de protones (IBP), lo que significa que no tiene que tomarlo en las comidas. Recuerde que siempre debe tomar VOQUEZNA como le indique su médico.

Tómelo entero

La masticación o trituración del comprimido puede provocar un sabor amargo.

El comprimido no se muestra en el tamaño ni el color reales.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Los efectos secundarios más frecuentes de VOQUEZNA para el tratamiento de la esofagitis erosiva o el alivio de la acidez estomacal relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluyen:


- inflamación del estómago
- diarrea
- distensión de estómago
- dolor de estómago
- náuseas
- indigestión
- estreñimiento
- presión arterial alta
- infección de las vías urinarias

CONSEJO:

Intente tomar VOQUEZNA inmediatamente después de una actividad que realice una vez al día. Esto puede ayudarle a incorporarlo a su rutina.

¿Omitió una dosis?

Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente dosis lo antes posible, a menos que hayan pasado 12 horas. Si han pasado más de 12 horas, saltee la dosis omitida y, a continuación, tome la siguiente dosis a tiempo.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

Se recomienda que notifique las sospechas de reacciones adversas poniéndose en contacto con Phathom Pharmaceuticals en el 1-888-775-PHAT (7428) o con la FDA en el 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción](#) completa de VOQUEZNA.





SEGURIDAD Y EFECTOS SECUNDARIOS

VOQUEZNA (vonoprazan) se evaluó en ensayos clínicos de adultos con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) no erosiva o ERGE erosiva (también conocida como esofagitis erosiva, o EE).

Los efectos secundarios más frecuentes enumerados en la página siguiente no son la lista completa de posibles efectos secundarios. Para ver la lista completa de posibles efectos secundarios, consulte la [información de prescripción completa](#).

ERGE no erosiva (4 semanas)

Los efectos secundarios más frecuentes en adultos que tomaron VOQUEZNA 10 mg fueron:

Efectos secundarios	VOQUEZNA 10 mg 259 adultos
Dolor de estómago	2 %
Estreñimiento	2 %
Diarrea	2 %
Náuseas	2 %
Infección urinaria	2 %

Fase de curación de la ERGE erosiva (hasta 2 meses)

Los efectos secundarios más frecuentes en adultos que tomaron VOQUEZNA 20 mg fueron:

Efectos secundarios	VOQUEZNA 20 mg 514 adultos
Inflamación del estómago	3 %
Diarrea	2 %
Distensión estomacal	2 %
Dolor de estómago	2 %
Náuseas	2 %

Fase de mantenimiento de la ERGE erosiva (6 meses)

Los efectos secundarios más frecuentes en adultos que tomaron VOQUEZNA 10 mg fueron:

Efectos secundarios	VOQUEZNA 10 mg 296 adultos
Inflamación del estómago	6 %
Dolor de estómago	4 %
Indigestión	4 %
Presión arterial alta	3 %
Infección urinaria	3 %

Consulte la [Información importante de seguridad adicional](#) en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa](#) de VOQUEZNA.





QUÉ SABER ACERCA DE LA ERGE

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una enfermedad crónica que se produce cuando el ácido del estómago fluye hacia el esófago y causa irritación.

Los dos tipos principales de ERGE son:

- ERGE no erosiva
- ERGE erosiva (también conocida como esofagitis erosiva o EE)

¿A quién afecta la ERGE?

La ERGE es una de las enfermedades digestivas más frecuentes, que afecta a aproximadamente 65 millones de personas en los Estados Unidos.



ERGE erosiva frente a ERGE no erosiva

La ERGE erosiva es un tipo de ERGE en la que se produce daño relacionado con el ácido en el esófago. La ERGE no erosiva no implica daño al esófago y es más frecuente. La acidez gástrica es frecuente en ambas afecciones.

**APROXIMADAMENTE 2/3
DE LAS PERSONAS**

QUE VIVEN CON ERGE TIENEN ERGE NO EROSIVA

Acidez que persiste

Muchas personas con ERGE erosiva siguen sintiendo ácido en el esófago a pesar de tomar medicamentos como antiácidos, antagonistas del receptor de la histamina-2 (H2) o inhibidores de la bomba de protones (IBP).



58 % DE LAS PERSONAS

**QUE SUFREN ERGE EROSIVA
SIGUEN EXPERIMENTANDO ACIDEZ
MIENTRAS RECIBEN TRATAMIENTO**

Los factores que pueden aumentar sus probabilidades de desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) incluyen:

- Hernia de hiato
- Obesidad
- Cierre incorrecto del esfínter esofágico inferior
- Retraso del vaciado del estómago

¿Qué síntomas están relacionados con la ERGE?



Los síntomas más frecuentes son la acidez y regurgitación. Otros posibles síntomas incluyen:

- Dificultad o dolor al tragar
- Tos crónica
- Dolor torácico

¿Cómo se diagnostica la ERGE?

Para diagnosticar la ERGE, su médico le hará algunas preguntas y es posible que le realice un examen físico.

Para diagnosticar ERGE erosiva se necesita una endoscopia. Una endoscopia es un procedimiento en el que se baja por la garganta un tubo fino equipado con una pequeña cámara.



La historia de los tratamientos para la ERGE

1928

El primer antiácido fue aprobado para su uso

Los antiácidos neutralizan el ácido en el estómago para ayudar a aliviar la acidez. Por lo general, se ofrecen como medicamentos de venta libre y se usan para aliviar los síntomas.

1977

El primer antagonista del receptor de la histamina-2 (H2) fue aprobado para su uso

Los H2 reducen la cantidad de ácido producido en el estómago al bloquear uno de los primeros pasos en la producción de ácido. Un H2 trata los síntomas de acidez relacionada con la ERGE.

1989

Se aprobó el primer inhibidor de la bomba de protones (IBP) para su uso

Los IBP son un tratamiento frecuente para la ERGE. Tratan la ERGE bloqueando el paso final en la producción de ácido. Se activan con el ácido del estómago, y la mayoría de los IBP se deben tomar entre 30 y 60 minutos antes de las comidas.

2023

2024

VOQUEZNA® (vonoprazan) fue aprobado como el primer bloqueador del ácido competitivo con el potasio

VOQUEZNA fue aprobado como el primer bloqueador del ácido competitivo con el potasio (BACP) para tratar la esofagitis erosiva y sus síntomas en 2023 y más adelante para aliviar la acidez gástrica causada por la ERGE no erosiva en 2024. Los BACP funcionan bloqueando el paso final en la producción de ácido: no es necesario que se activen con el ácido del estómago y pueden tomarse con o sin alimentos.

Hablar con su médico

Cuando se trata de la ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico), no todos los tratamientos funcionan para todas las personas. Si se ha estado preguntando si una opción de tratamiento diferente es adecuada para usted, quizás sea el momento de hablar con su médico.



✓ Hágalo a tiempo.

Cuanto más tiempo demore en hablar con su médico acerca de los síntomas molestos, más tiempo podría estar retrasando la curación del daño por ERGE erosiva o el alivio de la acidez relacionada.

✓ Sea sincero.

La mejor manera para que su médico encuentre un tratamiento que funcione para usted es recopilando todos los datos. No sea tímido con su médico. Es su mejor aliado.

✓ Sea descriptivo.

Ningún detalle es demasiado pequeño. ¿En qué momento del día aparecen sus síntomas? ¿Cuánto duran, con qué frecuencia y con cuánta molestia se producen sus síntomas? Informe a su médico estos detalles para que pueda identificar el mejor tratamiento para usted.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) es un medicamento con receta que se utiliza en adultos:
 - durante 8 semanas para curar el daño relacionado con el ácido en el revestimiento del esófago (llamado esofagitis erosiva) y para aliviar la acidez relacionada con la esofagitis erosiva.
 - hasta 6 meses para mantener la curación de la esofagitis erosiva y para aliviar la acidez relacionada con la esofagitis erosiva.
 - durante 4 semanas para el alivio de la acidez relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Se desconoce si VOQUEZNA es seguro y eficaz en niños.

No tome VOQUEZNA si:

- es alérgico al vonoprazan o a cualquiera de los demás componentes de VOQUEZNA. Los síntomas de la reacción alérgica pueden incluir dificultad para respirar, erupción cutánea, picor e hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta.
- está tomando un medicamento que contiene rilpivirina (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY) usado para tratar el HIV-1 (virus de inmunodeficiencia humana).

Antes de tomar VOQUEZNA, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene niveles bajos de magnesio, calcio o potasio en la sangre, o está tomando un medicamento para aumentar la orina (diurético).
- tiene problemas de hígado o riñón.
- está embarazada, cree que podría estar embarazada o planifica quedar embarazada. Se desconoce si VOQUEZNA dañará al feto.
 - **Registro de exposición durante el embarazo:** Hay un registro de embarazos para mujeres que toman VOQUEZNA durante el embarazo. La finalidad de este registro es recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si está embarazada o queda embarazada durante el tratamiento con VOQUEZNA, hable con su proveedor de atención médica sobre cómo puede unirse a este registro de embarazos, o puede inscribirse en el registro llamando al 1-866-609-1612 o visitando <https://voqueznapregnancyregistry.com/>.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Antes de tomar VOQUEZNA, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- está amamantando o planifica hacerlo. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si tomará VOQUEZNA mientras amamanta.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Lleve una lista de ellos para mostrar a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

VOQUEZNA puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar al funcionamiento de VOQUEZNA. En particular, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos que contienen rilpivirina (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA?

VOQUEZNA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Un tipo de problema renal (nefritis tubulointersticial aguda):** algunas personas que toman VOQUEZNA pueden desarrollar un problema renal llamado nefritis tubulointersticial aguda. Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta una disminución de la cantidad de orina o si observa sangre en la orina.
- **Diarrea causada por una infección (*Clostridioides difficile*) en sus intestinos:** llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene deposiciones acuosas, dolor de estómago y fiebre que no desaparece.
- **Fracturas óseas (cadera, muñeca o columna):** pueden producirse fracturas óseas en la cadera, la muñeca o la columna vertebral en personas que toman varias dosis diarias de otro tipo de medicamento que reduce el ácido del estómago conocido como inhibidores de la bomba de protones (IBP) durante un largo periodo (un año o más). Informe a su proveedor de atención médica si tiene una fractura ósea, especialmente en la cadera, la muñeca o la columna.
- **Reacciones cutáneas graves:** VOQUEZNA puede causar reacciones cutáneas raras pero graves que pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Es posible que estas reacciones cutáneas graves requieran tratamiento en un hospital y sean potencialmente mortales:
 - Erupción cutánea que puede tener ampollas, descamación o sangrado en cualquier parte de la piel.
 - También puede tener fiebre, escalofríos, dolores corporales, dificultad para respirar o agrandamiento de los ganglios linfáticos.

Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar VOQUEZNA y llame a su proveedor de atención médica inmediatamente. Estos síntomas pueden ser el primer signo de una reacción cutánea grave.

- **Niveles bajos de vitamina B-12:** VOQUEZNA reduce la cantidad de ácido en el estómago. El ácido del estómago es necesario para absorber correctamente la vitamina B12. Informe a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de niveles bajos de vitamina B12, incluidos latidos cardíacos irregulares, falta de aliento, aturdimiento, hormigueo o entumecimiento en brazos o piernas, debilidad muscular, palidez de la piel, sensación de cansancio o cambios de humor. Hable con su proveedor de atención médica sobre el riesgo de tener niveles bajos de vitamina B12 si ha estado tomando VOQUEZNA durante mucho tiempo.
- **Las personas que toman VOQUEZNA** pueden tener niveles bajos de magnesio en el organismo. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene síntomas de niveles bajos de magnesio, incluidos convulsiones, mareos, latidos cardíacos irregulares, agitación, dolores o debilidad musculares, o espasmos de manos, pies o voz.
- **Crecimientos del estómago (pólipos de la glándula fúndica):** puede producirse un cierto tipo de crecimiento estomacal llamado pólipos de la glándula fúndica en personas que toman otro tipo de medicamento que reduce el ácido de su estómago, conocido como inhibidores de la bomba de protones (IBP) durante mucho tiempo. Hable con su proveedor de atención médica sobre la posibilidad de que se produzcan pólipos en la glándula fúndica si ha estado tomando VOQUEZNA durante mucho tiempo.

Los efectos secundarios más frecuentes de VOQUEZNA para el tratamiento de la esofagitis erosiva o el alivio de la acidez estomacal relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluyen:

- inflamación del estómago
- diarrea
- distensión de estómago
- dolor de estómago
- náuseas
- indigestión
- estreñimiento
- presión arterial alta
- infección de las vías urinarias

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

Se recomienda que notifique las sospechas de reacciones adversas poniéndose en contacto con Phathom Pharmaceuticals en el 1-888-775-PHAT (7428) o con la FDA en el 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa](#) de VOQUEZNA.





PUEDE AHORRAR EN SU RECETA DE VOQUEZNA

Con la tarjeta de ahorro VOQUEZNA, los pacientes con seguro comercial elegibles **pueden pagar tan solo \$25*** por su receta.



Puede descargar una tarjeta de ahorro e inscribirse para obtener apoyo adicional aquí >

BLINKRx

Nuestro socio farmacéutico en línea

BlinkRx ayuda a identificar posibles ahorros disponibles para usted. Phathom Pharmaceuticals y BlinkRx trabajan juntos para ayudar a simplificar el proceso de recepción de VOQUEZNA (vonoprazan).

Si su médico envía su receta a BlinkRx, BlinkRx se comunicará con usted para comenzar a organizar la entrega a domicilio gratuita.



Entrega GRATUITA a domicilio

Un socio farmacéutico le entregará GRATIS su receta en su puerta.



Su costo de bolsillo más bajo

BlinkRx identificará el costo de su medicación y aplicará ofertas de ahorro elegibles.

Para ver los términos y condiciones completos, vaya a voquezna.com/savings/#terms

BlinkRx NO es un seguro. Al enviar su receta a BlinkRx, usted autoriza a BlinkRx (“Blink”) a enviar notificaciones por mensajes de texto relacionadas con sus recetas. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes varía. Es posible que los mensajes SMS estándar no sean totalmente seguros. Proporcionar el consentimiento no es una condición para comprar bienes o servicios a través de Blink.

Puede responder a cualquier texto con “HELP” para obtener ayuda o “STOP” para detener y revocar su consentimiento. Visite el Aviso de privacidad según la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA) y los Términos de uso de Blink en www.blinkrx.com/legal.



UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO DIFERENTE

- ✓ **El primer y único tratamiento** de su tipo aprobado por la FDA, un bloqueador del ácido competitivo con el potasio (BACP).
- ✓ **Puede ayudar a aliviar la acidez** relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) no erosiva o la ERGE erosiva (también conocida como esofagitis erosiva o EE).
- ✓ **Puede ayudar a curar y mantener la curación** de la ERGE erosiva en la mayoría de los adultos.

Los efectos secundarios más frecuentes

en adultos con ERGE no erosiva o EE fueron inflamación del estómago, diarrea, distensión de estómago, dolor de estómago, náuseas, indigestión, estreñimiento, presión arterial alta e infección de las vías urinarias. Se han producido otros efectos secundarios graves. Consulte la [información para el paciente](#) para ver otros posibles efectos secundarios.

Los pacientes elegibles pueden pagar tan solo \$25* con la tarjeta de ahorro VOQUEZNA

* Los pacientes deben tener un seguro comercial para ser elegibles. Se aplican otras reglas de elegibilidad. Consulte voquezna.com/savings/#terms para ver los términos y condiciones completos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No tome VOQUEZNA si:

- es alérgico al vonoprazan o a cualquiera de los demás componentes de VOQUEZNA. Los síntomas de la reacción alérgica pueden incluir dificultad para respirar, erupción cutánea, picor e hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta.
- está tomando un medicamento que contiene rilpivirina (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY) usado para tratar el HIV-1 (virus de inmunodeficiencia humana).

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa de VOQUEZNA](#).