

 **VOQUEZNA TriplePak.**  
vonoprazan tablets 20 mg  
amoxicillin capsules 500 mg  
clarithromycin tablets 500 mg

 **VOQUEZNA DualPak.**  
vonoprazan tablets 20 mg  
amoxicillin capsules 500 mg

## 帮助抵御 幽门螺杆菌 感染的力量

了解幽门螺杆菌和  
独特的 14 天疗法

了解  
有关储蓄选项的  
信息  
(第 10 页和第 11 页)

### 适应症和重要安全性信息

#### 什么是 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK?

- VOQUEZNA® TRIPLE PAK® (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules, clarithromycin tablets) 和 VOQUEZNA® DUAL PAK® (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules) 是包装在一起的处方药，用以治疗成人幽门螺杆菌 (*H. pylori*) 细菌感染。
- 尚不清楚 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 对儿童是否安全有效。
- 为减少耐药菌的产生并保持 VOQUEZNA TRIPLE PAK、VOQUEZNA DUAL PAK 和其他抗菌药物的有效性，这些产品只能用以治疗或预防经证实或强烈怀疑由易感细菌引起的感染。

#### 如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK

- 已知对 VOQUEZNA TRIPLE PAK 的成分 (vonoprazan、amoxicillin、clarithromycin)、大环内酯类抗生素 (如阿奇霉素和红霉素) 或青霉素过敏或敏感。

请参阅整份文档中的其他“重要安全信息”和完整的“处方信息”。

## 幽门螺杆菌感染和治疗的基本信息



### 幽门螺杆菌是一种发源于胃内的细菌感染。

这种感染可能会引起胃部疼痛或烧灼感、恶心、腹胀、食欲不振和频繁打嗝等症状。

幽门螺杆菌无论有无症状，一经发现都应及时治疗，因为它具有传染性。对幽门螺杆菌不加以治疗会增大相关健康问题的风险。



### 幽门螺杆菌很常见

据估计，全球 50% 的人口和美国 36% 的人口感染了幽门螺杆菌。



## 重要安全性信息（续）

### 请勿服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK，前提是您（续）

- 正在使用：
  - 含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY）
  - 匹莫齐特
  - 如果您有肾脏或肝脏问题，则为秋水仙碱
  - 洛美他派、洛伐他汀和辛伐他汀
  - 麦角生物碱（麦角胺或二氢麦角胺）
  - 鲁拉西酮
- 有使用 clarithromycin 时皮肤变黄（黄疸）或出现肝脏问题的病史。

### 如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA DUAL PAK

- 已知对 VOQUEZNA DUAL PAK 的成分（vonoprazan、amoxicillin）或青霉素过敏或敏感。
- 正在使用含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY）。

### 对幽门螺杆菌不加以治疗会导致健康问题

这些健康问题包括胃部刺激和肿胀、胃黏膜保护层内长疮（称为溃疡）以及患上某类型胃癌的风险增大。



### 完成基于 VOQUEZNA 的 14 天治疗非常重要

遵照医嘱服用医生开给的所有药物，有助于增加摆脱幽门螺杆菌感染的机会。

如果出现令您担忧的副作用，请咨询您的医生是否应该停止治疗。



请访问 [VOQUEZNA.com/HP](https://www.voquezna.com/HP) 了解有什么会让您的治疗独特的更多信息。

## 重要安全性信息（续）

在服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 正在母乳喂养。如果有在母乳喂养，请在治疗期间和治疗后 2 天内将母乳挤出并丢弃。
- 已怀孕、认为可能怀孕或计划怀孕。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会对胎儿造成伤害。
- 有肾脏或肝脏问题。
- 患有中度至重度肝病。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的“处方信息”。

## 您的幽门螺杆菌治疗方案 包含抗生素和酸阻滞剂 vonoprazan



### 有效的酸阻滞剂对于治疗成功非常重要

酸阻滞剂可使胃酸减少，有助于幽门螺杆菌治疗更好起效。在基于 VOQUEZNA 的治疗方案中，vonoprazan 是酸阻滞剂。



### vonoprazan 能迅速减少胃酸

vonoprazan 可在 2 到 3 小时内开始阻滞酸质。



### vonoprazan 可与食物或不与食物同服

与其他一些酸阻滞剂不同的是，对于 vonoprazan 未设食物要求。



### 重要安全性信息（续）

#### 此外，如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK：

- 您已怀孕或计划怀孕。VOQUEZNA TRIPLE PAK 中的 clarithromycin 可能会对胎儿造成伤害。

告诉您的医务人员您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。当某些药物与本品同时使用时，可能会引发严重的副作用。由于 clarithromycin 与秋水仙碱、某些降脂药、某些钙通道阻滞剂和其他药物的药物相互作用，VOQUEZNA TRIPLE PAK 可导致严重不良反应。

#### VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起哪些副作用？

#### VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重的副作用，包括：

- **过敏反应（超敏反应）：**如果出现皮疹、荨麻疹或其他皮肤变化，脸部肿胀或呼吸困难，请立即致电您的医生。

### 酸阻滞剂有助于抗生素 更好地发挥效用

抗生素可杀灭幽门螺杆菌以清除感染。胃酸较少时，它们的效果会更好。



连同抗生素一起服用酸阻滞剂（如 vonoprazan）时，可提高清除感染的几率。

这些基于 VOQUEZNA 的疗方属于美国  
FDA 批准的用药

### 重要安全性信息（续）

#### VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起哪些副作用？

#### VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重的副作用，包括：

- **类肾脏问题（急性肾小管间质性肾炎）：**部分人服用 vonoprazan（VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 的一种成分）后，可能会出现称为急性肾小管间质性肾炎的肾脏问题。如果您的尿量减少或发现尿中带血，请立即致电您的医务人员。
- **严重皮肤反应：**VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重皮肤反应，如皮疹或身体任何部位的过敏反应。症状还可能包括但不限于发烧、寒战、身体酸痛或气短。如果您出现上述任何症状，请立即停用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK，并立即致电您的医生。
- **胃肠道超敏反应（药物诱导性小肠结肠炎综合征）：**有报告称，使用 amoxicillin（VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 的一种成分）会引起一种过敏反应，导致小肠和大肠炎症，主要发生在 18 岁及 18 岁以下的患者中。症状包括服药后 1-4 小时内出现呕吐，服用 amoxicillin 后 24 小时内还可能出现皮肤苍白、疲倦、低血压、休克和腹泻。如果您出现上述任何症状，请停用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK，并通知您的医生。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的“处方信息”。

FDA 批准的治疗方案，  
用以帮助您清除感染



## 经临床试验证明可摆脱 幽门螺杆菌感染

一项临床试验证明，经过 VOQUEZNA® Triple Pak® 和 VOQUEZNA® Dual Pak® 14 天治疗后，有 77% 以上的患者摆脱了幽门螺杆菌感染（相比之下，使用兰索拉唑、amoxicillin 和 clarithromycin 的患者中达到此效果的为 69%）。



## 处方药可能产生的副作用

在一项临床试验中，常见的副作用包括：腹泻、味觉改变、阴道酵母菌感染、胃痛、头痛、高血压和类感冒症状。

还可能出现其他更严重的副作用。请参阅本手册通篇纳入的“重要安全性信息”。

## 重要安全性信息（续）

VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起哪些副作用？  
(续)

VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重副作用，包括 (续)：

- **严重腹泻：**如果您在服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 期间或完成治疗后出现水样便、胃痛和持续不退的发烧，请立即致电您的医生。
- **单核细胞增多症患者出现皮疹：**amoxicillin (VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 的一种成分) 可能会导致单核细胞增多症患者出现皮疹。如果确诊患有单核细胞增多症，请停用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK，并立即致电您的医生。
- **改变某些肿瘤的检测结果：**VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 降低了胃酸，这会导致血液中某种蛋白质 (CgA) 水平升高。这一水平升高时，某些肿瘤的检测结果可能改变。验血之前，请通知您的医生您使用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 的情况。



“完成 14 天治疗约一个月后，我的医生为我做了检测，确认感染已经消退。我希望它能像我一样也对您有效！”

个体结果可能会有所不同。

- LaDawn,  
参加 VOQUEZNA® Dual Pak® 临床试验的患者

## 重要安全性信息（续）

VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起哪些副作用？  
(续)

此外，VOQUEZNA TRIPLE PAK 还可能引起：

- **心律不齐：**clarithromycin 可能引起心律不齐。如果感到晕厥、头昏眼花或心脏跳动不规律，请立即致电您的医生。
- **肝脏问题：**如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生：体重减轻、皮肤和眼睛发黄（黄疸）、尿色深暗、皮疹，或腹部右侧疼痛。

最常见的副作用可能包括：

- 腹泻
- 短暂的味觉变化
- 阴道酵母菌感染
- 胃痛
- 头痛
- 高血压和
- 类感冒症状


请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的“处方信息”。



## 您的医生给您开出了基于 VOQUEZNA 的以下方案之一



每天服药 2 次：  
早晚各一次，  
间隔 12 小时。



所示药片非实际尺寸。

14 天治疗，可与食物也可不与食物同服

### 如果您漏服了一剂 VOQUEZNA® TRIPLE PAK®

请尽快服用下一剂，除非离原定的服药时间已过去 4 小时。如果已过去 4 小时以上，请跳过该漏服的剂量，而是按时服用下一剂。即使症状消退了，也要继续服药至服完药物包装中的所有剂量。

## 重要安全性信息（续）

### 最常见的副作用可能包括（续）：


这些并非 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起的所有副作用。如需了解针对副作用的医疗建议，请致电您的医务人员。

### 关于安全有效使用 VOQUEZNA 的通用信息。

药物有时并非为了患者需知信息单中列出的目的而开出。请勿将 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 用于处方以外的疾病。



每天服药 3 次：  
早、午、晚各一次。



所示药片非实际尺寸。

14 天治疗，可与食物也可不与食物同服

### 如果您漏服了一剂 VOQUEZNA® DUAL PAK®

请尽快服用下一剂，除非离原定的服药时间已过去 4 小时。如果已过去 4 小时以上，请跳过该漏服的剂量，而是按时服用下一剂。即使症状消退了，也要继续服药至服完药物包装中的所有剂量。

## 重要安全性信息（续）

### 关于安全有效使用 VOQUEZNA 的通用信息（续）：

切勿将 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 给其他人服用，哪怕他们出现了与您相同的症状。这样做可能会伤害他们。

如需了解更多信息，请咨询您的医务人员或药剂师。

我们鼓励您拨打 1-888-775-PHAT (7428) 联系 Phathom Pharmaceuticals，或拨打 1-800-FDA-1088 联系 FDA，或访问 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)，以报告可疑不良反应。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的“处方信息”。

## 储蓄和支持优惠



### 您的医生可能会将您的处方发送至 BlinkRx

BlinkRx 可帮助您找到潜在的节省。Phathom Pharmaceuticals 和 BlinkRx 携手帮助您轻松取得 VOQUEZNA® Triple Pak® 或 VOQUEZNA® Dual Pak®。



**易于使用。** BlinkRx 代表您与保险公司协调。



**获得您可用的最低自付费用。** BlinkRx 可确定您的药费和您的保险承保范围，然后为您套用符合资格的任何节省优惠。



**免费送药上门。** 合作的药房将会免费送药上门。

在医生发送处方后，BlinkRx 将与您联系，详细告知您要如何注册和使用其服务。您还可以选择当场致电 1 (844)-759-0782 进行注册。

### 您可能有资格享用这张储蓄卡

如果您有商业保险，也许可以节省您的处方药费用。您可以在[此处](#)注册储蓄卡。



#### 条款和条件：

使用 VOQUEZNA® Triple Pak®/VOQUEZNA® Dual Pak® 储蓄卡（以下简称“此卡”）即表示您符合资格标准，同意并将遵守下述条款和条件。

对于购买了 VOQUEZNA Triple Pak 或 VOQUEZNA Dual Pak 商业药品保险的患者：此优惠适用于 VOQUEZNA Triple Pak 或 VOQUEZNA Dual Pak 的最多两次配药。患者必须有商业药物保险，且保险提供商有承保 VOQUEZNA Triple Pak 或 VOQUEZNA Dual Pak，只需支付低至 \$25。优惠的每月上限金额为 \$300，另有年度上限金额 \$600。患者需承担任何适用的税费或超出月度或年度上限的金额。优惠的每次处方药报销限额为 \$300 和其他计划限额。

必须年满 18 岁才能享受此优惠。患者需承担任何适用的税费、超过每次处方药报销限额和计划限额的金额或达到报销限额后可能适用的费用（包括额外共付额和共保额）。本优惠不适用于无商业药物保险的患者，或其 VOQUEZNA Triple Pak 或 VOQUEZNA Dual Pak 处方药索赔可全部或部分由任何政府计划补偿的患者，包括但不限于 Medicaid、Medicare、Medicare Part D、Medigap、DoD、VA、TRICARE®/CHAMPUS 或任何州立的患者或药物援助计划。此优惠不提供给：马萨诸塞州居民，前提是有 AB 级非专利等效药可用；加利福尼亚州居民，前提是有 FDA 批准的等效治疗可用。仅在美国提供给美国居民。接受此优惠即表示您同意，如果根据您的处方药保险条款或，法律规定您有义务这样做，您应该通知您的保险公司您已用此卡兑换此优惠。兑换此优惠即表示，您和药剂师均同意不要求任何第三方（如保险计划、灵活开支计划或健康储蓄账户）报销您用此储蓄卡获得的全部或部分福利。

此卡失效日期为 2024 年 12 月 31 日。此优惠不可与其他任何涉及 VOQUEZNA Triple Pak 或 VOQUEZNA Dual Pak 的计划、折扣、折扣卡、现金折扣卡、优惠券、奖励或类似优惠合并使用。禁止任何人出售、购买或交易；或提议出售、购买或交易，或伪造此卡。Phathom Pharmaceuticals, Inc. 可随时终止、废止、撤销或修改本优惠，恕不另行通知。此卡需要激活。此卡不是医疗保险。与您使用此卡相关的某些信息将与此卡的赞助商 Phathom 和代表 Phathom 行事的公司共享。若要了解更多信息，请访问 <https://www.phathompharma.com/privacy-policy/> 查看 Phathom 隐私政策。



**VOQUEZNA TriplePak**

vonoprazan tablets 20 mg  
amoxicillin capsules 500 mg  
clarithromycin tablets 500 mg



**VOQUEZNA DualPak**

vonoprazan tablets 20 mg  
amoxicillin capsules 500 mg

## FDA 批准：独特的 14 天治疗



含有酸阻滞剂 vonoprazan --它能迅速开始阻滞酸质，有助于提高抗生素杀灭幽门螺杆菌的能力



有一项临床试验证明，经过 14 天治疗，大多数患者都能摆脱幽门螺杆菌



可与食物或不与食物同服



最常见的副作用可能包括：腹泻、短暂的味觉改变、阴道酵母菌感染、胃痛、头痛、高血压和类感冒症状

若要了解更多信息，请联系您的医生或访问  
[VOQUEZNA.com/HP](https://www.voquezna.com/HP)

## 重要安全性信息（续）

### 如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK

- 已知对 VOQUEZNA TRIPLE PAK 的成分（vonoprazan、amoxicillin、clarithromycin）、大环内酯类抗生素（如阿奇霉素和红霉素）或青霉素过敏或敏感。

### 如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA DUAL PAK

- 已知对 VOQUEZNA DUAL PAK 的成分（vonoprazan、amoxicillin）或青霉素过敏或敏感。
- 正在使用含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY）。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的“处方信息”。