


 **VOQUEZNA Triple Pak.**  
vonoprazan tablets 20 mg  
amoxicillin capsules 500 mg  
clarithromycin tablets 500 mg

 **VOQUEZNA Dual Pak.**  
vonoprazan tablets 20 mg  
amoxicillin capsules 500 mg

# EL PODER PARA AYUDAR A COMBATIR LA INFECCIÓN POR LA *H. PYLORI*

Obtenga información sobre  
la *H. pylori* y un tratamiento  
único de 14 días



Obtenga más  
información  
sobre las  
opciones de  
ahorro  
(páginas 10 y 11)

## INDICACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Qué son VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK?

- VOQUEZNA® TRIPLE PAK® (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules, clarithromycin tablets) y VOQUEZNA® DUAL PAK® (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules) son medicamentos con receta coenvasados para el tratamiento de una infección bacteriana por *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) en adultos.
- Se desconoce si VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK son seguros y eficaces en niños.
- Para reducir el desarrollo de bacterias farmacorresistentes y mantener la eficacia de VOQUEZNA TRIPLE PAK, VOQUEZNA DUAL PAK y otros fármacos antibacterianos, estos productos deben utilizarse solo para tratar o prevenir infecciones que se han demostrado o se sospecha que están causadas por bacterias susceptibles.

### No tome VOQUEZNA TRIPLE PAK si:

- Se sabe que tiene alergia o es sensible a los componentes de VOQUEZNA TRIPLE PAK (vonoprazan, amoxicillin, clarithromycin), antibióticos macrólidos (como azithromycin y erythromycin) o penicillin.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la Información de prescripción completa.

# INFORMACIÓN ESENCIAL SOBRE LA INFECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE *H. PYLORI*



## La *H. pylori* es una infección bacteriana que se produce en el estómago



La infección puede causar síntomas como dolor o sensación de quemazón en el estómago, náuseas, distensión, pérdida del apetito y eructos frecuentes.

La *H. pylori* debe tratarse cuando se detecte si hay síntomas o no, ya que es contagioso. No recibir tratamiento para la *H. pylori* aumenta el riesgo de problemas de salud relacionados.

## La *H. Pylori* es frecuente



Se calcula que el 50 % de la población mundial y el 36 % de la población estadounidense tienen infección por *H. pylori*.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### No tome VOQUEZNA TRIPLE PAK si: (cont.)

- está tomando:
  - medicamentos que contienen rilpivirine (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY)
  - pimizide
  - colchicine, si tiene problemas renales o hepáticos
  - bien lomitapide, lovastatin y simvastatin
  - alcaloides ergóticos (ergotamine o dihydroergotamine)
  - lurasidone
- tiene antecedentes de coloración amarillenta de la piel (ictericia) o problemas hepáticos al tomar clarithromycin.

### No tome VOQUEZNA DUAL PAK si:


- se sabe que tiene alergia o es sensible a los componentes de VOQUEZNA DUAL PAK (vonoprazan, amoxicillin) o penicillin.
- está tomando medicamentos que contienen rilpivirine (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY).

## No recibir tratamiento para la *H. pylori* puede provocar problemas de salud



Estos problemas de salud incluyen irritación e hinchazón del estómago, llagas en el revestimiento protector del estómago llamadas úlceras y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer de estómago.

## Es importante que complete su tratamiento de 14 días basado en VOQUEZNA



Tomar todo el medicamento recetado por su médico según las indicaciones aumenta la probabilidad de eliminar la infección por *H. pylori*.

Si experimenta efectos secundarios que le preocupan, pregunte a su médico si debe interrumpir el tratamiento.

Obtenga más información sobre lo que hace que su tratamiento sea único en [VOQUEZNA.com/HP](https://www.wock.com/HP)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

**Antes de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:**

- está embarazada, cree que podría estar embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si VOQUEZNA dañará al feto.
- está amamantando. Si está amamantando, bombee y deseche la leche materna durante el tratamiento y hasta 2 días después del tratamiento.
- tiene problemas renales o hepáticos.
- tiene miastenia grave.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).

## SU RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE *H. PYLORI* CONTIENE ANTIBIÓTICOS Y UN BLOQUEADOR DE LOS ÁCIDOS, VONOPRAZAN



### Un bloqueador eficaz de los ácidos es importante para que el tratamiento tenga éxito

Los bloqueadores de ácido hacen que el estómago sea menos ácido, lo que ayuda a que los tratamientos para la *H. pylori* funcionen mejor. En su régimen basado en VOQUEZNA, vonoprazan es el bloqueador de los ácidos.



### Vonoprazan actúa rápidamente para reducir el ácido del estómago

Vonoprazan comienza a bloquear el ácido en un plazo de 2 a 3 horas.



### Vonoprazan se puede tomar con o sin alimentos

A diferencia de otros bloqueadores de los ácidos, no hay requisitos alimentarios con vonoprazan.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### Además, no tome VOQUEZNA TRIPLE PAK si:

- está embarazada o planifica quedar embarazada. La clarithromycin, un medicamento en VOQUEZNA TRIPLE PAK, puede dañar al feto.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Puede haber efectos secundarios graves cuando algunos se usan en combinación con este producto. Pueden producirse reacciones adversas graves con VOQUEZNA TRIPLE PAK debido a interacciones farmacológicas de clarithromycin con colchicina, algunos agentes hipolipemiantes, algunos bloqueadores de canales de calcio y otros fármacos.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK?

#### VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Reacciones alérgicas (hipersensibilidad):** llame a su médico inmediatamente si tiene erupción, urticaria u otros cambios en la piel, hinchazón de la cara o dificultad para respirar.

### Los bloqueadores del ácido ayudan a los antibióticos a funcionar mejor

Los antibióticos matan las bacterias de *H. pylori* para eliminar la infección. Funcionan mejor cuando hay menos ácido en el estómago.



Tomar un bloqueador de los ácidos, como vonoprazan, junto con antibióticos, mejora la probabilidad de eliminar la infección.

Estos regímenes basados en VOQUEZNA son medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK?

#### VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Un tipo de problema renal (nefritis tubulointersticial aguda):** algunas personas que toman vonoprazan, un componente de VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK, pueden presentar un problema renal llamado nefritis tubulointersticial aguda. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si nota una disminución en la cantidad que orina o si nota sangre en la orina.
- **Reacciones cutáneas graves:** VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar reacciones cutáneas graves, como erupción cutánea o reacción alérgica en o en cualquier parte del cuerpo. Los síntomas también pueden incluir, entre otros, fiebre, escalofríos, dolores corporales o dificultad para respirar. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK inmediatamente y llame a su médico de inmediato.
- **Hipersensibilidad gastrointestinal (síndrome de enterocolitis inducida por medicamentos):** se ha informado un tipo de reacción alérgica que causa inflamación en el intestino delgado y grueso con el uso de amoxicillin, un componente de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK, principalmente en pacientes  $\leq 18$  años de edad. Los síntomas incluyen vómitos que ocurren de 1 a 4 horas después de tomar el medicamento y también pueden estar asociados con palidez de la piel, cansancio, presión arterial baja, shock y diarrea dentro de las 24 horas posteriores a tomar amoxicillin. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK y notifique a su médico.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).

## REGÍMENES DE TRATAMIENTO APROBADOS POR FDA PARA AYUDARLE A ELIMINAR LA INFECCIÓN



### Probado en un ensayo clínico para eliminar la infección por *H. pylori*

En un ensayo clínico, se demostró que VOQUEZNA® Triple Pak® y VOQUEZNA® Dual Pak® se deshacen de la infección por *H. pylori* en más del 77 % de los pacientes después de un tratamiento de 14 días (en comparación con el 69 % con lansoprazol, amoxicillin y clarithromycin).



### Posibles efectos secundarios de su receta

En un ensayo clínico, los efectos secundarios frecuentes incluyeron: diarrea, alteración del sentido del gusto, infección vaginal por levaduras, dolor de estómago, dolor de cabeza, presión arterial alta y síntomas similares al resfriado.

Es posible que se produzcan otros efectos secundarios más graves. Consulte la Información importante de seguridad incluida en este folleto.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK? (cont.)

**VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK pueden causar efectos secundarios graves, incluidos (cont.):**

- **Diarrea intensa:** llame a su médico inmediatamente si tiene heces acuosas, dolor de estómago y fiebre que no desaparece mientras toma VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK o después de completar el tratamiento.
- **Erupción cutánea en pacientes con mononucleosis:** la amoxicillin (un componente de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK) puede causar erupción cutánea en pacientes con mononucleosis. Deje de tomar VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK si le diagnostican mononucleosis y llame a su médico inmediatamente.
- **Resultados alterados de la prueba para algunos tumores:** VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK reducen el ácido del estómago, lo que puede provocar un aumento de los niveles de una proteína determinada (CgA) en la sangre. Cuando se aumenta este nivel, pueden alterarse los resultados de la prueba para detectar algunos tumores. Informe a su médico del uso de VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK antes de los análisis de sangre.



“Aproximadamente un mes después de completar mi tratamiento de 14 días, mi médico me hizo la prueba y confirmó que la infección había desaparecido. ¡Espero que te funcione tanto a ti como a mí!”

*Los resultados individuales pueden variar.*

—LaDawn,  
paciente del ensayo clínico para VOQUEZNA® Dual Pak®

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK? (cont.)

**Además, VOQUEZNA TRIPLE PAK puede causar:**

- **Latidos irregulares:** la clarithromycin puede causar latidos cardíacos irregulares. Llame a su médico inmediatamente si se siente desmayado, mareado o si su corazón late irregularmente.
- **Problemas hepáticos:** llame a su médico inmediatamente si tiene alguno de los siguientes síntomas: pérdida de peso, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia), orina oscura, erupción cutánea o dolor en el lado derecho del abdomen.

**Los efectos secundarios más frecuentes pueden incluir:**


- diarrea
- cambios temporales en el sentido del gusto
- infección vaginal por levaduras
- dolor de estómago
- dolor de cabeza
- presión arterial alta y
- síntomas similares al resfriado

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).

## SU MÉDICO RECETÓ UNA DE ESTAS OPCIONES BASADAS EN VOQUEZNA PARA USTED



**Tome su medicación 2 veces al día:** por la mañana y por la noche, con 12 horas de diferencia.



Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.

**Tratamiento de 14 días** que se puede tomar con o sin alimentos

### SI OMITI UNA DOSIS DE VOQUEZNA® TRIPLE PAK®

Tome la siguiente dosis lo antes posible, a menos que hayan transcurrido 4 horas desde que se suponía que debía tomarla. Si han pasado más de 4 horas, salte la dosis omitida y, a continuación, tome la siguiente dosis a tiempo. Siga tomando su medicamento hasta que haya tomado todas las dosis del envase, incluso si los síntomas desaparecen.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### Los efectos secundarios más frecuentes pueden incluir (cont.):


Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VOQUEZNA TRIPLE PAK y VOQUEZNA DUAL PAK. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

### Información general sobre el uso seguro y eficaz de VOQUEZNA.

En ocasiones, los medicamentos se prescriben para fines distintos de los que se enumeran en el folleto informativo para el paciente. No utilice VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK para una afección para la que no se prescribió.



**Tome su medicación 3 veces al día:** por la mañana, a mediodía y por la noche.



Los comprimidos no muestran el tamaño real.

**Tratamiento de 14 días** que se puede tomar con o sin alimentos

### SI OMITI UNA DOSIS DE VOQUEZNA® DUAL PAK®

Tome la siguiente dosis lo antes posible, a menos que hayan transcurrido 4 horas desde que se suponía que debía tomarla. Si han pasado más de 4 horas, salte la dosis omitida y, a continuación, tome la siguiente dosis a tiempo. Siga tomando su medicamento hasta que haya tomado todas las dosis del envase, incluso si los síntomas desaparecen.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### Información general sobre el uso seguro y eficaz de VOQUEZNA. (cont.)

No administre VOQUEZNA TRIPLE PAK o VOQUEZNA DUAL PAK a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño.

Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

**Se recomienda que notifique las sospechas de reacciones adversas poniéndose en contacto con Phathom Pharmaceuticals en el 1-888-775-PHAT (7428) o la FDA al 1-800-FDA-1088 o [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).**

**Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).**

## OFERTAS DE AHORRO Y APOYO



### Su médico puede enviar su receta a BlinkRx

BlinkRx ayuda a identificar posibles ahorros disponibles para usted. Phathom Pharmaceuticals y BlinkRx trabajan juntos para facilitarle la administración de VOQUEZNA® Triple Pak® o VOQUEZNA® Dual Pak®.



**Fácil de usar.** BlinkRx se coordina con su seguro en su nombre.



**Obtenga el costo más bajo que tenga a su disposición.** BlinkRx identifica el costo de su medicación y la cobertura del seguro que tiene, y aplica las ofertas de ahorro para las que es elegible.



**Entrega gratuita a domicilio.** Un socio farmacéutico le entregará su receta gratuitamente a su puerta.

Después de que su médico envíe su receta, BlinkRx se comunicará con usted para comunicarle los detalles sobre cómo registrarse y utilizar su servicio. También tiene la opción de registrarse al 1 (844)-759-0782.

### Puede que sea elegible para esta tarjeta de ahorro

Si tiene un seguro comercial, es posible que pueda ahorrar en su receta. Puede registrarse para una tarjeta de ahorros [aquí](#).



#### TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Al utilizar la Tarjeta de Ahorro VOQUEZNA® Triple Pak®/VOQUEZNA® Dual Pak® ("tarjeta"), usted da fe de que cumple los requisitos de elegibilidad, acepta y cumplirá los términos y condiciones descritos a continuación.

En el caso de los pacientes con cobertura de seguro comercial de medicamentos para VOQUEZNA Triple Pak o VOQUEZNA Dual Pak: la oferta es válida por hasta 2 surtidos de VOQUEZNA Triple Pak o VOQUEZNA Dual Pak. El paciente debe tener un seguro comercial de medicamentos con cobertura del proveedor de seguro para VOQUEZNA Triple Pak o VOQUEZNA Dual Pak a fin de pagar apenas \$25. La oferta está sujeta a un límite por surtido de \$316 y demás limitaciones del programa.

Debe tener 18 años de edad o más para reembolsar esta oferta. El paciente es responsable de los correspondientes impuestos, honorarios, importes que superen los límites por surtido y del programa o los costos que puedan ser aplicables después de que se alcancen los límites de reembolso, incluidos los importes adicionales de copagos y coseguros. Esta oferta no es válida en el caso de los pacientes sin seguro comercial de medicamentos o cuyas reclamaciones de recetas por VOQUEZNA Triple Pak o VOQUEZNA Dual Pak sean elegibles para reembolso, total o parcial, por parte de cualquier programa gubernamental, incluidos, aunque solo a modo de ejemplo, Medicaid, Medicare, Medicare Parte D, Medigap, Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD), Administración de Veteranos (Veteran Administration, VA), TRICARE®/CHAMPUS o de cualquier programa estatal de asistencia para pacientes o farmacéutica. Esta oferta no es válida para los residentes de Massachusetts si se dispone de un genérico equivalente con calificación AB ni para los residentes de California si se dispone de un equivalente terapéutico aprobado por la FDA. Disponible solo en los EE. UU. para residentes de los EE. UU. Al aceptar esta oferta, usted acepta que si tiene que hacerlo según los términos de su cobertura de seguro para esta receta o si la ley lo exige, debe notificar a su compañía de seguros el reembolso de esta tarjeta. Al reembolsar esta oferta, usted y el farmacéutico acuerdan no solicitar el reembolso de todo o parte del beneficio que usted reciba a través de la tarjeta de ahorro de ningún tercero, como planes de seguro, planes de gastos flexibles o cuentas de ahorro médico.

Esta tarjeta caduca el 12/31/2025. Esta oferta no se puede combinar ni utilizar con ningún otro programa, descuento, tarjeta de descuento, tarjeta de descuento en efectivo, cupón, incentivo u oferta similar que implique VOQUEZNA Triple Pak o VOQUEZNA Dual Pak. Está prohibido que cualquier persona venda, compre o comercialice, o que ofrezca vender, comprar o comercializar, o que falsifique esta tarjeta. **Phathom Pharmaceuticals, Inc. puede terminar, rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Se requiere activación de la tarjeta. Esta tarjeta no es un seguro médico.** Cierta información relativa a su uso de esta tarjeta se compartirá con Phathom, el patrocinador de la tarjeta y las empresas que trabajan en nombre de Phathom. Para obtener más información, consulte la Política de privacidad de Phathom en <https://www.phathompharma.com/privacy-policy/>.



## APROBADO POR LA FDA: UN TRATAMIENTO ÚNICO DE 14 DÍAS



Contiene el bloqueador de ácido vonoprazan, que comienza a bloquear el ácido rápidamente y ayuda a mejorar la capacidad de los antibióticos para matar las bacterias de *H. pylori*



Se ha demostrado en un ensayo clínico que elimina la *H. pylori* en la mayoría de los pacientes después de 14 días de tratamiento



Se puede tomar con o sin alimentos



En un ensayo clínico, los efectos secundarios frecuentes incluyeron: diarrea, alteración del sentido del gusto, infección vaginal por levaduras, dolor de estómago, dolor de cabeza, presión arterial alta y síntomas similares al resfriado

**Para obtener más información,  
comuníquese con su médico o visite  
[VOQUEZNA.com/HP](https://www.woyuzna.com/HP)**

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### No tome VOQUEZNA TRIPLE PAK si:

- se sabe que tiene alergia o es sensible a los componentes de VOQUEZNA TRIPLE PAK (vonoprazan, amoxicillin, clarithromycin), antibióticos macrólidos (como azithromycin y erythromycin) o penicillin.

### No tome VOQUEZNA DUAL PAK si:

- se sabe que tiene alergia o es sensible a los componentes de VOQUEZNA DUAL PAK (vonoprazan, amoxicillin) o penicillin.
- está tomando medicamentos que contienen rilpivirine (EDURANT, COMPLERA, JULUCA, ODEFSEY).

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, así como la [Información de prescripción completa](#).