

 **VOQUEZNA Triple Pak**[®]
vonoprazan tablets 20 mg
amoxicillin capsules 500 mg
clarithromycin tablets 500 mg

 **VOQUEZNA Dual Pak**[®]
vonoprazan tablets 20 mg
amoxicillin capsules 500 mg

帮助抵御幽 门螺杆菌感 染的力量

了解幽门螺杆菌和独特的
14 天疗法

了解有关储蓄选
项的信息

(第 10 页和第 11 页)

适应症和重要安全性信息

什么是 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK?

- VOQUEZNA[®] TRIPLE PAK[®] (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules, clarithromycin tablets) 和 VOQUEZNA[®] DUAL PAK[®] (vonoprazan tablets, amoxicillin capsules) 是包装在一起的处方药，用以治疗成人幽门螺杆菌 (*H. pylori*) 细菌感染。
- 尚不清楚 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 对儿童是否安全有效。
- 为减少耐药菌的产生并保持 VOQUEZNA TRIPLE PAK、VOQUEZNA DUAL PAK 和其他抗菌药物的有效性，这些产品只能用以治疗或预防经证实或强烈怀疑由易感细菌引起的感染。

如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK:

- 已知对 VOQUEZNA TRIPLE PAK 的成分 (vonoprazan, amoxicillin, clarithromycin)、大环内酯类抗生素 (如阿奇霉素和红霉素) 或青霉素过敏或敏感。

请参阅整份文档中的其他“重要安全信息”和完整的“[处方信息](#)”。

幽门螺杆菌感染和治疗的基本信息



幽门螺杆菌是一种发病于胃内的细菌感染。

这种感染可能会引起胃部疼痛或烧灼感、恶心、腹胀、食欲不振和频繁打嗝等症状。

幽门螺杆菌无论有无症状，一经发现都应及时治疗，因为它具有传染性。对幽门螺杆菌不加以治疗会增大相关健康问题的风险。



幽门螺杆菌很常见

据估计，全球 50% 的人口和美国 36% 的人口感染了幽门螺杆菌。



重要安全性信息（续）

如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK：

- 正在使用：
 - 含有利匹韦林的药物（如 EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY）
 - 匹莫齐特
 - 秋水仙碱，如果您有肾脏或肝脏问题
 - 洛美他派、洛伐他汀和辛伐他汀
 - 麦角生物碱（麦角胺或双氢麦角胺）
 - 鲁拉西酮
- 有使用克拉霉素时皮肤变黄（黄疸）或出现肝脏问题的病史。
- 已怀孕或计划怀孕，除非在临床条件下您的医务人员确定没有合适的替代疗法。VOQUEZNA TRIPLE PAK 中的克拉霉素可能会对胎儿造成伤害。

对幽门螺杆菌不加以治疗会导致健康问题

这些健康问题包括胃部刺激和肿胀、胃黏膜保护层内长疮（称为溃疡）以及患上某类型胃癌的风险增大。



完成基于 VOQUEZNA 的 14 天治疗非常重要

遵照医嘱服用医生开给的所有药物，有助于增加摆脱幽门螺杆菌感染的机会。



如果出现令您担忧的副作用，请咨询您的医生是否应该停止治疗。

请访问 [VOQUEZNA.com/HP](https://www.voquezna.com/HP) 了解有什么会让您的治疗独特的更多信息。

重要安全性信息（续）

如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA DUAL PAK：

- 已知对 VOQUEZNA DUAL PAK 的成分（伏诺拉生、阿莫西林）或青霉素过敏或敏感。
- 正在使用含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY）。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的“[处方信息](#)”。

您的幽门螺杆菌治疗方案包含抗生素和酸阻滞剂伏诺拉生



有效的酸阻滞剂对于治疗成功非常重要

酸阻滞剂可使胃酸减少，有助于幽门螺杆菌治疗更好起效。在基于 VOQUEZNA 的治疗方案中，伏诺拉生是酸阻滞剂。



伏诺拉生能迅速减少胃酸

在一项健康成人研究中，伏诺拉生在 2 至 3 小时内开始抑制胃酸分泌。



伏诺拉生可与食物或不与食物同服

与其他一些酸阻滞剂不同的是，对于伏诺拉生未设食物要求。



重要安全性信息（续）

在服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 已怀孕、认为自己可能怀孕了或计划怀孕。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会给胎儿造成伤害。
- **妊娠暴露注册登记研究：**针对妊娠期间服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 的女性设有妊娠注册登记研究。本注册登记研究的目的是收集有关您和您孩子的健康状况的信息。如果您已怀孕或在 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 治疗期间怀孕，请与您的医务人员讨论如何参加本妊娠登记研究，或者您可以致电 1-866-609-1612 或访问。<https://voqueznapregnancyregistry.com/> 自行注册。

酸阻滞剂有助于抗生素更好地发挥效用

抗生素可杀灭幽门螺杆菌以清除感染。胃酸较少时，它们的效果会更好。

连同抗生素一起服用酸阻滞剂（如伏诺拉生）时，可提高清除感染的几率。



这些基于 VOQUEZNA 的疗方属于美国 FDA 批准的用药

重要安全性信息（续）

在服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 正在母乳喂养或计划母乳喂养。您和您的医务人员应决定您是否要在母乳喂养时服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK。
- 肾脏或肝脏问题。
- 患有重症肌无力。

告诉您的医务人员您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。

当某些药物与本品同时使用时，可能会引发严重的副作用。由于克拉霉素与秋水仙碱、某些降脂药、某些钙通道阻滞剂和其他药物的药物相互作用，VOQUEZNA TRIPLE PAK 可导致严重不良反应。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性”和完整的“处方信息”。

FDA 批准的治疗方案，用以帮助您清除感染



经临床试验证明可摆脱幽门螺杆菌感染

一项临床试验证明，经过 VOQUEZNA® Triple Pak® 和 VOQUEZNA® Dual Pak® 14 天治疗后，有 77% 以上的患者摆脱了幽门螺杆菌感染（相比之下，使用兰索拉唑、阿莫西林和克拉霉素的患者中达到此效果的为 69%）。



处方药可能产生的副作用

在一项临床试验中，常见的副作用包括：腹泻、味觉改变、阴道酵母菌感染、胃痛、头痛、高血压和类感冒症状。

还可能出现其他更严重的副作用。请参阅本手册通篇纳入的“重要安全性信息”。

重要安全性信息（续）

VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起哪些副作用？

VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重的副作用，包括：

- **过敏反应（超敏反应）：**如果出现皮疹、荨麻疹或其他皮肤变化，脸部肿胀或呼吸困难，请立即致电您的医生。
- **一种肾脏问题（急性肾小管间质性肾炎）：**有些人服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 的成分之一伏诺拉生后可能出现称为急性肾小管间质性肾炎的肾脏问题。如果您的尿量减少或您发现尿液带血，请立即致电您的医务人员。
- **严重皮肤反应：**VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重皮肤反应，如皮疹或身体任何部位的过敏反应。症状还可能包括但不限于发烧、寒战、身体酸痛或气短。如果您出现上述任何症状，请立即停用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK，并立即致电您的医生。



“完成 14 天治疗约一个月后，我的医生为我做了检测，确认感染已经消退。我希望它能像对我一样也对您有效！”

个体结果可能会有所不同。

- LaDawn,
参加 VOQUEZNA® Dual Pak® 临床试验的患者

重要安全性信息（续）

VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起哪些副作用？

VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重的副作用，包括：

- **胃肠道超敏反应（药物性小肠结肠炎综合征）：**使用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 的成分之一阿莫西林曾后，报告过一种引起小肠和大肠炎症的过敏反应，主要发生在 ≤18 岁的患者中。症状包括服用阿莫西林后 1 至 4 小时内呕吐，并可能伴有面色苍白、疲倦、低血压、休克，以及服药后 24 小时内出现腹泻。如果您出现上述任何症状，请停用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK，并联系您的医生。
- **严重腹泻：**如果您在服用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 期间或完成治疗后出现水样便、胃痛和持续不退的发烧，请立即致电您的医生。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的“[处方信息](#)”。

您的医生给您开出了基于 VOQUEZNA 的以下方案之一



所示药片非实际尺寸。

14 天治疗，可与食物也可不与食物同服

如果您漏服了一剂 VOQUEZNA® TRIPLE PAK®

请尽快服用下一剂，除非离原定的服药时间已过去 4 小时。如果已过去 4 小时以上，请跳过该漏服的剂量，而是按时服用下一剂。即使症状消退了，也要继续服药至服完药物包装中的所有剂量。


重要安全性信息 (续)

VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起哪些副作用？

VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 可引起严重的副作用，包括：

- **单核细胞增多症患者出现皮疹：**阿莫西林 (VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 的一种成分) 可能会导致单核细胞增多症患者出现皮疹。如果确诊患有单核细胞增多症，请停用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK，并立即致电您的医生。
- **改变某些肿瘤的检测结果：**VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 降低了胃酸，这会导致血液中某种蛋白质 (CgA) 水平升高。这一水平升高时，某些肿瘤的检测结果可能改变。验血之前，请通知您的医生您使用 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 的情况。

每天服药 3 次：早、午、晚各一次。



所示药片非实际尺寸。

14 天治疗，可与食物也可不与食物同服

如果您漏服了一剂 VOQUEZNA® DUAL PAK®

请尽快服用下一剂，除非离原定的服药时间已过去 4 小时。如果已过去 4 小时以上，请跳过该漏服的剂量，而是按时服用下一剂。即使症状消退了，也要继续服药至服完药物包装中的所有剂量。

重要安全性信息 (续)

此外，VOQUEZNA TRIPLE PAK 还可能引起：

- **心律不齐：**克拉霉素可能引起心律不齐。如果感到晕厥、头昏眼花或心脏跳动无规律，请立即致电您的医生。
- **肝脏问题：**如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生：体重减轻、皮肤和眼睛发黄 (黄疸)、尿色深暗、皮疹，或腹部右侧疼痛。

最常见的副作用可能包括：

- 腹泻
- 短暂的味觉变化
- 阴道酵母菌感染
- 胃痛
- 头痛
- 高血压和
- 类感冒症状

请参阅整份文档中的其他“重要安全性”和完整的“处方信息”。

储蓄和支持优惠



您的医生可能会将您的处方发送至 BlinkRx*

BlinkRx 可帮助您找到潜在的节省。Phathom Pharmaceuticals 和 BlinkRx 携手帮助您轻松取得 VOQUEZNA® Triple Pak® 或 VOQUEZNA® Dual Pak®。

BLINKRx



易于使用。 BlinkRx 代表您与保险公司协调。



获得您可用的最低自付费用。 BlinkRx 可确定您的药费和您的保险承保范围，然后为您套用符合资格的任何节省优惠。



免费送药上门。 合作的药房将会免费送药上门。

在医生发送处方后，BlinkRx 将与您联系，详细告知您要如何注册和使用其服务。您还可以选择当场致电 1 (844)-759-0782 进行注册。

您可能有资格享用这张储蓄卡

如果您有商业保险，也许可以节省您的处方药费用。您可以在[此处](#)注册储蓄卡。



有关完整的条款和条件，请点击[此处](#)。

重要安全性信息（续）

这些并非 VOQUEZNA TRIPLE PAK 和 VOQUEZNA DUAL PAK 可能引起的所有副作用。如需了解针对副作用的医疗建议，请致电您的医务人员。

*BlinkRx 不是保险。将您的处方发送至 BlinkRx，即表示您授权 BlinkRx（简称“Blink”）发送与您的处方相关的短信通知。可能会产生短信和数据流量费用。短信发送的频率会有所变化。普通短信可能并不完全安全。提供同意不是通过 Blink 购买商品或服务的条件。您可以回复任意短信，发送 HELP 获取帮助，或发送 STOP 停止并撤销您的同意。访问 www.blinkrx.com/legal 查看 Blink 的 HIPAA 隐私声明和使用条款。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”和完整的[“处方信息”](#)。



VOQUEZNA TriplePak.
vonoprazan tablets 20 mg
amoxicillin capsules 500 mg
clarithromycin tablets 500 mg



VOQUEZNA DualPak.
vonoprazan tablets 20 mg
amoxicillin capsules 500 mg

FDA 批准：独特的 14 天治疗



含有酸阻滞剂伏诺拉生--它能迅速开始阻滞酸质，有助于提高抗生素杀灭幽门螺杆菌的能力



有一项临床试验证明，经过 14 天治疗，大多数患者都能摆脱幽门螺杆菌



可与食物或不与食物同服



最常见的副作用可能包括：腹泻、短暂的味觉改变、阴道酵母菌感染、胃痛、头痛、高血压和类感冒症状

若要了解更多信息，请联系您的医生或访问
VOQUEZNA.com/HP

重要安全性信息（续）

关于安全有效使用 VOQUEZNA 的通用信息。

药物有时并非为了患者需知信息单中列出的目的而开出。请勿将 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 用于处方以外的疾病。切勿将 VOQUEZNA TRIPLE PAK 或 VOQUEZNA DUAL PAK 给其他人服用，哪怕他们出现了与您相同的症状。这样做可能会伤害他们。

如需了解更多信息，请咨询您的医务人员或药剂师。

我们建议您通过联系 Phathom Pharmaceuticals，电话：1-888-775-PHAT (7428) 或 FDA，电话：1-800-FDA-1088 或 www.fda.gov/medwatch 报告可疑不良反应。

请参阅整份文档中的其他“重要安全信息”和完整的“[处方信息](#)”。