

用于糜烂性食管炎成人患者的愈合和缓解烧心，
以及非糜烂性胃食管反流病(GERD)病成人患者中缓解烧心



VOQUEZNA[®]
(vonoprazan) tablets ^{10mg}/_{20mg}

VOQUEZNA
击退胃酸

这是其类别中首个且唯一
获得美国食品药品监督管理局
(FDA) 批准的治疗方法，是一
种钾竞争性酸阻滞剂 (PCAB)。

符合资格的患者使用
VOQUEZNA 储蓄卡，
可支付低至 **\$25***。

*患者必须有商业保险才符合资格。另有其他
资格规定。“条款和条件”全文请见
[第31页](#)。

重要安全性信息

如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA

- 对 VOQUEZNA 中的沃诺拉赞或任何其他成分过敏。过敏反应症状可能包括难以呼吸、皮疹、瘙痒以及脸、唇、舌或喉肿胀。
- 正在服用一种含有利匹韦林的药物 (EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY)，用于治疗 HIV-1 (人类免疫缺陷病毒)。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“[患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。



VOQUEZNA 击退胃酸

适应症

什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) 是一种供成人服用的处方药：
 - 疗程为 8 周，以愈合食道内壁与酸有关的损伤（称为糜烂性食管炎），并缓解与糜烂性食管炎有关的烧心。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“[患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。

目录

- 4 [VOQUEZNA 发挥效用的方式不同](#)
- 8 [愈合](#)
- 10 [缓解烧心](#)
- 16 [如何服用 VOQUEZNA](#)
- 18 [有用提示](#)
- 20 [安全信息](#)
- 22 [关于 GERD](#)
- 30 [节省费用和支持](#)





VOQUEZNA 发挥效用的方式 不同

VOQUEZNA (沃诺拉赞) 是首个也是唯一一个获得 FDA 批准的治疗药物。并非所有治疗方法都适用于每个人。如果您的症状持续存在，请与医生讨论您的选择。



随餐或
不随餐

VOQUEZNA 是一种称为钾竞争性酸阻滞剂 (PCAB) 的药物。与大多数质子泵抑制剂 (PPI) 不同，PCAB 可随餐服用，也可不随餐服用。

适应症 (续)

什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) 是一种供成人服用的处方药：
 - 疗程为 6 个月，以维持糜烂性食管炎的愈合，并缓解与糜烂性食管炎有关的胃灼热症状。

VOQUEZNA 在起作用



服用 VOQUEZNA 后，药物会进入胃部与质子泵结合。



在这里，VOQUEZNA 阻止钾与泵结合。这会阻止质子泵工作。



质子泵无法工作时，就不能再产生酸。VOQUEZNA 可以帮助抑酸 24 小时。

适应症 (续)

什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) 是一种供成人服用的处方药：
 - 用于缓解胃食管反流病 (GERD) 相关的烧心，疗程 4 周。

目前尚不清楚 VOQUEZNA 对儿童是否安全有效。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。



VOQUEZNA®
(vonoprazan) tablets 10mg
20mg



VOQUEZNA 迅速开始抑制酸分泌

一项由健康成人参加的临床试验表明，VOQUEZNA（沃诺拉赞）可在 2-3 小时内减少酸质，并在 24 小时内维持抑酸效果。

在2-3小时内



减酸量



重要安全性信息（续）

在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 血中镁、钙或钾含量低，或者您正在使用增加尿量的药物（利尿剂）。
- 肾脏或肝脏问题。



* VOQUEZNA 治愈了我的糜烂性食管炎。

KEVIN，VOQUEZNA 临床试验患者
患有糜烂性食管炎



* 个体结果可能会有所不同。
该患者因分享他在试验中的个人体验而获得了 Phathom 的补偿。

查看 Kevin 的更多故事 >

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。




VOQUEZNA[®]
(vonoprazan) tablets 10mg
20mg



VOQUEZNA 击退胃酸， 帮助治疗和维持糜烂性 食管炎的愈合。

事实证明，VOQUEZNA（沃诺拉赞）可帮助大多数成人糜烂性食管炎（EE）患者获得彻底治愈，并可持续存在。



食管糜烂的表现

重要安全性信息（续）

在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 已怀孕、认为自己可能怀孕了或计划怀孕。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会给胎儿造成伤害。

经证实可治愈糜烂性食管炎

VOQUEZNA 在一项临床试验中进行了评估，该试验针对的是经内窥镜确诊的 EE 成人患者。其中一组在愈合阶段每天一次服用 VOQUEZNA 20 毫克，持续 2 到 8 周。在服用 VOQUEZNA 治疗 EE 的成人中，有 93% 到 2 个月时愈合（相比之下，使用其他疗法达到此效果者为 85%*）。

一些成人在愈合阶段通过 VOQUEZNA 或其他治疗方法获得愈合，然后在维持阶段每天一次服用 VOQUEZNA 10 毫克，持续长达 6 个月。其中有 79% 服用 VOQUEZNA 维持治疗者保持了 6 个月的愈合（相比之下，使用其他疗法达到此效果者为 72%*）。



93% 的成人

服用 VOQUEZNA 后在 2 个月内实现了 EE（糜烂性食管炎）愈合，而使用另一种治疗的患者中只有 85% 达到这一效果。*

已愈合者中



79% 的成人

使用 VOQUEZNA 维持愈合达 6 个月，而使用其他治疗维持愈合者为 72% *

* 兰索拉唑

重要安全性信息（续）

在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 正在母乳喂养或计划母乳喂养。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会进入母乳。您和您的医务人员应决定 您是否要服用 VOQUEZNA 或进行母乳喂

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。





助力 患者 在一段日子内实现无烧心

经验证，VOQUEZNA（沃诺拉赞）可帮助患有非糜烂性胃食管反流病（GERD）或糜烂性食管炎（EE）的成年人在一段日子内实现无烧心。

重要安全性信息（续）

哺。您不应该两者兼行。

告诉您的医务人员您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。保存一份药物清单，以



**经证明
有助于缓解
烧心**

**适用于非糜烂性胃食管反流病
(GERD)和糜烂性食管炎**

重要安全性信息（续）

VOQUEZNA 可能影响其他药物的效用，反之亦然。如果您接受了含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY），尤其要告诉您的

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“[患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。



缓解成人非糜烂性 GERD 患者的烧心症状

在一项针对患有非糜烂性胃食管反流病（GERD）的成人服用 VOQUEZNA (沃诺拉赞) 的临床试验中，受试者被要求记录他们出现烧心的天数和烧心症状的严重程度。在治疗结束时检查日记，以确定据报告有多少天没有烧心。



VOQUEZNA 治疗期间，有 45% 的时间患者享受到了全天 24 小时无烧心的舒适，而接受安慰剂治疗的患者中，这一比例仅为 28%。

重要安全性信息（续）

VOQUEZNA 可能引起哪些副作用？

VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- **一种肾脏问题（急性肾小管间质性肾炎）：**有些人服用 VOQUEZNA 后可能出现称为急性肾小管间质性肾炎的肾脏问题。如果您的尿量减少或您发现尿液带血，请立即致电您的医务人员。
- **由肠道感染（艰难梭状芽孢杆菌）引起的腹泻：**如果出现水样便、胃痛和发烧不退的情况，请立即致电您的医务人员。
- **骨折（腕部、腕部或脊柱）：**长期（一年或更长时间）每天多次服用另一种称为质子泵抑制剂（PPI 药物）、用以减少胃酸的药物者可能会发生



*** 我非常高兴地分享，得益于 VOQUEZNA 的帮助，烧心已经不再主宰我的生活。**

CARSON, 一位患有非糜烂性胃食管反流病 (GERD) 的 VOQUEZNA 临床试验患者。



* 个体结果可能会有所不同。
该患者因分享他在试验中的个人体验而获得了 Phathom 的补偿。

重要安全性信息（续）

腕部、手腕或脊椎骨折。如果您骨折，尤其是发生在腕部、腕部或脊柱，请告诉医务人员。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。



VOQUEZNA[®]
(vonoprazan) tablets 10mg / 20mg

缓解糜烂性食管炎成人的烧心症状

在一项针对服用 VOQUEZNA（沃诺拉赞）的糜烂性食管炎（EE）成人患者的临床试验中，受试者被要求记录他们出现烧心症状的天数以及烧心症状的严重程度。在治疗结束时检查日记，以确定据报告有多少天没有烧心。



在 2 个月的愈合阶段，服用 VOQUEZNA 的日子里，有 67% 的天数在全天 24 小时均未出现烧心（相比之下，使用其他疗法达到此效果的天数为 64%*）。在 6 个月的维持期，服用 VOQUEZNA 的日子里，有 81% 的天数在全天 24 小时均未出现烧心（相比之下，使用其他疗法达到此效果的天数为 79%*）。

* 兰索拉唑



重要安全性信息（续）

VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- **严重皮肤反应：**VOQUEZNA 可引起罕见但严重且可能影响身体任何部位的皮肤反应。这些严重的皮肤反应可能需要上医院治疗，且可能危及生命：
 - 皮疹，可能表现为皮肤的任何部位出现水泡、剥落或出血。
 - 您可能还会发烧、寒战、身体酸痛、气短，或淋巴结肿大。

如果您出现上述任何症状，请停用 VOQUEZNA，并立即致电您的医务人员。这些症状可能是严重皮肤反应的先兆。

重要安全性信息（续）

VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- **维生素 B12 水平低：**VOQUEZNA 可降低胃酸的数量。身体需要胃酸才能正常吸收维生素 B12。如果您有维生素 B12 水平低的症状，包括心律不齐、气短、头昏眼花、手臂或腿部刺痛或麻木、肌肉无力、皮肤苍白、感觉疲倦或情绪变化，请告诉您的医务人员。如果您长期服用 VOQUEZNA，请向医务人员咨询维生素 B12 水平低的风险。

请参调整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。





如何服用 VOQUEZNA

VOQUEZNA（沃诺拉赞）是一种每日服用一次的药片，用于治疗因非糜烂性胃食管反流病（GERD）或糜烂性食管炎引起的烧心症状。**可与食物或不与食物同服。**您的用药计划可能与下一页所列出的类似。

重要安全性信息（续）

医务人员。

VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- 服用 VOQUEZNA 者可能会出现体内镁水平低的情况。如果您有镁水平低的症状，包括癫痫发作、头晕、心律不齐、烦躁不安、肌肉酸痛或无力，或手、

给药计划

缓解非糜烂性胃食管反流病(GERD)相关的烧心症状。



一片 10 毫克药片
每日一次
连服 4 周

治愈糜烂性食管炎
并缓解相关的烧心症状



一片 20 毫克药片
每日一次
连服 8 周

维持痊愈的
糜烂性食管炎并缓解相关的烧心症状



一片 10 毫克药片
每日一次
最长服用 6 个月

所示药片非实际尺寸。

请咨询您的医生，以确定适宜您采用的管理计划。

重要安全性信息（续）

脚或声音痉挛，请立即告知您的医务人员。

- **胃增生（胃底腺息肉）**：长期服用另一种称为质子泵抑制剂（PPI）、用以减少胃酸的药物者，有可能患上一种叫做胃底腺息肉的胃增生。如果您长期服用 VOQUEZNA，请向您的医务人员咨询发生胃底腺息肉的可能性。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。



服用 VOQUEZNA 时的有用提示



很灵活，可随餐或不随餐服用

与大多数质子泵抑制剂 (PPIs) 不同，VOQUEZNA (沃诺拉赞) 是一种每日一次的口服药物，可与食物或不与食物同服，也就是说，您不必在进餐前后服药。请记住，您应始终遵照医生处方服用 VOQUEZNA。

整片吞服

咀嚼或碾碎药片可能会产生苦味。

所示药片非实际尺寸或颜色。



重要安全性信息 (续)

VOQUEZNA 用于治疗糜烂性食管炎和/或缓解胃食管反流病引起的烧心时最常见的副作用包括：

- 胃炎
- 腹泻
- 胃胀气
- 胃痛
- 恶心
- 消化不良
- 便秘
- 高血压
- 尿路感染



小诀窍：

建议您在每日固定活动结束后立即服用 VOQUEZNA。这样做可帮助您将服药变成日常例行事项。

漏服了一剂？



如果错过一次服药，请尽快服用下一次 – 除非已经过去了 12 小时。如果已过去 12 小时以上，请跳过该漏服的剂量，而是按时服用下一剂。

重要安全性信息 (续)

这些并非 VOQUEZNA 可能引起的所有副作用。如需了解更多信息，请咨询您的医务人员或药剂师。如需了解针对副作用的医疗建议，请致电您的医务人员。

我们鼓励您拨打 1-888-775-PHAT (7428) 联系 Phathom Pharmaceuticals，或拨打 1-800-FDA-1088 联系 FDA，或访问 www.fda.gov/medwatch，以报告可疑不良反应。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。





安全性和副作用

在对患有非糜烂性胃食管反流病（GERD）或糜烂性食管炎的成人进行的临床试验中对 VOQUEZNA（沃诺拉赞）进行了评估。

下一页所列最常见的副作用并非可能出现的全部副作用。如需查看可能出现的副作用完整清单，请参阅完整的“[处方信息](#)”。

非糜烂性胃食管反流病 (GERD) (4 周)

成人服用 VOQUEZNA 10 毫克时最常见的副作用有：

副作用	VOQUEZNA 10 毫克 259 名成人
胃痛	2%
便秘	2%
腹泻	2%
恶心	2%
尿路感染	2%

糜烂性食管炎愈合期 (长达 2 个月)

成人服用 VOQUEZNA 20 毫克时最常见的副作用有：

副作用	VOQUEZNA 20 毫克 514 名成人
胃炎	3%
腹泻	2%
胃胀气	2%
胃痛	2%
恶心	2%

糜烂性食管炎维持期 (6 个月)

成人服用 VOQUEZNA 10 毫克时最常见的副作用有：

副作用	VOQUEZNA 10 毫克 296 名成人
胃炎	6%
胃痛	4%
消化不良	4%
高血压	3%
尿路感染	3%

请参阅整份文档中的其他“[重要安全性信息](#)”，以及“[患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。





关于 GERD 的须知

胃食管反流病（GERD）是一种慢性疾病，当胃酸流入食管并造成刺激时就会发病。

胃食管反流病主要有两种类型：

- 非糜烂性胃食管反流病（GERD）
- 糜烂性食管炎 (EE)

胃食管反流病对哪些人有影响？

GERD 是最常见的消化系统疾病之一，在美国影响着 6500 万人。



糜烂性食管炎 (EE) vs 非糜烂性胃食管反流病 (GERD)

EE 是 GERD 的一种，食管会受到与酸有关的损害。非糜烂性胃食管反流病（GERD）不会对食管造成损伤，也比较常见。烧心在这两种病症中都很常见。

有约2/3

GERD 患者患的是非糜烂性胃食管反流病 (GERD)

持续的烧心

许多 EE 患者尽管服用了抗酸剂、组胺-2 受体拮抗剂 (H2s) 或质子泵抑制剂 (PPIs) 等药物，但仍会感到食道内有酸。



有 58% 的患者

患有 EE, 且在接受治疗期间仍出现烧心

可能增加您患胃食管反流病（GERD）几率的因素包括：

- 食管裂孔疝
- 肥胖症
- 食管下括约肌不能正常闭合
- 胃排空延迟

GERD 有哪些相关症状？



最常见的症状是烧心和反胃。其他可能出现的症状包括：

- 吞咽困难或疼痛
- 慢性咳嗽
- 胸痛

如何诊断 GERD？

要诊断 GERD，医生会问您几个问题，并可能进行身体检查。

要诊断糜烂性食管炎（EE），需要进行内窥镜检查。内窥镜检查是一种将装有微型摄像头的细管放入喉咙之下的医疗程序。



GERD 的治疗历史

1928

首个抗酸剂获准使用

抗酸剂可以中和胃中的酸，帮助缓解烧心。这些药物一般都是非处方药，用于缓解症状。

1977

首个组胺-2受体拮抗剂（H2）获准使用

H2 受体阻断剂通过干预胃酸生成的早期环节，有效降低了胃内酸的生成量。H2 可治疗与胃食管反流相关的烧心症状。

1989

第一种质子泵抑制剂（PPI）获准用于

PPI 是治疗胃食管反流病的常用药物。它们通过阻断胃酸分泌的最后一步来治疗胃食管反流病。它们会被胃酸激活，大多数 PPI 必须在饭前 30-60 分钟服用。

2023

VOQUEZNA®（沃诺拉赞）作为第一种钾竞争性酸阻滞剂获准使用

2024

2023 年，VOQUEZNA 作为首款钾竞争性胃酸阻滞剂（PCAB）获得批准，用于治疗胃食管反流病及其症状，之后又于 2024 年获准用于缓解非糜烂性胃食管反流病（GERD）引起的烧心。PCABs 通过阻断胃酸分泌的最后一步发挥作用--它们不需要被胃酸激活，可以在随餐或不随餐的情况下服用。

与医生沟通

说到胃食管反流病（GERD），并不是每种治疗方法都适合所有人。如果您一直在想是否适合采用不同的治疗方案，那么现在可能是时候与您的医生谈谈了。



✓ 要及时。

如果您不向医生及时反映那些令人困扰的症状，那么您可能会延迟治愈糜烂性食管炎（EE）的损伤或缓解相关的烧心症状。

要实事求是。

✓ 医生找到适合您的治疗方法的最佳途径是收集所有事实。不要对医生感到害羞。他们是最值得信赖的伙伴。

谈话要有描述性。

✓ 每一个细节都至关重要。您的症状每天什么时候出现？您的症状持续时间有多长？请告诉医生这些细节，以便他们确定最适合您的治疗方法。

适应症和重要安全性信息

什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA®（沃诺拉赞）是一种供成人服用的处方药：
 - 疗程为 8 周，用于治愈食道内壁与酸有关的损伤（称为糜烂性食管炎），以及缓解与糜烂性食管炎有关的烧心症状。
 - 疗程为 6 个月，以维持糜烂性食管炎的愈合，并缓解与糜烂性食管炎有关的胃灼热。
 - 用于缓解胃食管反流病（GERD）引起的烧心，疗程为 4 周。

目前尚不清楚 VOQUEZNA 对儿童是否安全有效。

如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA

- 对 VOQUEZNA 中的沃诺拉赞或任何其他成分过敏。过敏反应症状可能包括难以呼吸、皮疹、瘙痒以及脸、唇、舌或喉肿胀。
- 正在服用一种含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY、CABENUVA），用于治疗 HIV-1（人类免疫缺陷病毒）。

在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 血中镁、钙或钾含量低，或者您正在使用增加尿量的药物（利尿剂）。
- 肾脏或肝脏问题。
- 已怀孕、认为自己可能怀孕了或计划怀孕。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会给胎儿造成伤害。
- 正在母乳喂养或计划母乳喂养。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会进入母乳。您和您的医务人员应决定您是否要服用 VOQUEZNA 或进行母乳喂养。您不应该两者兼行。



重要安全性信息 (续)

告诉您的医务人员您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。保存一份药物清单，以便在获取新药时出示给医务人员和药剂师。

VOQUEZNA 可能影响其他药物的效用，反之亦然。如果您接受了含有利匹韦林的药物 (EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY)，尤其要告诉您的医务人员。

VOQUEZNA 可能引起哪些副作用？

VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- **一种肾脏问题 (急性肾小管间质性肾炎)：** 有些人服用 VOQUEZNA 后可能出现称为急性肾小管间质性肾炎的肾脏问题。如果您的尿量减少或您发现尿液带血，请立即致电您的医务人员。
- **由肠道感染 (艰难梭状芽孢杆菌) 引起的腹泻：** 如果出现水样便、胃痛和发烧不退的情况，请立即致电您的医务人员。
- **骨折 (腕部、腕部或脊柱)：** 长期 (一年或更长时间) 每天多次服用另一种称为质子泵抑制剂 (PPI 药物)、用以减少胃酸的药物者可能会发生腕部、手腕或脊椎骨折。如果您骨折，尤其是发生在腕部、腕部或脊柱，请告诉医务人员。
- **严重皮肤反应：** VOQUEZNA 可引起罕见但严重且可能影响身体任何部位的皮肤反应。这些严重的皮肤反应可能需要上医院治疗，且可能危及生命：
 - 皮疹，可能表现为皮肤的任何部位出现水疱、剥落或出血。
 - 您可能还会发烧、寒战、身体酸痛、气短，或淋巴结肿大。

如果您出现上述任何症状，请停用 VOQUEZNA，并立即致电您的医务人员。这些症状可能是严重皮肤反应的先兆。

- **维生素 B12 水平低：** VOQUEZNA 可降低胃酸的量。身体需要胃酸才能正常吸收维生素 B12。如果您有维生素 B12 水平低的症状，包括心律不齐、气短、头昏眼花、手臂或腿部刺痛或麻木、肌肉无力、皮肤苍白、感觉疲倦或情绪变化，请告诉您的医务人员。如果您长期服用 VOQUEZNA，请向医务人员咨询维生素 B12 水平低的风险。
- 服用 VOQUEZNA 者可能会出现**体内镁水平低**的情况。如果您有镁水平低的症状，包括癫痫发作、头晕、心律不齐、烦躁不安、肌肉酸痛或无力，或手、脚或声音痉挛，请立即告知您的医务人员。

- **胃增生 (胃底腺息肉)：** 长期服用另一种称为质子泵抑制剂 (PPI)、用以减少胃酸的药物者，有可能患上一种叫做胃底腺息肉的胃增生。如果您长期服用 VOQUEZNA，请向您的医务人员咨询发生胃底腺息肉的可能性。

VOQUEZNA 用于治疗糜烂性食管炎和/或缓解与胃食管反流病相关的烧心时最常见的副作用包括：

- 胃炎
- 消化不良
- 腹泻
- 便秘
- 胃胀气
- 高血压
- 胃痛
- 尿路感染
- 恶心

这些并非 VOQUEZNA 可能引起的所有副作用。如需了解更多信息，请咨询您的医务人员或药剂师。如需了解针对副作用的医疗建议，请致电您的医务人员。

我们鼓励您拨打 1-888-775-PHAT(7428) 联系 Phathom Pharmaceuticals，或拨打 1-800-FDA-1088 联系 FDA，或访问 www.fda.gov/medwatch，以报告可疑不良反应。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。





您可能节省 VOQUEZNA 的处方药费用

使用 VOQUEZNA 储蓄卡，符合资格的商业保险患者可能支付低至 \$25* 即可买到处方药。



您可在此下载储蓄卡并注册获得额外支持 >



我们的网上药房合作伙伴

BlinkRx 可帮助您找到潜在的节省。Phathom Pharmaceuticals 和 BlinkRx 携手帮助简化申领 VOQUEZNA (沃诺拉赞) 的流程。

如果医生将您的处方寄给 BlinkRx, BlinkRx 将与您联系, 为您安排免费送货上门服务。



免费送药上门

合作的药房将会免费为您送药上门。



您的最低自付费用

BlinkRx 将确定您的药物费用, 并套用符合资格的节省优惠。

VOQUEZNA 储蓄卡的条款和条件

*使用 VOQUEZNA® 储蓄卡 (以下简称“此卡”) 即表示您符合资格标准, 同意并将遵守下述条款和条件。此优惠适用于 VOQUEZNA 药片的最多 12 次配药。患者必须有商业药物保险, 且保险商有承保 VOQUEZNA, 只需支付低至 \$25。优惠的每月上限金额为 \$235, 另有年度上限金额 \$2,820。患者需承担任何适用的税费或超出月度或年度上限的金额。本优惠不适用于无商业药物保险的患者, 或其 VOQUEZNA 处方药索赔可全部或部分由任何政府计划补偿的患者, 包括但不限于 Medicaid、Medicare、Medicare Part D、Medigap、DoD、VA、TRICARE®/CHAMPUS 或任何州立的患者或药物援助计划。此优惠不提供给: 马萨诸塞州居民, 前提是有 AB 级非专利等效药可用; 加利福尼亚州居民, 前提是有 FDA 批准的等效治疗可用。仅在美国提供给美国居民。接受此优惠即表示您同意, 如果根据您的处方药保险条款, 或法律规定您有义务这样做, 您应该通知您的保险公司您已用此卡兑换此优惠。兑换此优惠即表示, 您和药剂师均同意不要求任何第三方 (如保险计划、灵活开支计划或健康储蓄账户) 报销您用此储蓄卡获得的全部或部分福利。此优惠不可与其他任何涉及 VOQUEZNA 的计划、折扣、折扣卡、现金折扣卡、优惠券、奖励或类似优惠合并使用。禁止任何人出售、购买或交易; 或提议出售、购买或交易, 或伪造此卡。Phathom Pharmaceuticals, Inc. 可随时终止、废止、撤销或修改本优惠, 恕不另行通知。此卡需要激活。此卡不是医疗保险。与您使用此卡相关的某些信息将与此卡的赞助商 Phathom 和代表 Phathom 行事的公司共享。若要了解更多信息, 请访问 <https://www.phathompharma.com/privacy-policy/> 查看 Phathom 隐私政策。此卡失效日期为 2024 年 12 月 31 日。

请参阅数字储蓄卡中的药剂师说明。



其他的 治疗方案

- ✓ 这是其类别中首个且唯一获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的治疗方法，是一种钾竞争性酸阻滞剂 (PCAB)。
- ✓ 可缓解与非糜烂性胃食管反流病 (GERD) 或糜烂性食管炎 (EE) 相关的烧心症状。
- ✓ 可帮助大多数成年人治愈和维持糜烂性食管炎。

患有非糜烂性胃食管反流病 (GERD) 和/或 EE 的成人最常见的副作用是胃炎、腹泻、胃胀、胃痛、恶心、消化不良、便秘、高血压和尿路感染。还出现过其他严重的副作用。请参阅[患者需知信息](#)以了解其他可能的副作用。

符合资格的患者使用 VOQUEZNA 储蓄卡，可支付低至 \$25*。

*患者必须有商业保险才符合资格。另有其他资格规定。“条款和条件”全文请见第 31 页。

重要安全性信息

如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA

- 对 VOQUEZNA 中的沃诺拉赞或任何其他成分过敏。过敏反应症状可能包括难以呼吸、皮疹、瘙痒以及脸、唇、舌或喉肿胀。
- 正在服用一种含有利匹韦林的药物 (EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY)，用于治疗 HIV-1 (人类免疫缺陷病毒)。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及[“患者需知信息”](#)和完整的[“VOQUEZNA 处方信息”](#)。