



# VOQUEZNA<sup>®</sup>

(vonoprazan) tablets <sup>10mg</sup><sub>20mg</sub>

用于糜烂性食管炎成人患者的愈合和缓解烧心，  
以及非糜烂性胃食管反流病成人患者中缓解烧心  
(GERD)

**VOQUEZNA**  
**击退胃酸**

**这是其类别中首个且唯一**

获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的治疗方法，是一种钾竞争性酸阻滞剂 (PCAB)。

**符合资格的患者使用 VOQUEZNA  
储蓄卡，可能仅需支付 \$25\*。**

\*患者必须有商业保险才符合资格。另有其他资格规定。查看完整的条款和条件，请访问 [voquezna.com/savings/#terms](http://voquezna.com/savings/#terms)。

## 重要安全性信息

如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA

- 对 VOQUEZNA 中的 vonoprazan 或任何其他成分过敏。过敏反应症状可能包括难以呼吸、皮疹、瘙痒以及脸、唇、舌或喉肿胀。
- 正在服用一种含有利匹韦林的药物 (EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY)，用于治疗 HIV-1 (人类免疫缺陷病毒)。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。



## VOQUEZNA 击退胃酸

### 适应症

#### 什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) 是一种供成人服用的处方药：
  - 疗程为 8 周，以愈合食道内壁与酸有关的损伤（称为糜烂性食管炎），并缓解与糜烂性食管炎有关的烧心。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。

## 目录

- 4 [VOQUEZNA 发挥效用的方式不同](#)
- 8 [愈合](#)
- 10 [缓解烧心](#)
- 16 [如何服用 VOQUEZNA](#)
- 18 [有用提示](#)
- 20 [安全信息](#)
- 22 [关于 GERD](#)
- 30 [节省费用和支持](#)



**VOQUEZNA**<sup>®</sup>  
(vonoprazan) tablets 10mg  
20mg



## VOQUEZNA 发挥效用 的方式不同

VOQUEZNA (vonoprazan) 是首个也是唯一一个获得 FDA 批准的同类治疗药物。并非所有治疗方法都适用于每个人。如果您的症状持续存在，请与医生讨论您的选择。



**随餐或  
不随餐**

VOQUEZNA 是一种称为钾竞争性酸阻滞剂 (PCAB) 的药物。与大多数质子泵抑制剂 (PPI) 不同, PCAB 可随餐服用, 也可不随餐服用。

### 适应症 (续)

#### 什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) 是一种供成人服用的处方药:
  - 用于维持糜烂性食管炎的愈合和缓解与糜烂性食管炎有关的烧心, 疗程长达 6 个月。

## VOQUEZNA 在起作用



服用 VOQUEZNA 后, 药物会进入胃部与质子泵结合。



在这里, VOQUEZNA 阻止钾与泵结合。这会阻止质子泵工作。



质子泵无法工作时, 就不能再产生酸。VOQUEZNA 可以帮助抑酸 24 小时。

### 适应症 (续)

#### 什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) 是一种供成人服用的处方药:
    - 用于缓解胃食管反流病(GERD)引起的烧心, 疗程为4周。
- 目前尚不清楚 VOQUEZNA 对儿童是否安全有效。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”, 以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。



**VOQUEZNA®**  
(vonoprazan) tablets 10mg  
20mg



## VOQUEZNA 迅速开始抑制酸分泌

一项由健康成人参加的临床试验表明，VOQUEZNA (vonoprazan) 可在 2-3 小时内减少胃酸，并在整个 24 小时内维持抑酸效果。



### 重要安全性信息 (续)

在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 血中镁、钙或钾含量低，或者您正在使用增加尿量的药物（利尿剂）。
- 肾脏或肝脏问题。



**VOQUEZNA 使我的糜烂性 GERD 愈合。\***

KEVIN, VOQUEZNA 临床试验患者患有糜烂性 GERD



\*个体结果可能会有所不同。

该患者因分享他在试验中的个人体验而获得了 Phathom 的补偿。

[查看 Kevin 的更多故事](#)



请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。




**VOQUEZNA<sup>®</sup>**  
(vonoprazan) tablets 10mg  
20mg



## VOQUEZNA 能够抑制酸分泌，帮助治疗和维持糜烂性 GERD 的愈合。

事实证明，VOQUEZNA (vonoprazan) 可帮助大多数成人糜烂性 GERD（也称为糜烂性食管炎或 EE）患者获得彻底治愈，并可持续存在。



食管糜烂的示意图

### 重要安全性信息（续）

在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 已怀孕、认为自己可能怀孕了或计划怀孕。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会给胎儿造成伤害。

## 经证实可愈合糜烂性 GERD

VOQUEZNA 在一项临床试验中进行了评估，该试验针对的是经内窥镜确诊的 EE 成人患者。其中一组在愈合阶段每天一次服用 VOQUEZNA 20 毫克，持续 2 到 8 周。在服用 VOQUEZNA 治疗 EE 的成人中，有 93% 到 2 个月时愈合（相比之下，使用其他疗法达到此效果者为 85%\*）。

一些成人在愈合阶段通过 VOQUEZNA 或其他治疗方法获得愈合，然后在维持阶段每天一次服用 VOQUEZNA 10 毫克，持续 6 个月。79% 服用 VOQUEZNA 维持治疗者保持了 6 个月的愈合（相比之下，使用其他疗法达到此效果者为 72%\*）。



93% 的成年人

服用 VOQUEZNA 后在 2 个月内实现了 EE（糜烂性食管炎）愈合，而使用另一种治疗的患者中只有 85% 达到这一效果。\*

已愈合者中



79% 的成年人

服用 VOQUEZNA 维持愈合达 6 个月，而使用其他治疗维持愈合者为 72%\*。

\* 兰索拉唑

### 重要安全性信息（续）

- **妊娠暴露登记：**针对妊娠期间服用 VOQUEZNA 的女性设有妊娠登记。本登记的目的是收集有关您和您孩子的健康状况的信息。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。



VOQUEZNA<sup>®</sup>  
(vonoprazan) tablets 10mg / 20mg



## 帮助患者实现 无胃灼热天数

经验证，VOQUEZNA (vonoprazan) 可帮助患有糜烂性\*或非糜烂性 GERD 的成年人实现无烧心的日子。

\*糜烂性 GERD 也称为糜烂性食管炎或 EE。

### 重要安全性信息 (续)

**在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：**

- 正在母乳喂养或计划母乳喂养。您和您的医务人员应决定您在母乳喂养期间是否要服用 VOQUEZNA。

**告诉您的医务人员您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。保存一份药物清单，以便在获取新药时出示给医务人员和药剂师。**



**经证实有  
助于缓解  
GERD  
的烧心**

### 重要安全性信息 (续)

VOQUEZNA 可能影响其他药物的效用，反之亦然。尤其要告诉您的医务人员，如果您服用含有利匹韦林 (EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY) 的药物。

**请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。**



## 缓解成人非糜烂性 GERD 患者的烧心症状

在一项针对患有非糜烂性 GERD（胃食管反流病）的成人服用 VOQUEZNA (vonoprazan) 的临床试验中，受试者被要求记录他们出现**烧心的天数和烧心症状的严重程度**。在治疗结束时检查日记，以确定据报告有多少天没有烧心。



**VOQUEZNA 治疗期间，有45%的时间患者享受到了全天 24 小时无烧心的舒适，而接受安慰剂治疗的患者中，这一比例仅为 28%。**

### 重要安全性信息（续）

#### VOQUEZNA 可能引起哪些副作用？


#### VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- **一种肾脏问题（急性肾小管间质性肾炎）：**有些人服用 VOQUEZNA 后可能出现称为急性肾小管间质性肾炎的肾脏问题。如果您的尿量减少或您发现尿液带血，请立即致电您的医务人员。
- **由肠道感染（艰难梭状芽孢杆菌）引起的腹泻：**如果出现水样便、胃痛和发烧不退的情况，请立即致电您的医务人员。
- **骨折（腕部、腕部或脊柱）：**长期（一年或更长时间）每天多次服用另一种称为质子泵抑制剂（PPI 药物）、用以减少胃酸的药物者可能



我非常高兴地分享，得益于 VOQUEZNA 的帮助，烧心已经不再主宰我的生活。\*

CARSON，一位患有非糜烂性 GERD 的 VOQUEZNA 临床试验患者。



\* 个体结果可能会有所不同。  
该患者因分享他在试验中的个人体验而获得了 Phathom 的补偿。

### 重要安全性信息（续）

会发生腕部、手腕或脊椎骨折。如果您骨折，尤其是发生在腕部、腕部或脊柱，请告诉医务人员。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。



**VOQUEZNA<sup>®</sup>**  
(vonoprazan) tablets 10mg  
20mg

## 缓解成人糜烂性 GERD 患者的烧心症状

在一项针对服用 VOQUEZNA (vonoprazan) 的糜烂性 GERD (也称为糜烂性食管炎或 EE) 成人患者的临床试验中, 受试者被要求追踪记录他们出现**烧心**症状的天数**以及烧心症状的严重程度**。在治疗结束时检查日记, 以确定报告有多少天没有烧心。



在 2 个月的愈合阶段, **服用 VOQUEZNA 的日子里, 有 67% 的天数在全天 24 小时均未出现烧心** (相比之下, 使用其他疗法达到此效果的天数为 64%\*)。在 6 个月的维持期, **服用 VOQUEZNA 的日子里, 有 81% 的天数在全天 24 小时均未出现烧心** (相比之下, 使用其他疗法达到此效果的天数为 79%\*)。

\* 兰索拉唑

### 重要安全性信息 (续)

**VOQUEZNA 可能引起严重的副作用, 包括:**

- **严重皮肤反应:** VOQUEZNA 可引起罕见但严重且可能影响身体任何部位的皮肤反应。这些严重的皮肤反应可能需要上医院治疗, 且可能危及生命:
  - 皮疹, 可能表现为皮肤的任何部位出现水泡、剥落或出血。
  - 您可能还会发烧、寒战、身体酸痛、气短, 或淋巴结肿大。

如果您出现上述任何症状, 请停用 VOQUEZNA, 并立即致电您的医务人员。这些症状可能是严重皮肤反应的先兆。

### 重要安全性信息 (续)

**VOQUEZNA 可能引起严重的副作用, 包括:**

- **维生素 B12 水平低:** VOQUEZNA 可降低胃酸的量。身体需要胃酸才能正常吸收维生素 B12。如果您有维生素 B12 水平低的症状, 包括心律不齐、气短、头昏眼花、手臂或腿部刺痛或麻木、肌肉无力、皮肤苍白、感觉疲倦或情绪变化, 请告诉您的医务人员。如果您长期服用 VOQUEZNA, 请向医务人员咨询维生素 B12 水平低的风险。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”, 以及“[患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。



**VOQUEZNA**<sup>®</sup>  
(vonoprazan) tablets 10mg  
20mg



## 给药计划

缓解与非糜烂性 GERD 相关的烧心症状。



一片 10 毫克药片  
每日一次  
连服 4 周

糜烂性 GERD 的愈合并缓解相关的烧心症状



一片 20 毫克药片  
每日一次  
连服 8 周

维持痊愈的糜烂性 GERD 并缓解相关的烧心症状



一片 10 毫克药片  
每日一次  
最长服用 6 个月

所示药片非实际尺寸。

请咨询您的医生，以确定适宜您采用的管理计划。

### 重要安全性信息（续）

- **胃部生长物（胃底腺息肉）**：长期服用另一种称为质子泵抑制剂（PPI）、用以减少胃酸的药物者，可能会出现一种称为胃底腺息肉的胃部生长物。如果您长期服用 VOQUEZNA，请向您的医务人员咨询发生胃底腺息肉的可能性。

请参调整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“[VOQUEZNA 患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。



## 如何服用 VOQUEZNA



VOQUEZNA (vonoprazan) 是一种每日一次的药片，适用于糜烂性或非糜烂性 GERD 相关的烧心成人患者。**可与食物或不与食物同服。**您的用药计划可能与下一页所列出的类似。

### 重要安全性信息（续）

VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- 服用 VOQUEZNA 者可能会出现**体内镁水平低**的情况。如果您有镁水平低的症状，包括癫痫发作、头晕、心律不齐、烦躁不安、肌肉酸痛或无力，或手、脚或声音痉挛，请立即告知您的医务人员。

# 服用 VOQUEZNA 时的有用提示



## 很灵活，可随餐或不随餐服用

与大多数质子泵抑制剂（PPIs）不同，VOQUEZNA（vonoprazan）是一种每日一次的口服药物，可与食物或不与食物同服，也就是说，您不必在进餐前后服药。请记住，您应始终遵照医生处方服用 VOQUEZNA。

## 整片吞服

咀嚼或碾碎药片可能会产生苦味。

所示药片非实际尺寸或颜色。



## 重要安全性信息（续）

VOQUEZNA 用于治疗糜烂性食管炎或缓解与胃食管反流病相关的烧心时最常见的副作用包括：

- 胃炎
- 消化不良
- 腹泻
- 便秘
- 胃胀气
- 高血压
- 胃痛
- 尿路感染
- 恶心




## 小诀窍：

建议您在每日固定做一次的活动结束后立即服用 VOQUEZNA。这样做可帮助您将服药变成日常例行事项。

## 漏服了一剂？

如果错过一次服药，请尽快服用下一次 -- 除非已经过了 12 小时。如果已过去 12 小时以上，请跳过该漏服的剂量，而是按时服用下一剂。



## 重要安全性信息（续）

这些并非 VOQUEZNA 可能引起的所有副作用。如需了解更多信息，请咨询您的医务人员或药剂师。如需了解针对副作用的医疗建议，请致电您的医务人员。

我们鼓励您拨打 **1-888-775-PHAT (7428)** 联系 Phathom Pharmaceuticals，或拨打 **1-800-FDA-1088** 联系 FDA，或访问 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)，以报告可疑不良反应。

请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。





## 安全性和副作用

在对患有非糜烂性胃食管反流病 (GERD) 或糜烂性 GERD (也称为糜烂性食管炎或 EE) 的成人进行的临床试验中对 VOQUEZNA (vonoprazan)进行了评估。

下一页所列最常见的副作用并非可能出现的全部副作用。如需查看可能出现的副作用完整清单, 请参阅完整的“[处方信息](#)”。

### 非糜烂性胃食管反流病 (GERD) (4 周)

成人服用 VOQUEZNA 10 毫克时最常见的副作用有:

副作用	VOQUEZNA 10 毫克 259 名成人
胃痛	2%
便秘	2%
腹泻	2%
恶心	2%
尿路感染	2%

### 糜烂性 GERD 愈合期 (长达 2 个月)

成人服用 VOQUEZNA 20 毫克时最常见的副作用有:

副作用	VOQUEZNA 20 毫克 514 名成人
胃炎	3%
腹泻	2%
胃胀气	2%
胃痛	2%
恶心	2%

### 糜烂性 GERD 维持期 (6 个月)

成人服用 VOQUEZNA 10 毫克时最常见的副作用有:

副作用	VOQUEZNA 10 毫克 296 名成人
胃炎	6%
胃痛	4%
消化不良	4%
高血压	3%
尿路感染	3%

请参阅整份文档中的其他“[重要安全性信息](#)”, 以及“[患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。





## 关于 GERD 的须知

胃食管反流病（GERD）是一种慢性疾病，当胃酸流入食管并造成刺激时就会发病。

胃食管反流病主要有两种类型：

- 非糜烂性胃食管反流病（GERD）
- 糜烂性 GERD（也称为糜烂性食管炎或 EE）

## GERD 对哪些人有影响？

GERD 是最常见的消化系统疾病之一，在美国约影响着 6500 万人。



## 糜烂性 GERD 对比非糜烂性 GERD

糜烂性 GERD 是 GERD 的一种，食管会受到与酸有关的损害。非糜烂性胃食管反流病（GERD）不会对食管造成损伤，且更为常见。烧心在这两种病症中都很常见。

约 **2/3** 的人

GERD 患者患的是非糜烂性胃食管反流病 (GERD)

## 持续的烧心

许多糜烂性 GERD 患者尽管服用了抗酸剂、组胺-2 受体拮抗剂（H2s）或质子泵抑制剂（PPIs）等药物，但仍会感到食道内有酸。




**58%** 的人

患有糜烂性 GERD，  
且在接受治疗期间仍出现烧心

## 可能增加您患胃食管反流病 (GERD) 几率的因素包括:

- 食管裂孔疝
- 肥胖症
- 食管下括约肌不能正常闭合
- 胃排空延迟

## GERD 有哪些相关症状?



最常见的症状是烧心和反流。  
其他可能出现的症状包括:

- 吞咽困难或疼痛
- 慢性咳嗽
- 胸痛

## 如何诊断 GERD?

**要诊断 GERD**, 医生会问您几个问题, 并可能进行身体检查。

**要诊断糜烂性 GERD**, 需要进行内窥镜检查。内窥镜检查是一种将装有微型摄像头的细管经喉咙插入的医疗程序。



## GERD 的治疗历史

### 1928

#### 首个抗酸剂获准使用

抗酸剂可以中和胃中的酸, 帮助缓解烧心。这些药物一般都是非处方药, 用于缓解症状。

### 1977

#### 首个组胺-2受体拮抗剂 (H2) 获准使用

H2 受体阻断剂通过阻断胃酸生成过程中最初步骤之一, 减少胃内酸的产生量。H2 可治疗与胃食管反流病 (GERD) 相关的烧心症状。

### 1989

#### 第一种质子泵抑制剂 (PPI) 获准使用

PPI 是治疗胃食管反流病 (GERD) 的常用药物。它们通过阻断胃酸分泌的最后一步来治疗胃食管反流病 (GERD)。它们会被胃酸激活, 大多数 PPI 必须在饭前 30-60 分钟服用。

### 2023

### 2024

#### VOQUEZNA® (vonoprazan) 作为第一种钾竞争性酸阻滞剂获准使用

2023 年, VOQUEZNA 作为首款钾竞争性胃酸阻滞剂 (PCAB) 获得批准, 用于治疗糜烂性食管炎及其症状, 之后又于 2024 年获批准用于缓解非糜烂性胃食管反流病 (GERD) 引起的烧心。PCABs 通过阻断胃酸分泌的最后一步发挥作用--它们不需要被胃酸激活, 可以在随餐或不随餐的情况下服用。

## 与您的医生沟通

说到 GERD（胃食管反流病），并不是每种治疗方法都适合所有人。如果您一直在想是否适合采用不同的治疗方案，那么现在可能是时候与您的医生谈谈了。[1]



### ✓ 要及时。

如果您不向医生及时反映那些令人困扰的症状，那么您可能会延迟治愈糜烂性 GERD 的损伤或缓解相关的烧心症状。

### ✓ 要坦诚。

医生找到适合您的治疗方法的最佳途径是收集所有事实。不要对医生感到害羞。他们是最值得信赖的伙伴。

### ✓ 谈话要有描述性。

每一个细节都至关重要。您的症状在一天中的什么时间出现？您的症状持续时间有多长，出现频率如何，是否令人困扰？请告诉医生这些细节，以便他们确定最适合您的治疗方法。

## 适应症和重要安全性信息

### 什么是 VOQUEZNA?

- VOQUEZNA® (vonoprazan) 是一种供成人服用的处方药：
  - 疗程为 8 周，用于使食管内壁与酸有关的损伤（称为糜烂性食管炎）愈合，并缓解与糜烂性食管炎有关的烧心症状。
  - 用于维持糜烂性食管炎的愈合和缓解与糜烂性食管炎有关的烧心，疗程长达 6 个月。
  - 用于缓解胃食管反流病（GERD）引起的烧心，疗程为 4 周。

目前尚不清楚 VOQUEZNA 对儿童是否安全有效。

### 如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA

- 对 VOQUEZNA 中的 vonoprazan 或任何其他成分过敏。过敏反应症状可能包括难以呼吸、皮疹、瘙痒以及脸、唇、舌或喉肿胀。
- 正在服用一种含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY），用于治疗 HIV-1（人类免疫缺陷病毒）。

### 在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 血中镁、钙或钾含量低，或者您正在使用增加尿量的药物（利尿剂）。
- 肾脏或肝脏问题。
- 已怀孕、认为自己可能怀孕了或计划怀孕。目前尚不清楚 VOQUEZNA 是否会给胎儿造成伤害。
  - **妊娠暴露注册登记：**针对妊娠期间服用 VOQUEZNA 的女性设有妊娠注册登记研究。本登记的目的是收集有关您和您孩子的健康状况的信息。如果您已怀孕或在 VOQUEZNA 治疗期间怀孕，请与您的医务人员讨论如何参加本妊娠登记，或者您可以致电 1-866-609-1612 或访问 <https://voqueznapregnancyregistry.com/> 自行注册。



## 重要安全性信息 (续)

### 在服用 VOQUEZNA 之前，请告知您的医务人员您所有的医疗状况，包括有否以下情况：

- 正在母乳喂养或计划母乳喂养。您和您的医务人员应决定您在母乳喂养期间是否要服用 VOQUEZNA。

告诉您的医务人员您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。保存一份药物清单，以便在获取新药时出示给医务人员和药剂师。

VOQUEZNA 可能影响其他药物的效用，反之亦然。如果您服用含有利匹韦林 (EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY) 的药物，尤其要告诉您的医务人员。

### VOQUEZNA 可能引起哪些副作用？

#### VOQUEZNA 可能引起严重的副作用，包括：

- 一种肾脏问题 (急性肾小管间质性肾炎)：**有些人服用 VOQUEZNA 后可能出现称为急性肾小管间质性肾炎的肾脏问题。如果您的尿量减少或您发现尿液带血，请立即致电您的医务人员。
- 由肠道感染 (*Clostridioides difficile*) 引起的腹泻：**如果出现水样便、胃痛和发烧不退的情况，请立即致电您的医务人员。
- 骨折 (腕部、腕部或脊柱)：**长期 (一年或更长时间) 每天多次服用另一种称为质子泵抑制剂 (PPI 药物)、用以减少胃酸的药物者可能会发生腕部、手腕或脊椎骨折。如果您骨折，尤其是发生在腕部、腕部或脊柱，请告诉医务人员。
- 严重皮肤反应：**VOQUEZNA 可引起罕见但严重且可能影响身体任何部位的皮肤反应。这些严重的皮肤反应可能需要上医院治疗，且可能危及生命：
  - 皮疹，可能表现为皮肤的任何部位出现水疱、剥落或出血。
  - 您可能还会发烧、寒战、身体酸痛、气短，或淋巴结肿大。

如果您出现上述任何症状，请停用 VOQUEZNA，并立即致电您的医务人员。这些症状可能是严重皮肤反应的先兆。

- 维生素 B12 水平低：**VOQUEZNA 可降低胃酸的量。身体需要胃酸才能正常吸收维生素 B12。如果您有维生素 B12 水平低的症状，包括心律不齐、气短、头昏眼花、手臂或腿部刺痛或麻木、肌肉无力、皮肤苍白、感觉疲倦或情绪变化，请告诉您的医务人员。如果您长期服用 VOQUEZNA，请向医务人员咨询维生素 B12 水平低的风险。
- 服用 VOQUEZNA 者可能会出现**体内镁水平低**的情况。如果您有镁水平低的症状，包括癫痫发作、头晕、心律不齐、烦躁不安、肌肉酸痛或无力，或手、脚或声音痉挛，请立即告知您的医务人员。
- 胃部赘生物 (胃底腺息肉)：**长期服用另一种用于减少胃酸、称为质子泵抑制剂 (PPI) 药物的人，可能会出现一种称为胃底腺息肉的胃部赘生物。如果您长期服用 VOQUEZNA，请向您的医务人员咨询发生胃底腺息肉的可能性。

### VOQUEZNA 用于治疗糜烂性食管炎或缓解与胃食管反流病相关的烧心时最常见的副作用包括：

- 胃炎
- 消化不良
- 腹泻
- 便秘
- 胃胀气
- 高血压
- 胃痛
- 尿路感染
- 恶心

这些并非 VOQUEZNA 可能引起的所有副作用。如需了解更多信息，请咨询您的医务人员或药剂师。如需了解针对副作用的医疗建议，请致电您的医务人员。

我们鼓励您拨打 1-888-775-PHAT(7428) 联系 Phathom Pharmaceuticals，或拨打 1-800-FDA-1088 联系 FDA，或访问 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)，以报告可疑不良反应。

请参调整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“患者需知信息”和完整的“VOQUEZNA 处方信息”。





## 您可能节省 VOQUEZNA 的处方药费用

使用 VOQUEZNA 储蓄卡，符合资格的商业保险患者**可能支付低至 \$25\*** 即可买到处方药。



您可在此下载储蓄卡并注册获得额外支持 >

# BLINKRx

## 我们的网上药房合作伙伴

BlinkRx 可帮助您找到潜在的节省。Phathom Pharmaceuticals 和 BlinkRx 携手帮助简化获取 VOQUEZNA (vonoprazan) 的流程。

如果医生将您的处方寄给 BlinkRx, BlinkRx 将与您联系, 为您安排免费送货上门服务。



### 免费送药上门

合作的药房将会免费为您送药上门。



### 您的最低自付费用

BlinkRx 将确定您的药物费用, 并套用符合资格的节省优惠。

查看完整的条款和条件, 请访问 [voquezna.com/savings/#terms](https://voquezna.com/savings/#terms)

BlinkRx 不是保险。将您的处方发送至 BlinkRx, 即表示您授权 BlinkRx (简称“Blink”) 发送与您的处方相关的短信通知。可能会产生短信和数据费用。短信发送的频率会有所变化。普通短信可能并不完全安全。提供同意不是通过 Blink 购买商品或服务的条件。

您可以回复任意短信, 发送 HELP 获取帮助, 或发送 STOP 停止并撤销您的同意。访问 [www.blinkrx.com/legal](https://www.blinkrx.com/legal) 查看 Blink 的 HIPAA 隐私声明和使用条款。



# 其他的 治疗方案

- ✓ 这是其类别中**首个且唯一**获得**美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准**的治疗方法，是一种钾竞争性酸阻滞剂 (PCAB)。
- ✓ **可帮助缓解**与非糜烂性 GERD（胃食管反流病）或糜烂性 GERD（也称为糜烂性食管炎或 EE）相关的烧心症状。
- ✓ **可帮助大多数成年人实现并维持**糜烂性 GERD 的愈合。

患有非糜烂性胃食管反流病（GERD）或 EE 的成人**最常见的副作用**是胃炎、腹泻、胃胀、胃痛、恶心、消化不良、便秘、高血压和尿路感染。还出现过其他严重的副作用。请参阅**[患者需知信息](#)**以了解其他可能的副作用。

**符合资格的患者使用 VOQUEZNA 省钱卡，  
可支付低至 \$25\***

\*患者必须有商业保险才符合资格。另有其他资格规定。查看完整的条款和条件，请访问 [voquezna.com/savings/#terms](https://voquezna.com/savings/#terms)。

## 重要安全性信息

**如有以下情况，请勿服用 VOQUEZNA**

- 对 VOQUEZNA 中的 vonoprazan 或任何其他成分过敏。过敏反应症状可能包括难以呼吸、皮疹、瘙痒以及脸、唇、舌或喉肿胀。
- 正在服用一种含有利匹韦林的药物（EDURANT、COMPLERA、JULUCA、ODEFSEY），用于治疗 HIV-1（人类免疫缺陷病毒）。

**请参阅整份文档中的其他“重要安全性信息”，以及“[患者需知信息](#)”和完整的“[VOQUEZNA 处方信息](#)”。**