

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

Contattando Zonaprotetta è possibile effettuare, ad un prezzo agevolato, presso il Servizio di Malattie Infettive dell'Ospedale Civico di Lugano, uno screening generale in forma anonima delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST).

PRIVACY PRESSO GLI STUDI MEDICI

Medici privati specialisti possono offrire i vari test delle MST e il test HIV anche in forma rapida; trovi alcuni nominativi e indicazioni direttamente alla pagina www.zonaprotetta.ch/testpertutti

Spesso anche gli specialisti sono disposti a stabilire con il paziente le strategie che garantiscono la massima discrezione possibile, anche senza prevedere l'anonimato in senso stretto (p.es. pagamento senza passare da Cassa Malati).

INFORMAZIONE

È importante informarsi sulle diverse Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) e sui modi di contagio.

PROTEZIONE

Il preservativo protegge dalla maggior parte delle MST.

CONTROLLO

I test fatti tempestivamente permettono di iniziare terapie che portano alla guarigione o che limitano le peggiori conseguenze.

CURA

Le infezioni da HIV, epatite e sifilide, se trascurate possono portare a conseguenze molto severe.



MALATTIE
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

**DOVE FARE I TEST
ANONIMAMENTE**

testpertutti è un'iniziativa di:



con il sostegno di:



ZONAPROTETTA

Consulenza anonima su HIV e MST

Via Bagutti 2 - 6900 LUGANO

T 091 923 17 17

www.zonaprotetta.ch

TEST HIV

Puoi fare il test HIV anonimo e pagando

in contanti (circa 30/50.- CHF)

ai Centri di Pianificazione Familiare presso

gli Ospedali di:

Locarno T 091 811 45 51

Bellinzona T 091 811 92 32

Mendrisio T 091 811 36 50

Oppure nei Servizi di Malattie Infettive presso

gli Ospedali di:

Lugano T 091 811 60 21

Locarno T 091 811 47 15

Bellinzona T 091 811 89 86

Presso il Servizio di Malattie Infettive di Lugano e di Locarno è possibile effettuare il test HIV rapido.

MALATTIE SESSUALMENTI TRASMISSIBILI	VIE DI TRASMISSIONE	PRIMI SINTOMI	DECORSO	TEST PER DIAGNOSI	VACCINO	TRATTAMENTO
HIV	Rapporti sessuali (vaginali/anali/orali) non protetti	Dopo 3/4 settimane sintomi simili a quelli influenzali	Se non curata sintomi da deficit immunitario (AIDS); porta alla morte	Prelievo di sangue	NO	Antivirale e controlli regolari in un centro specializzato
EPATITE B	Rapporti sessuali (vaginali/anali/orali) non protetti	Sovente asintomatica. Stanchezza, colorazione giallastra di occhi e pelle, dolori addominali, ecc.	Cirrosi, tumore al fegato	Prelievo di sangue	SI	Nella fase acuta non c'è trattamento. L'infezione cronica si può curare con antivirali
CLAMIDIA	Rapporti sessuali (vaginali/anali/orali) non protetti	In genere pochi sintomi, oppure secrezioni e bruciori urinari; nelle donne dolori addominali bassi e negli uomini uretrite	Rischio sterilità nelle donne	Striscio uretrale o test sulle urine	NO	Antibiotico
GONORREA	Rapporti sessuali (vaginali/anali/orali) non protetti	Spesso asintomatica nelle donne, o secrezioni purulente, bruciore urinario, uretrite	Rischio sterilità nelle donne	Striscio uretrale o test sulle urine	NO	Antibiotico
SIFILIDE	Rapporti sessuali (vaginali/anali/orali) non protetti. Contatto della pelle con lesioni attive	1° stadio: ulcera cutanea indolore nel punto d'ingresso del battere	2° st: linfonodi ingrossati e alterazione pelle e mucose. 3° st: grave compromissione di diversi organi	Prelievo di sangue	NO	Antibiotico
HERPES GENITALE	Rapporti sessuali (vaginali/anali/orali) non protetti. Contatto della pelle con lesioni attive	Vescicole dolenti e pruriginose soprattutto nella parte genitale	Idem, come primi sintomi	Striscio delle vescicole. Prelievo di sangue	NO	Antivirale
HPV-PAPILLOMA VIRUS UMANO (CONDILOMI)	Rapporti sessuali (vaginali/anali/orali) non protetti. Contatto della pelle con lesioni attive	Spesso asintomatici; o lesioni verrucose (condilomi) in regione anale, genitale, orale anche dopo un lungo periodo di latenza (mesi o anni)	Cancro alla cervice dell'utero per le donne. Formazione dei condilomi	Visita medica specialistica	Vaccinazione preventiva Racc.to per ragazze tra 11 e 14 anni	Antivirale locale sovente di lunga durata. Asportazione tessuti tumorali e/o condilomi