

BOLI CU TRANSMITERE SEXUALĂ

Contactând Zonaprotetta este posibil să efectuați la un preț redus la Serviciul de Boli infecțioase al Spitalului Municipal din Lugano un screening general (control) anonim al bolilor cu transmitere sexuală.

MEDICI PRIVAȚI

Medici privați specialiști pot oferi diferite teste ale BTS și testul HIV și în formă rapidă; găsiți numele și indicațiile direct la pagina www.zonaprotetta.ch/testpertutti

Adesea și specialiștii sunt dispuși să stabilească împreună cu pacientul strategiile care garantează maxima discreție posibilă, chiar și fără să prevadă anonimatul în sens strict (de ex. plata fără a trece pe la Casa de Asigurări medicale).

INFORMAȚII

Este important să fiți informați despre diversele boli cu transmitere sexuală și asupra modului de molipsire.

PROTECȚIE

Prezervativul ne protejează de cea mai mare parte a BTS.

CONTROL

Testele făcute în timp util permit inițierea terapierilor ce duc la vindecare și limitează cele mai grave consecințe.

TRATAMENT

Infecțiile cu HIV, hepatită și sifilis pot avea consecințe foarte severe dacă sunt neglijate.

testpertutti este o inițiativa din partea:

Zonaprotetta.ch
AIUTO AIDS TICINO

cu sprijinul:

tiu
Dipartimento della sanità e della socialità
Sezione sanitaria

AIUTO AIDS SVIZZERO
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIDS-HILFE SCHWEIZ

migesplus



BOLI CU TRANSMITERE
SEXUALĂ

**UNDE SE FAC TESTE
ÎN MOD ANONIM**

ZONAPROTETTA

Consultanță anonimă despre HIV și BTS

Via Bagutti 2 - 6900 LUGANO

T 091 923 17 17

www.zonaprotetta.ch

TEST HIV

Poți face testul anonim și plătind cu bani gheață (cca 30 /50 CHF) la centrele de planificare familială de pe lângă spitalele din:

Locarno T 091 811 45 51

Bellinzona T 091 811 92 32

Mendrisio T 091 811 36 50

Sau la Serviciile de Boli infecțioase de pe lângă spitalele din:

Lugano T 091 811 60 21

Locarno T 091 811 47 15

Bellinzona T 091 811 89 86

La Serviciul de Boli infecțioase din Lugano și Lucarno este posibil să efectuați testul HIV rapid.

BST

	CĂI DE TRANSMISIE	PRIMELE SIMPTOME
HIV	Raporturi sexuale (vaginale, anale, orale) neprotejate	După 3-4 săptămâni, simptome asemănătoare cu cele ale gripei
HEPATITA B	Raporturi sexuale (vaginale, anale, orale) neprotejate	Adesea asimptomatică. Oboseală, colorit gălbui al ochilor și al pielii, dureri abdominale etc.
CLAMIDIA	Raporturi sexuale (vaginale, anale, orale) neprotejate	În general, puține simptome ca arsuri și secreții urinare, la femei dureri abdominale joase și la bărbați uretrită
GONOREE	Raporturi sexuale (vaginale, anale, orale) neprotejate	Adesea asimptomatică la femei, secreții purulente, arsuri urinare, uretrită
SIFILIS	Raporturi sexuale (vaginale, anale, orale) neprotejate	I-ul stadiu, ulcer cutanat nedureros la punctul de intrare a bacteriei
HERPES GENITAL	Raporturi sexuale (vaginale, anale, orale) neprotejate; contactul pielii cu leziuni active	Vezicule dureroase și mâncărime intensă mai ales în partea genitală
HPV (PAPILLOMA VIRUS UMAN) CONDILOAME	Raporturi sexuale (vaginale, anale, orale) neprotejate; contactul pielii cu leziuni active	Adesea asimptomatică, leziuni verucoase (ca niște negi) în regiunea anală, genitală, orală chiar și după o lungă perioadă de latență (luni sau ani)

EVOLUȚIE	LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO	TEST DE DIAGNOZĂ	TRATAMENT
Dacă nu este tratat, simptome de deficit imunitar (SIDA) ce duc la moarte	Prelevare de sânge	NU	Antiviral și controale regulate într-un centru de specialitate
Ciroză, tumori ale ficatului	Prelevare de sânge	DA	În faza acută nu există tratament. Infecția cronică se poate trata cu antivirale
Risc de sterilitate la femei	Frotiu uretral și analiza urinei	NU	Antibiotic
Risc de sterilitate la femei	Frotiu uretral și analiza urinei	NU	Antibiotic
Al II-lea stadiu, ganglioni îngroșați și răni ale pielii și mucoaselor. Al III-lea stadiu, gravă compromitere a diverselor organe	Prelevare de sânge	NU	Antibiotic
Idem ca la primele simptome	Frotiu al veziculelor Prelevare de sânge	NU	Antiviral
Cancer de col uterin la femei. Formare de condiloame (condilomi?)	Vizită medicală de specialitate	Vaccinare preventivă recomandată fetelor între 11 și 14 ani	Antiviral local adesea de lungă durată. Extirpare țesuturilor tumorale și/sau a condilomilor