



جرعة تنشيطية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA (فايزر/بيونتيك، موديرنا)

توفر لقاحات mRNA الحماية بشكل جيد للغاية من الإصابات الشديدة بمرض كوفيد 19 التي تتطلب الإقامة في المستشفى. إلا أنه ثبت أن درجة الحماية التي يوفرها اللقاح قد تقل مع مرور الوقت بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. لذلك فإننا ننصح هذه الفئة العمرية بأخذ جرعة تنشيطية بعد مرور 6 أشهر على الأقل من آخر جرعة للقاح. حتى الآن لم يلاحظ أي انخفاض في درجة الحماية التي يوفرها اللقاح من الإصابات الشديدة للأشخاص في عمر أقل من 65 سنة. ومع ذلك فإن تأثير الحماية من الإصابات الخفيفة ونقل الفيروس يقل لدى كافة الأشخاص مع مرور الوقت. لهذا السبب ننصح كافة الأشخاص في الفئة العمرية بين 16 و 64 عاماً بأخذ جرعة تنشيطية من اللقاح.

ما فائدة الجرعة التنشيطية؟

من خلال الجرعة التنشيطية يتم تذكير الجهاز المناعي بمسبب المرض. وبالتالي تتم استعادة درجة الحماية القصوى التي يوفرها اللقاح وتمديدها أيضاً.

لمن يوصى بالجرعة التنشيطية من اللقاح؟

للحصول على أفضل حماية من الإصابات الشديدة بكوفيد 19 التي تتطلب الإقامة في المستشفى ينصح بالجرعة التنشيطية من اللقاح لكافة الأشخاص بدءاً من سن 65 عاماً. خاصة:

- الأشخاص فوق سن 75 عاماً،
- الأشخاص فوق سن 65 عاماً الذين يعانون من أمراض مزمنة والأكثر تعرضاً للإصابة الشديدة بمرض كوفيد 19،
- المقيمين في دور المسنين ومن يتلقون الرعاية في دور الرعاية ومؤسسات الرعاية النهارية لكبار السن.

يمكن أن تساهم الجرعة التنشيطية للقاح بالنسبة للأشخاص بعمر أقل من 65 عاماً في زيادة درجة الحماية من العدوى والإصابات الخفيفة والآثار المترتبة عليها (مثل النتائج طويلة الأمد لمرض كوفيد 19، الغياب عن العمل) وتقليل دورة الفيروس مؤقتاً. لذلك فإننا ننصح أيضاً بأخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح لكافة الأشخاص بدءاً من سن 16 حتى 64 عاماً. وبوجه خاص:

- بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص تحت سن 65 عاماً والذين يعانون من أمراض مزمنة والأكثر تعرضاً للإصابة الشديدة بمرض كوفيد 19.
- وللمقيمين ومن يتلقون الرعاية تحت سن 65 عاماً في دور المسنين ودور الرعاية ومؤسسات الرعاية النهارية لكبار السن.
- لأطعم الصحية الذين لديهم اتصال مباشر بالمرضى وأطعم رعاية المعرضين للخطر بشكل خاص.

يوصى الحوامل أيضاً بدءاً من الثلث الثاني لفترة الحمل والمرضعات بأخذ الجرعة التنشيطية.

متى ينبغي أن يتم أخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح؟

يمكن إعطاء الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد 6 أشهر على الأقل من التطعيم الأساسي الكامل بلقاح mRNA. يتم التطعيم الأساسي الكامل بعد

- أخذ جرعتين من لقاح mRNA، أو
- حدوث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا + جرعة من لقاح mRNA

بفاصل زمني 4 أسابيع (بغض النظر عن الترتيب).

في حالة الإصابة بعدوى مؤكدة لفيروس كورونا بعد التطعيم الأساسي الكامل بلقاح mRNA يسري الآتي:

- في حالة الإصابة بالعدوى خلال 6 أشهر من التطعيم الأساسي يوصى بأخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد هذه العدوى بستة أشهر.
- في حالة الإصابة بالعدوى بعد أكثر من 6 أشهر من التطعيم الأساسي لا يلزم أخذ جرعة أخرى من اللقاح.

ما اسم اللقاح الذي ينبغي أخذ جرعة تنشيطية منه وما هي الجرعة المطلوبة؟

بصفة أساسية ينبغي قدر الإمكان أخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح نفسه الذي تم أخذ التطعيم الأساسي به. في حالة عدم توفر هذا اللقاح يمكن أيضاً استخدام لقاح mRNA آخر. في حالة استخدام لقاحين mRNA مختلفين في التطعيم الأساسي يمكن أن يتم أخذ الجرعة التنشيطية بأحد اللقاحين المستخدمين.

كما هو الحال مع التطعيم الأساسي يوصى أن يتلقى الأشخاص تحت 30 عاماً الجرعة التنشيطية بلقاح فايزر/بيونتيك.

في حالة اللقاح فايزر/بيونتيك يتم في الجرعة التنشيطية إعطاء الجرعة نفسها التي تم أخذها في التطعيم الأساسي. في حالة اللقاح موديرنا يتم في الجرعة التنشيطية إعطاء نصف الجرعة السابقة.

أين يمكنني الحصول على التطعيم؟

الكانتونات هي المسؤولة عن التطعيم. استعلم عن أماكن التسجيل والتطعيم، سواء على موقع الإنترنت أو من خلال خط المعلومات للكانتون الخاص بك (www.bag-coronavirus.ch/kantone). أو اسأل طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

بقية المعلومات الخاصة بالجرعة التنشيطية من اللقاح هي نفس المعلومات الخاصة بالتطعيم الأساسي ويمكن الاطلاع عليها في النشرة «معلومات عامة حول التطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA».

¹ الجدول 2، صفحة 11 من التوصية بأخذ لقاح mRNA:

تعريفات المرض بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأكثر تعرضاً للإصابة (بالألمانية)