



DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Contatando Zonaprotetta é possível fazer com um preço facilitado no Serviço das Doenças Infecciosa do hospital Civico de Lugano, um screening geral de forma anônima das doenças sexualmente transmissíveis (DST).

PRIVACIDADE NO CONSULTÓRIO MÉDICO

Médicos particulares especializados podem fazer os vários testes de DST e o teste de HIV também em forma rápida; encontre alguns nomes e indicações diretamente na página www.zonaprotetta.ch/testpertutti

Muitas vezes os especialistas são dispostos a estabelecer com os pacientes as estratégias que garantem a máxima discrição possível, também sem perder a forma anônima (Ex. Pagamento sem passar pelo plano de saúde).

INFORMAÇÃO

É importante informar-se sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST) e suas maneiras de contágio.

PROTEÇÃO

O preservativo protege contra a maioria das doenças sexualmente transmissíveis.

CONTROLE

Os testes efetuados o mais rápido possível, permitem que se inicie em tempo um tratamento que pode levar a cura ou limitar as piores consequências.

TRATAMENTO

As infecções de HIV, hepatite e sífilis, se não são tratadas podem levar à várias consequências muito graves.

Testpertutti è una iniziativa de:

Zonaprotetta.ch
AIUTO AIDS TICINO

com o apoio de:

ti
Dipartimento della sanità e della socialità
Sezione sanitaria

AIUTO AIDS SVIZZERO
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIDS-HILFE SCHWEIZ

miges plus



DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

ONDE FAZEMO TESTE ANONIMAMENTE

ZONAPROTETTA

Informações anônimas sobre HIV E DST

Via Bagutti 2 - 6900 LUGANO

T 091 923 17 17

www.zonaprotetta.ch

TESTE HIV

Pode-se fazer o teste HIV anônimo pagando em dinheiro o valor (entre 30/50.-CHF) nos Centros de Planejamento Familiar nos hospitais de :

Locarno T 091 811 45 51

Bellinzona T 091 811 92 32

Mendrisio T 091 811 36 50

Ou mesmo nos serviços de Doenças Infecciosas

Nos hospitais de:

Lugano T 091 811 60 21

Locarno T 091 811 47 15

Bellinzona T 091 811 89 86

No serviço de doenças infecciosas de Lugano e de Locarno é possível fazer o teste de HIV rápido.

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	VIAS DE TRANSMISSÃO	PRIMEIROS SINTOMAS
HIV	Relações sexuais (vaginais/ anais/orais) sem proteções	Depois de 3/4 semanas, os sintomas são iguais aos da gripe
HEPATITE B	Relações sexuais (vaginais/ anais/orais) sem proteções	Muitas vezes assintomática Fadiga, dores articulares, amarelamento da pele e mucosa etc.
CLAMÍDIA	Relações sexuais (vaginais/ anais/orais) sem proteções	Em geral os sintomas são poucos, como secreções e ardor uretral; nas mulheres dores abdominais baixos e nos homens uretrite
GONORRÉIA	Relações sexuais (vaginais/ anais/orais) sem proteções	Muitas vezes assintomática nas mulheres, ou secreções purulenta, ardor urinário, uretrite
SÍFILES	Relações sexuais (vaginais/ anais/orais) sem proteções. Contato com pele que tenha lesões ativas	1ª fase: úlcera indolor no ponto de entrada da bactéria
HERPES GENITAL	Relações sexuais (vaginais/ anais/orais) sem proteções. Contato com pele que tenha lesões ativas	Lesões genitais vesiculares e purulentas (em forma de pequenas bolhas) principalmente na parte genital
HPV CONDILOMA ACUMINADO	Relações sexuais (vaginais/ anais/orais) sem proteções. Contato com pele que tenha lesões ativas	Muitas vezes assintomática ou lesões verrucosas (verrugas) na região anal, genital, oral, mesmo após um longo período de latência (meses ou anos)

DESENVOLVIMENTO	TESTE PARA DIAGNOSTICAR	VACINA	TRATAMENTO
Se os sintomas não são tratados de deficiência imunológica (AIDS), leva à morte	Exames realizados no sangue	Não	Drogas antivirais que inibem a replicação do HIV e controles regulares num centro especializado
Cirrose hepática, Câncer do fígado	Exames realizados no sangue	Sim	Na fase aguda não há nenhum tratamento. A infecção crônica pode ser tratada com medicamentos antivirais
Nas mulheres, risco de ficar estéril	Pesquisa do agente em material uretral e/ou vaginal e teste na urina	Não	Antibiótico
Nas mulheres, risco de ficar estéril	Pesquisa do agente em material uretral e/ou vaginal e teste na urina	Não	Antibiótico
2ª fase: glândulas linfáticas inchadas e anormalidade da pele e das membranas mucosas. 3ª fase: comprometimento de vários órgãos	Exames realizados no sangue	Não	Antibiótico
idem, como primeiros sintomas	Exames realizados no sangue	Não	Antiviral
Câncer do colo uterino para as mulheres. Formação de verrugas	Especializado exame médico	Vacinação. Recomendado para meninas com idade entre 11 e 14 anos	Local antiviral muitas vezes de longa duração. A remoção de tecidos tumorais e/ou verrugas genitais