VIH/SIDA CE QUI EST RISQUÉ ET CE QUI NE L'EST PAS

INFORMATIONS POUR LES HOMMES

LE SIDA EST UNE MALADIE DANGEREUSE... dont on ne guérit pas à l'heure actuelle. Le sida est répandu dans le monde entier et est un problème en Suisse également.

Le sida est la conséquence d'une infection par le virus VIH (le VIH). Au fil des ans, le VIH diminue la capacité du corps à se défendre contre les maladies. Un jour ou l'autre, le corps se retrouve sans défense face à de nombreuses maladies. Voilà pourquoi les personnes infectées par le VIH (autrement dit «séropositives») tombent malades et le sont de plus en plus. C'est cela que l'on appelle le sida.

PROTECTION: Ce dépliant vous montre où l'on risque de s'infecter par le VIH. Et comment vous pouvez vous protéger et protéger efficacement vos partenaires du VIH/sida!

LE SIDA N'EST PAS GUÉRISSABLE... mais il existe des médicaments qui freinent nettement l'évolution d'une infection à VIH. En Suisse, tout le monde a droit à des traitements efficaces, quel que soit le statut de séjour.

Il vaut la peine de savoir si l'on est infecté ou non par le VIH. Plus de détails à ce sujet: voir dos du dépliant.



RISQUE

Le VIH se transmet lors des contacts sexuels pour lesquels on n'utilise pas un préservatif. Le préservatif est la meilleure protection contre le VIH/sida et d'autres maladies transmissibles.

RELATIONS ANALES (sodomie) sans préservatif



● ● ■ Risque très élevé

pour les deux partenaires, même sans éjaculation

■ Se protéger avec: un préservatif et suffisamment de lubrifiant



RELATIONS VAGINALES sans préservatif



● ● ○ Risque élevé

pour l'homme et la femme, même sans éjaculation

■ Se protéger avec: un préservatif

RELATIONS BUCCOGÉNITALES (bouche-parties génitales) sans protection



● ○ ○ II y a un risque

■ Se protéger: pas de stimulation orale d'une femme pendant ses règles.
Pas d'éjaculation dans la bouche!

Ne pas avaler de sperme!

COMMENT UTILISER UN PRÉSERVATIF

1. Vérifier que l'emballage est intact.



2. Déchirer prudemment l'emballage en s'aidant de l'encoche; sortir le préservatif.

3. Tirer le prépuce vers l'arrière (s'il n'y a pas eu circoncision).



 Tenir le préservatif encore enroulé par le réservoir entre le pouce et l'index et le poser sur le gland. L'anneau est à l'extérieur.



 Dérouler. Cela doit aller facilement. Sinon, c'est qu'il est trop étroit ou trop large ou qu'il est mis du faux côté (anneau dirigé vers l'intérieur).



 Après avoir joui: avant le relâchement du membre, tenir fermement le préservatif à la base et retirer le membre avec le préservatif.

Au fait: Savez-vous qu'il existe aussi un préservatif pour la femme (Femidom®) que l'on introduit dans le vagin avant les relations sexuelles? Mais le préservatif pour homme est plus simple d'emploi et meilleur marché.

AUTRES MODES DE TRANSMISSION DU VIRUS

D'UNE MÈRE SÉROPOSITIVE À SON ENFANT



Une mère porteuse du VIH peut infecter son enfant pendant la grossesse, à la naissance ou en l'allaitant.

● ● ■ Risque très élevé

■ Se protéger: des mesures médicales appropriées permettent d'éviter la transmission du virus si la future mère est porteuse du VIH

CONSOMMATION DE DROGUE



Si des seringues et des aiguilles sont partagées pour la consommation de drogue.

● ● ■ Risque très élevé

Se protéger: matériel d'injection propre (seringue, aiguille, filtre, coton, cuillère, eau); ne pas partager le matériel d'injection

Sans ces mesures de protection, il y a en plus un gros risque de s'infecter avec le virus de l'hépatite C (VHC), lui aussi dangereux.

ACTES MÉDICAUX/CIRCONCISIONS

● ● ■ Risque très élevé

Une transmission du VIH est possible si des instruments (seringues, couteaux,...) ne sont pas stériles pour des interventions médicales, circoncisions, tatouages, etc. et s'ils sont utilisés pour plusieurs personnes. Le VIH peut aussi se transmettre à l'occasion d'une transfusion si les produits sanguins n'ont pas été testés.

○○○ Aucun risque

En Suisse, de tels cas ne se produisent pas si l'intervention est effectuée par des professionnels reconnus du milieu médical.

AUCUN RISQUE





Travail – toilettes Lavabos



Eternuement, toux









Utiliser la même vaisselle Boire dans le même verre





Piqûres d'insectes Piscine, sauna

Cette liste le prouve: dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun risque de transmettre le VIH ou de s'infecter. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur des gens vivant avec le VIH/sida ni de les exclure de la vie sociale ou du monde du travail.

Pas de risque non plus dans les situations suivantes:





S'embrasser ou se masturber réciproquement (avec les mains) Relations sexuelles protégées (avec un préservatif)

ME SUIS-JE INFECTÉ OU PAS?

C'est seulement en étant au courant de son infection à VIH que l'on ne rate pas le meilleur moment pour commencer une thérapie.

TEST VIH

Seul un test médical du VIH peut dire si vous avez une infection à VIH ou non. En effet, au début d'une infection à VIH, il n'y a souvent aucun problème de santé.

En règle générale, il ne faut faire un test que trois mois après le dernier comportement risqué (par exemple relations sexuelles sans préservatif); ce n'est qu'à ce moment-là que le test donne dans tous les cas un résultat fiable. Mais si vous vous êtes infecté, vous pouvez déjà transmettre le virus pendant ces trois premiers mois.

Si le résultat du test est «négatif», cela signifie que jusqu'à présent, vous n'avez pas contracté le virus; «positif» signifie que vous êtes séropositif, autrement dit que vous avez une infection à VIH.

PERSONNE N'EN SAIT RIEN

Dans les grands hôpitaux ou directement dans des laboratoires, vous pouvez faire le test sans devoir indiquer votre nom. Ainsi, personne ne sait que vous avez fait un test ni quel en a été le résultat.

CONSULTATION AVANT LE TEST

Demandez absolument conseil avant le test: dans une antenne régionale de l'Aide Suisse contre le Sida, à l'hôpital, au laboratoire ou chez votre médecin. Ou contactez le cas échéant une personne de confiance dans le domaine de l'asile.

Pour des renseignements (anonymes) sur des adresses, matériel d'information, centres de dépistage, etc. ainsi que pour vos commandes: 044 447 11 11/www.aids.ch

Ou directement auprès de:

AUTRES MALADIES SEXUEL-LEMENT TRANSMISSIBLES

D'autres maladies peuvent se transmettre lors des relations sexuelles, par exemple la gonorrhée (chaude-pisse), l'herpès, la syphilis, l'infection à chlamydia ou l'hépatite B.

SYMPTÔMES ET TROUBLES - → MÉDECIN!

Ces maladies occasionnent souvent des troubles typiques

- Ecoulements de la verge de quantité et de couleur variables
- Brûlures en urinant, démangeaisons dans la région de l'urètre
- Douleurs et gonflements dans la région des testicules
- Chancres, vésicules, excroissances, rougeurs et démangeaisons au pénis ou aux testicules
- Douleurs diffuses dans le bas-ventre
- Douleurs en allant à la selle
- Douleur sourde au rectum, écoulement du rectum
- > Excroissances, vésicules à l'anus

Allez rapidement chez le médecin si vous constatez l'un de ces troubles!

Attention: le VIH/sida ne provoque pas ces troubles-là! Seul un test VIH dit avec certitude s'il y a infection ou non.

CONSÉQUENCES

Dépistées à temps, la plupart de ces maladies se soignent. Non traitées, elles peuvent avoir des conséquences graves (cancer ou stérilité par exemple) et elles augmentent fortement le risque d'infection par le VIH/sida.

SE PROTÉGER AVEC: UN PRÉSERVATIF

La meilleure protection contre ces maladies, c'est le préservatif qui l'offre, pour les relations vaginales, anales et même buccogénitales.

Toujours utiliser des préservatifs même pour les relations buccogénitales, c'est particulièrement important pour les contacts avec des prostitué(e)s.

INFORMATION SUR LES PRÉSERVATIFS

PROTECTION

Les préservatifs protègent du VIH/sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Ils peuvent aussi servir à éviter une grossesse.

LES BONS PRÉSERVATIFS/LA BONNE TAILLE

N'utilisez que des préservatifs avec le label de qualité «ok» (en France: NF). En vente dans tous les supermarchés, les drogueries et pharmacies.



Il y a différentes tailles et modèles de préservatifs. Cherchez un produit qui vous convient. Les préservatifs trop étroits ont tendance à se déchirer; trop larges, ils peuvent glisser. Vous trouverez la taille de préservatif qui vous convient sur Internet à l'adresse www.mysize.ch.

DATE DE PÉREMPTION/CONSERVATION

N'utilisez les préservatifs que jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage. – Garder à l'abri de la lumière et de tout objet pointu.

LUBRIFIANT

Utiliser si nécessaire du lubrifiant non gras en suffisance (gel qui facilite la pénétration). En vente dans les supermarchés, drogueries et pharmacies. N'utilisez jamais de la vaseline, des lotions corporelles, des huiles de massage ou de l'huile alimentaire.

Ne jamais enfiler deux préservatifs l'un sur l'autre!

QUE FAIRE SI...

un préservatif se déchire et que votre partenaire (femme ou homme) est séropositif ou qu'il l'est très probablement?

Si vous vous rendez au plus tard le lendemain dans une consultation de l'antenne sida régionale ou à l'hôpital, les spécialistes vous diront ce que l'on peut encore faire. Vous avez réellement une chance, mais un remède simple et garanti efficace n'existe pas dans une telle situation.

VOTRE RESPONSABILITÉ!

Il faut impérativement utiliser un préservatif pour les relations sexuelles. Le préservatif vous protège vous-même, mais aussi les personnes avec qui vous avez des relations sexuelles. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités – ayez toujours des préservatifs sur vous et utilisez-les pour vos relations sexuelles!

Quiconque n'utilise pas de préservatifs et prend le risque d'infecter sa partenaire avec le VIH s'expose à des conséquences pénales – plusieurs années de prison suivant les circonstances!

AU FAIT

Si jusqu'ici vous n'avez pas utilisé de préservatifs pour les relations sexuelles et que vous n'avez malgré tout pas encore contracté le VIH/sida, vous avez tout simplement eu de la chance. **Mais toute autre relation sexuelle sans préservatif comporte toujours un risque d'infection élevé!**

VOUS NE POUVEZ RENONCER SANS DANGER AU PRÉSERVATIF QUE SI LES TROIS CONDITIONS SUIVANTES SONT RÉUNIES:

- → vous vivez au sein d'une relation stable
- → vous et votre partenaire n'avez des relations sexuelles que l'un avec l'autre, et exclusivement
- → vous avez tous deux fait un test VIH, de préférence ensemble, qui a montré qu'aucun de vous n'a le virus

Cela correspond-il à votre situation? En êtes-vous sûr?

INFORMATIONS SUPPLÉMEN-TAIRES ET CONSULTATION

CONSULTATION

Dans toutes les antennes de l'Aide Suisse contre le Sida: sur place ou par téléphone. Sur demande, vous obtiendrez des conseils sans devoir donner votre nom.

Chez un médecin: n'hésitez pas à lui poser des questions sur le VIH/sida. Les médecins sont liés par le secret médical.

Les médecins et leur personnel auxiliaire ne peuvent communiquer à personne ce que vous dites ni ce que les examens révèlent: ni à votre partenaire, ni à la police des étrangers, ni à l'employeur, ni aux collaborateurs de foyers, prisons, etc.

PROBLÈMES LIÉS À LA LANGUE

Voyez dans quelles langues la consultation est proposée. Il se peut que vous deviez vous-même trouver quelqu'un qui fasse la traduction pour vous (interprètes qualifiés via www.inter-pret.ch ou demander à l'antenne sida.)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir d'autres exemplaires de ce dépliant ou d'autres brochures: Aide Suisse contre le Sida, case postale 1118, 8031 Zurich Pour vos commandes: tél. 044 447 11 13, fax 044 447 11 14, shop@aids.ch, www.shop.aids.ch

Pour d'autres renseignements: tél. 044 447 11 11,

fax 044 447 11 12, aids@aids.ch, www.aids.ch

Demandez dans les antennes sida s'il existe des informations dans votre langue, ou cherchez de la documentation sur **www.migesplus.ch**.

Ce dépliant est disponible dans les langues suivantes:

Albanisch, albanais, albanese, Albanian
Amharisch, amharique, amarico, Amharic
Arabisch, arabe, arabo, Arabic
Deutsch, allemand, tedesco, German
Englisch, anglais, inglese, English
Farsi, Iarsi, Farsi
Französisch, français, francese, French
Italienisch, Italien, Italiano, Italian
Kikongo, kikongo, Kikongo, Kikongo, Kurdisch (Kurmanci), Kurdisch (Kurmanci), Kurdisch (Kurmanci), Kurdisch (Kurmanci), Lingala, ingala, Lingala

Portugiesisch, portugais, portoghese, Portuguese

serbo/croato/bosniaco, Serbian/Croatian/Bosnian Somalisch, somalien, somalo, Somali Spanisch, espagnol, spagnolo, Spanish Suaheli, swahili, Swahili Tamilisch, tamoul, tamil, Tamil Thai, thai, Thai Tigrinya, tigrinya, tigrinya, Tigrinya Türkisch, turc, turco, Turkish Ungarisch, hongrois, ungherese, Hungarian

Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, serbe/croate/bosniague,

Rumänisch, roumain, rumeno, Romanian

Russisch, russe, russo, Russian