



Calendario vaccinale svizzero 2017: sintesi

Età	Vaccinazioni di base										Vaccinazioni complementari		
	Difterite Tetano	Pertosse	Poliomielite	Haemophilus In- fluenza tipo B	Epatite B	Morbillo Orecchioni Rosolia	Virus del papil- loma umano (HPV)	Vari- cella	Influenza	Pneumo- cocchi	Meningo- cocchi	Virus del papil- loma umano (HPV)	
2 mesi					2								
4 mesi						2							
6 mesi						2							
12 mesi													
12-15 mesi						2							
15-24 mesi													
4-7 anni													
11-15 anni									3				3
25-29 anni	1								3				5
45 anni													
≥ 65 anni	1												

Definizione dell'età: 4-7 anni significa dal 4° compleanno fino alla vigilia dell'8° compleanno.

- Ogni 10 anni deve essere effettuato un richiamo.
- La vaccinazione contro l'epatite B può pure essere somministrata ai lattanti.
- Quella contro l'HPV è una vaccinazione di base raccomandata per le ragazze e una vaccinazione complementare per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.
- Raccomandata per giovani e adulti (< 40 anni) senza anamnesi di varicella.
- Quella contro l'HPV è una vaccinazione complementare raccomandata alle(ai) giovani adulte(i) fino alla vigilia del 27° compleanno: dopo i primi rapporti sessuali, la decisione sulla vaccinazione deve essere presa caso per caso.

Una volta che una vaccinazione non è stata fatta all'età raccomandata, un recupero ad un'età ulteriore può essere indicata. Altre vaccinazioni possono essere raccomandate in funzione della situazione personale (p.es. gravidanza, malattie croniche, rischio elevato d'esposizione o di trasmissione).