



## Vaccinazione di richiamo con un vaccino a mRNA (Pfizer/BioNTech, Moderna)

I vaccini a mRNA proteggono molto bene da forme gravi di COVID-19 con ospedalizzazione. Nelle persone a partire dai 65 anni, però, con il passare del tempo la protezione può diminuire. A queste persone si raccomanda una vaccinazione di richiamo a partire da quattro mesi dopo l'ultima vaccinazione. Finora non è ancora chiaro se la protezione vaccinale contro i decorsi gravi della malattia diminuisce nelle persone di età inferiore ai 65 anni e per le nuove varianti del virus. La protezione da forme lievi della malattia e dalla trasmissione del virus, invece, diminuisce per tutti con il passare del tempo. A seconda della variante, ciò può avvenire più o meno rapidamente. Per questo raccomandiamo una vaccinazione di richiamo anche a tutte le persone di età compresa tra i 16 e i 64 anni.

### A che cosa serve la vaccinazione di richiamo?

La vaccinazione di richiamo ricorda al sistema immunitario l'agente patogeno. Una protezione vaccinale aumentata viene ripristinata e prolungata.

### A chi è raccomandata la vaccinazione di richiamo?

Per la migliore protezione individuale possibile da un decorso grave della malattia da COVID-19 con ospedalizzazione, la vaccinazione di richiamo è raccomandata per tutte le persone a partire dai 65 anni, in particolare per:

- le persone a partire dai 75 anni;
- le persone a partire dai 65 anni affette da malattie croniche ad altissimo rischio<sup>1</sup> di decorso grave della malattia da COVID-19;
- i residenti e le persone assistite in case per anziani, case di cura o centri diurni per anziani.

Nelle persone sotto i 65 anni, la vaccinazione di richiamo può contribuire ad aumentare la protezione dalle infezioni e dai decorsi lievi della malattia e dalle sue conseguenze (p. es. conseguenze a lungo termine della COVID-19, assenza dal lavoro) e a ridurre temporaneamente la diffusione del virus. Per questo la vaccinazione di richiamo è raccomandata anche per tutte le persone dai 16 ai 64 anni, in particolare per:

- le persone particolarmente a rischio sotto i 65 anni affette da malattie croniche ad altissimo rischio<sup>1</sup> di decorso grave della malattia da COVID-19;
- i residenti e le persone assistite sotto i 65 anni in case per anziani, case di cura o centri diurni per anziani;
- il personale sanitario a contatto diretto con i pazienti e il personale di assistenza delle persone particolarmente a rischio.

La vaccinazione di richiamo è raccomandata anche alle donne in gravidanza a partire dal secondo trimestre di gravidanza e a quelle che allattano.

### Quando va somministrata la vaccinazione di richiamo?

La vaccinazione di richiamo è raccomandata a partire da quattro mesi dopo l'immunizzazione di base completa con un vaccino a mRNA, ossia dopo:

- due dosi di un vaccino a mRNA; o
- un'infezione confermata da coronavirus + una dose di vaccino a mRNA a distanza di almeno quattro settimane (indipendentemente dall'ordine).

Se è stata confermata un'infezione da coronavirus dopo l'immunizzazione di base completa con un vaccino a mRNA si applica quanto segue:

- in caso d'infezione entro quattro mesi dall'immunizzazione di base si raccomanda una vaccinazione di richiamo sei quattro dopo l'infezione;
- in caso d'infezione dopo più di quattro mesi dall'immunizzazione di base, una vaccinazione di richiamo non è attualmente necessaria.

### Con quale vaccino e con quale dosaggio è somministrata la vaccinazione di richiamo?

Nei limiti del possibile, per la vaccinazione di richiamo è utilizzato lo stesso vaccino somministrato per l'immunizzazione di base. Se tale vaccino non è disponibile si può anche fare ricorso all'altro vaccino a mRNA. Se per l'immunizzazione di base sono stati utilizzati vaccini a mRNA differenti, la vaccinazione di richiamo può avvenire con uno dei due vaccini. Come per l'immunizzazione di base, alle persone sotto i 30 anni è raccomandata preferibilmente la vaccinazione di richiamo con il vaccino di Pfizer/BioNTech.

Con il vaccino di Pfizer/BioNTech, per la vaccinazione di richiamo è somministrato lo stesso dosaggio dell'immunizzazione di base. Con il vaccino di Moderna, per la vaccinazione di richiamo il dosaggio è dimezzato.

### Dove posso farmi vaccinare?

L'attuazione compete ai Cantoni. Per informazioni su dove potete registrarvi e farvi vaccinare, consultate il sito Internet o chiamate l'Infoline del vostro Cantone ([www.ufsp-coronavirus.ch/cantoni](http://www.ufsp-coronavirus.ch/cantoni)) oppure rivolgetevi al vostro medico o farmacista.

**Per il resto, alla vaccinazione di richiamo si applicano le stesse informazioni dell'immunizzazione di base, consultabili nel promemoria «Informazioni generali sulla vaccinazione anti-COVID-19 con un vaccino a mRNA».**

