



Vaccinazione di richiamo con un vaccino a mRNA (Pfizer/BioNTech, Moderna)

I vaccini a mRNA proteggono molto bene da forme gravi di COVID-19 con ospedalizzazione. Nelle persone a partire dai 65 anni, però, con il passare del tempo la protezione può diminuire. A queste persone si raccomanda una vaccinazione di richiamo a partire da sei mesi dopo l'ultima vaccinazione. Nelle persone di meno di 65 anni, per ora non si osserva alcuna diminuzione della protezione vaccinale da forme gravi della malattia. Questo vale anche per le persone particolarmente a rischio affette da malattie croniche in questa fascia d'età. Per il momento, la vaccinazione di richiamo non è quindi generalmente raccomandata al di sotto dei 65 anni.

A che cosa serve la vaccinazione di richiamo?

La vaccinazione di richiamo ricorda al sistema immunitario l'agente patogeno. La protezione vaccinale massima è ripristinata e prolungata.

A chi è raccomandata la vaccinazione di richiamo?

Per garantire una protezione ottimale contro le forme gravi di COVID-19 con ospedalizzazione si raccomanda la vaccinazione di richiamo:

- alle persone a partire dai 65 anni (soprattutto a quelle a partire dai 75 anni e a quelle a partire dai 65 anni affette da malattie croniche ad altissimo rischio¹ di decorso grave di COVID-19);
- ai residenti e ai pazienti di case per anziani, case di cura o centri diurni per anziani.

A chi la vaccinazione di richiamo è raccomandata a determinate condizioni?

Una vaccinazione di richiamo non è generalmente raccomandata, ma in singoli casi può essere raccomandata su richiesta e previa valutazione con il medico curante:

- alle persone di meno di 65 anni particolarmente a rischio affette da malattie croniche ad altissimo rischio¹ di decorso grave di COVID-19.

Per chi può essere presa in considerazione in singoli casi una vaccinazione di richiamo, pur non essendo raccomandata?

Una vaccinazione di richiamo può essere somministrata nel singolo caso, su richiesta e previa analisi rischi-benefici assieme al medico competente:

- ai professionisti della salute in situazioni lavorative particolari in strutture sanitarie particolarmente esposte (p. es. reparti COVID-19, reparti di cure intense, case per anziani o case di cura per anziani).

Quando va somministrata la vaccinazione di richiamo?

La vaccinazione di richiamo può essere somministrata al più presto sei mesi dopo l'immunizzazione di base completa con un vaccino a mRNA, ossia dopo:

- due dosi di un vaccino a mRNA; o

- un'infezione confermata da coronavirus + una dose di vaccino a mRNA a distanza di almeno quattro settimane (indipendentemente dall'ordine).

Se è stata confermata un'infezione da coronavirus dopo l'immunizzazione di base completa con un vaccino a mRNA si applica quanto segue:

- in caso d'infezione entro sei mesi dall'immunizzazione di base si raccomanda una vaccinazione di richiamo sei mesi dopo l'infezione;
- in caso d'infezione dopo più di sei mesi dall'immunizzazione di base non è necessaria nessun'altra vaccinazione.

Con quale vaccino e con quale dosaggio è somministrata la vaccinazione di richiamo?

Nei limiti del possibile, per la vaccinazione di richiamo va utilizzato lo stesso vaccino somministrato per l'immunizzazione di base. Se tale vaccino non è disponibile si può anche fare ricorso all'altro vaccino a mRNA. Se per l'immunizzazione di base sono stati utilizzati vaccini a mRNA differenti, la vaccinazione di richiamo può avvenire con uno dei due vaccini.

Con il vaccino di Pfizer/BioNTech, per la vaccinazione di richiamo è somministrato lo stesso dosaggio dell'immunizzazione di base. Con il vaccino di Moderna, per la vaccinazione di richiamo il dosaggio è dimezzato.

Dove posso farmi vaccinare?

L'attuazione compete ai Cantoni. Per informazioni su dove potete registrarvi e farvi vaccinare, consultate il sito Internet o chiamate l'Infoline del vostro Cantone (www.ufsp-coronavirus.ch/cantoni) oppure rivolgetevi al vostro medico o farmacista.

Per il resto, alla vaccinazione di richiamo si applicano le stesse informazioni dell'immunizzazione di base, consultabili nel promemoria «Informazioni generali sulla vaccinazione anti-COVID-19 con un vaccino a mRNA».

¹ Tabella 2 della raccomandazione di vaccinazione COVID-19 per i vaccini a mRNA: *Definizioni di malattia per persone adulte con malattie croniche ad altissimo rischio*