



**Zürcher Fachstelle zur
Prävention des
Alkohol- und Medikamenten-
Missbrauchs**

Langstrasse 229, Postfach
CH-8031 Zürich
Telefon 044 271 87 23
Fax 044 271 85 74
info@zuefam.ch
www.zuefam.ch

In Zusammenarbeit mit:



Finanzielle Unterstützung der Übersetzungen:

migesplus



Mit finanzieller Unterstützung von:

- Amt für Gesundheit Fürstentum Liechtenstein
- Amt für Gesundheit und Soziales Kanton Schwyz
- AVINA STIFTUNG Hurden
- Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden
- Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud
- Direktion für Gesundheit und Soziales, Kanton Fribourg
- Ernst Göhner Stiftung Zug
- Fachstelle für Integration der Stadt Winterthur
- Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
- Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen
- Gesundheitsamt des Kantons Zug
- Integrationsförderung der Stadt Zürich
- Kantonsärztlicher Dienst Kanton Thurgau
- Lotteriefonds Basel-Landschaft
- migesplus Schweizerisches Rotes Kreuz
- Migros-Kulturprozent
- pharmaSuisse, Schweizerischer Apothekerverband
- Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland
- Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich



Zu diesem Thema ist auch der Film «Benzo&Co.: Vom Umgang mit Medikamenten.» in folgenden Sprachen erhältlich: Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Persisch, Portugiesisch, Somalisch, Spanisch, Tamilisch, Türkisch. Zu beziehen bei der ZüFAM.

IMPRESSUM

Herausgeberin: ZüFAM, Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol- und Medikamentenmissbrauchs, in Zusammenarbeit mit FISP, Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung. Lektorat: Ines Flück Zaugg, sprachart, Wettingen. Gestaltung: Andrea Birkhofer, Rotwand Ateliers, Zürich. Druck: Künzle Druck, Zürich. Bezugsadresse: ZüFAM, info@zuefam.ch oder 044 271 87 23. Publikation: Juni 2008. In folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch, Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Somalisch, Spanisch, Tamilisch, Türkisch.

Übersetzung: Malak Jmmo

(الجدول الثالث)

Psychopharmaka

هي تغير خاص بالأدوية التي تستخدم لمعالجة الآلام أو المعاناة الروحية أو النفسية. إنها تؤثر في سير بعض القناعات الكيماوية في الدماغ. كما أنها تؤثر وتغير في الإحساس بالواقع، وفي طريقة التفكير، وفي درجة الحساسية، وكذلك المعاشرة وطريقة التصرف. وهنا بعض الأدوية التي تتضمن لهذه الصيدلية: Benzodiazepine, Antidepressiva, Neuroleptika und Stimmungsstabilisatoren.

كبدائل ل Benzodiazepinen

يمكن أيضاً وبدرجة أقل استخدام Antidepressiva, Neuroleptika لا تتوافر لديهما احتفالات أو القدرة على أن يتعود الشخص عليهم، أي لا مخاطر من أن يصبح الشخص أسير هذين الدواعين، لكن لا يجب وبكل الأحوال تناول هذه الأدوية دون معالجة نفسية.

(الجدول الرابع) ^١

هنا بعض الأدوية التي تزداد فيها احتمالات الإدمان.

أدوية مهدئة مع مادة التأثير:

Benzodiazepin.

وهناك أيضاً:

Anxiolit®, Demetrin®, Lexotanil®, Lorasifar®, Paceum®, Seresta®, Stesolid®, Temesta®, Tranxilium®, Urbanyl®, Valium®, Xanax®.

أدوية مساعدة على النوم مع مادة التأثير:

Benzodiazepin.

وهناك أيضاً:

Dalmadorm®, Dormicum®, Halcion®, Loramet®, Mogadon®, Noctamid®, Normison®, Rohypnol®, Somnium®.

ان الاعتماد على Benzodiazepine يمكن أيضاً ان يتضمن حتى مع جرعات قليلة.

ان Stilnox® ليس Benzodiazepin لكنه يملك ذات القدرة على امكانية التعود عليه.

بدائل لا تحتوي على مخاطر الإدمان.

أكثر الوصفات المضادة للإكتئاب : Antidepressiva

Citalopram (Seroprama®), Paroxetin (z.B. Deroxat®), Fluoxetin (z.B. Fluctine®, Fluocim®), Mirtazepin (Remeron®), Trimipramin (z.B. Surmontil®, Trimin®), Mianserin (z.B. Tolvon®).

Truxal®

دواء يستخدم في معالجة الأمراض النفسية (ما يسمى

. () Neuroleptika

نباتات شافية: على سبيل المثال. Baldrian, Hopfen.

لا يعتبر ما ورد كل التعداد العام للأدوية المهدئة والمساعدة على النوم، بل مجموعة هي الأكثر تداولاً في سويسرا.

(الجدول الأول)

- جملة أعراض تدل على إضطراب كائن، لكن يمكن ان تكون مؤشراً على الإكتاب أو حالة خوف:
- تعب عام
 - وهن
 - اضطرابات في النوم
 - آلام متكررة سواء في الرأس أو في الظهر
 - خفقان في القلب
 - الشعور بالقطuten وانكسار النفس والإستسلام
 - الدوخة
 - اضطرابات في عملية الهضم
 - مخاوف ذو أوجه عديدة
 - الشعور بعدم الأمان
 - الشعور بسخط وغضب داخلي
 - حساسية مفرطة
 - العدوانية
 - الانطوائية وعدم الاختلاط بالبيط الاجتماعي
 - شعور دائم بوجود أعباء فوق طاقة الشخص

(الجدول الثاني)

Benzodiazepine لا يعطي إلا عن طريق وصفة طبية. والذي يستخدم في معالجة قصيرة المدى، وذلك للتعافي من تبعات التوتر والهيجان، وحالات الخوف، وكذلك من اضطرابات جسدية نفسية متداخلة. له تأثير يساعد على إزالة المخاوف، وكذلك يقوم بدور المهدأ، بالإضافة إلى أنه يقوم بامتصاص التوتر العدوانية ويلطفهما، وأخيراً فإنه يساعد على النوم.

Benzodiazepine يحتوي وبدرجة كبيرة على مواد من شأنها ان تقود إلى الاعتماد عليه. سواء جسدياً او نفسياً. ان امكانية التعود على هذا الدواء واردة بعد أسبوعين أو ثلاثة. ان الاعتماد على هذا الدواء لا يظهر بمظاهر ان الشخص قد تعود عليه فعلاً، وقد تستمر هذه الحالة سنوات عديدة.

حسب الجرعات وحساسية الشخص، فإن هذا الدواء ممكن ان يؤدي إلى تأثيرات جانبية غير محببة، منها الشعور بالتعب، وجع الرأس، القنوط، وهن في العضلات، التتميل أو فقدان الحس، والشعور بالدوخة.

يجب على من يود إيقاف Benzodiazepinen ان يبقى في ذهنه مسألة هامة، وهي انه وبحسب العمر، والجرعات، وقبل كل شيء حسب المدة، انه قد يتعرض إلى عوارض امتناع. لذلك يجب ان تكون هذه الخطوة من هونة باستشارة ومرافقة طبية.

هنا بعض الأمثلة:

- محبط عائلي مستقر، وأحوجاء ودية
- الاتصال بالأصدقاء والجيران
- عمل منتظم
- حالة مادية مستقرة
- وجود برنامج يومي منظم وهادف
- ان تجعل نفسك مفيدة، وذلك بدون ان تشعر بأنك مُستغل
- معرفة اللغة السائدة في البلد الذي انت فيه تساعدك وتحميك من ان تكون في عزلة اجتماعية.
- صحة جسمانية
- معرفة كيفية التغلب على الضغط النفسي دون اللجوء إلى الأدوية
- ان تكون لك مداخل وآليات للوصول إلى مراكز الاستشارة والاستعلامات

هذه الشروط النفسية يمكن ان تلعب دوراً واقياً:

- الشعور بالرضا عن النفس
- القدرة على التواصل مع علاقات مستقرة
- تحمل الضغط والإحباط وإيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع هكذا حالات
- ان تقضي في ما هو داخلك، وان تواجه الصراعات وتحاول ان تجد لها الحلول
- ان لا تهمل احتياجاتك الخاصة، بل أصغي لها وحاول ان تلبيها
- ان يكون لديك آليات ناجعة لمداواة اي خسارة شخصية قد تتعرض لها

- **مراكز استشارة عامة:**
عدة مراكز استشارة مختلفة بإمكانها تقديم الدعم وذلك حسب نوع المشكلة (على سبيل المثال: استشارة اجتماعية، استشارة للألم وللأب، استشارة للمهاجرات والمهاجرين).
- **عيادات مختصة للسيدات:**
ان Forel Klink تمتاز ب أنها تملك مركز خاص للسيدات المدمنات على المشروبات الروحية،
والأدوية، بالإضافة إلى المدمنات على التدخين.
Forel Klinik, Abteilung Hirschen, tössstralstrasse 65,8488 Turbenthal,
052 396 28 00
- **معلومات حول الأدوية**
- في هذا الموقع الخاص لمشاكل الإدمان من المخدرات والمشروبات الروحية، يمكن تحت هذا العنوان [استلة - أجوبة] طرح أسئلة حول مواضيع متعلقة بالأزمات المرتبطة بالأدوية، وذلك بدون ذكر أسماء، أو تحت أسماء مستعارة.
www.sfa-ispa.ch
- ان مركز استعلامات الأدوية السويسرية (SMI)
يقوم باستشارة للمرضى وكذلك معلومات.
رقم التلفون:
0900 573 554
www.media-info.ch
- { الصيدلية المتعلقة بالجانب النفسي، والمجهزة لتدارك موافق معينة } .
Andreas Knuf und Margret Osterfeld.
الناشر:
Pro Mente Sana,
الطلب:
www.promentesana.ch , 044 563 68 00
- جدول بالأدوية المسومة (المرخصة) في سويسرا تحت:
((Arzneimittel-Kompendium der Schweiz)), www.kompendium.ch
- على الشخص الذي يتربّد على الطبيبة أو الطبيب، أو على الصيادلة، ان لا يخجل أو يقلق من طرح أي استلة. لا بل انه من الحكمة ان يستمع الشخص إلى رأي آخر، سواء عن طريق طبيبة أو طبيب.
- العوامل الواقية من الوقوع في فخ الإدمان.
- ان بعض الظروف المعينة، وجملة عوامل نفسية هي قادرة على ان تقدم عوناً لشخص يمر بموافق صعبة، ونساعده في ان يتغلب عليها، وتجنبه من ان يلجأ إلى تعاطي الأدوية.

هنا مجموعه من الوسائل العلاجية:

- **معالجة نفسية:** ان المعالجة أو المعالج يساعد على ان يفهم المريض لماذا يشعر بهذه الحالة، ولماذا يفكر هكذا، ولماذا يتصرف بهذا الشكل.

من سيتكلف بالنفقات المالية؟

ان صندوق التأمين الصحي يتتكلف بنفقات المعالجة حالما يخضع المريض للعلاج سواء عن طريق الطبيب النفسي أو الطبيبة النفسية، أو عن طريق العلاج النفسي الذي يتم بشكل وثيق مع الطبيبة او الطبيب.

أين يجد المرء معالجة مناسبة؟

الأطباء النفسيين (أيضاً بلغات أجنبية) :

كانتون زيوريخ:

www.therapievermittlung.ch

Schweiz : www.psychiatrie.ch

Therapieplatzvermittlung (044 266 64 01) :
— spv —

ان هذا المكتب يقوم بدور الوسيط مجانيًّا فقط مع العناوين أو المعالجات النفسيات والمعالجين النفسيين الذين ينتسبون إلى اتحاد المعالجين النفسيين السويسريين.

قائمة العناوين

FSP (031 388 88 00)

هنا قائمة بعناوين الأطباء النفسيين والذين ينضويون تحت اتحاد المعالجين النفسيين السويسريين.

- **مراكز استشارة في مجال الإدمان:** هذه المراكز تقدم خدمات تتضمن مقابلات مع الأشخاص المدمنين سواءً أحادية أو مع الشريك، أو عائلية.

عناوين مراكز الاستشارة لمعالجة الإدمان.

بالنسبة لكانتون زيوريخ:

Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol- und Medikamentenmissbrauchs (ZüFAM), 044 271 87 23,
www.zuefam.ch
— Für alle weiteren Kantone:
www.infoset.ch

ان تناول الأدوية على مدى طويل يمكن ان يكون له آثار غير محببة أو غير متوقعة.

- الشعور بال الخمول
- ضعف التركيز
- الشعور بالقطوط وانكسار النفس، وتلاشي القدرة على رد الفعل.

قد ينجم عن إيقاف تناول أدوية كانت تأخذ بشكل منظم، إلى ظهور حالات أو عوارض امتناع (الرعشة، الرجفة، عدم السكينة، اضطرابات في النوم، تداخل أو تشويش في الحواس، كما يسبب الخوف وحالات من التشنج أو المغص). وحتى يتم تجنب كل هذا، يجب ان تتم عملية الإيقاف بطريقة بطيئة ومنهجية بحيث يتم تخفيض الجرعات بشكل تدريجي.

يجب على الشخص المستخدم لهذا الدواء وفي حال قرار إيقافه، ان يكون مرافقاً ومتزاماً مع ارشادات طبية دائمة.

من حيث المبدأ فإن اتباع الوصفات الطبية من قبل الأطباء أمر لا بد منه. أما مع Benzodiazepinen فإن أي وصفة جديدة يجب تجنبها تماماً! وفي حالات الأزمات الحادة فإن تناول Benzodiazepin والمحتوى على مهدئات ومسكنت، ولفترات قصيرة يعتبر أمراً ضرورياً ومحمياً. إن وصف هذه الأدوية يجب أن يكون مرافقاً دائماً مع شرح مسبق لأخطار هذه الأدوية من حيث التعود عليها أو الورق في شرك الإدمان، او إمكانية ان يحتاج المريض لإرشادات ومساعدة مهنية.

ليست فضيحة ان يحتاج الانسان إلى المساعدة.

ان الشخص الذي لا يعرف طعماً للنوم، وذلك لأن ما جرى له كان فوق طاقته، يحاول ان ينتقضن لعلاج مشاكله معتمداً على ارادته. ان وجود مرض جسدي ليس سبباً يدعو للخجل. والمشكلة الروحية تعتبر للكثرين فضيحة. ان الحديث عن هذا النوع من المشاكل مع الشريك أو مع الصديق قد يكون عوناً كبيراً للشفاء، لكن الجدير بالذكر ان هذا النوع من العون قد لا يكون كافياً، إذا لم يتم معالجتها بطريقة احترافية، أي من قبل شخص أكاديمي.

الخذر من Benzodiazepin!

Benzodiazepin يعتبر كمشكلة حقيقة وذلك لاحتواه على مادة مهدئه ومساعدة على النوم.
(قارن بالربع الثاني ,>> Benzos <<).

تعتبر حالياً من أكثر الأدوية تداولاً في مجال Psychopharmaka (قارن المربع الثالث) .

Benzos يعتبر تقبلاً دواء يسير نسبياً، ولا يتطلب الكثير من المشقة من أجل أخذها، كما ان مفعوله يسري بطريقة انسيبافية ولا تتعارض مع الحياة اليومية. الخطر يبقى في ان تعود العادة مع مرور الزمن إلى التعود عليه.

الأدوية التي قد تتضمن مخاطر الإدمان (قارن المربع الرابع) لا يجوز إعطائها في سويسرا إلا بوصفات طبية، دائماً ما يعطي هذه الأقراص للنساء وخصوصاً في الأوقات الصعبة وغالباً ما يتم الإعلام عن الآثار السلبية لهذه الأدوية بطريقة سينية أو غير مهنية، يتم فيها الاستخفاف بأنّ الآثار هذه للأدوية.

الإعتماد على الدواء وعوارض الامتناع

في حالات كثيرة لا يعلم النساء المتضررات بأنهن أصبحن أسيرات لعادة معينة.
المؤشرات المحدزة على هكذا سوء تعاطي للأدوية هي:

- تناول الأدوية بشكل منتظم: حيث ان الشخص لا يغادر المنزل دون تناول الأدوية. أي شكل من اشكال المساعدة هي مرفوضة لهذا الشخص. كما ان تخفيض الجرعات أو حتى تغيير الدواء او إيقافه هي أمور غير واردة على الإطلاق.

- تناول الدواء بشكل كثير أو عشوائي. على سبيل المثال الأدوية المساعدة على النوم تأخذ ضمن أوقات النهار وذلك عند حالات القلق وعدم السكينة التي يشعر بها المريض.

- تناول جرعات إضافية: حيث انه يتم تناول جرعات إضافية وذلك أكثر من الوصفات الطبية المقررة.

- التصرف بطريقة سرية: يتم نسبياً تناول الأدوية بشكل سري، كما ان البحث عن مصادر أخرى للأدوية يتم بطريقة سرية أيضاً.

النوم - والعاقير المهدئة: المخاطر

في سويسرا كل شخص بالغ من أصل عشرة اشخاص يتناول الادوية بشكل منتظم، والتي من الممكن ان تؤدي إلى الإدمان. وبحسب بعض التقديرات، فإن 60,000 شخص مدمون على الأقراص. وهناك 170,000 آخرون معرضون وبنسبة عالية لأن يقعوا في فريسة الإدمان. أكثر الأدوية المستهلكة هي التي تتعلق بمتاعب النوم وكذلك العاقير المهدئة. نسبة النساء المدمنات على الأقراص تعادل ضعف نسبة الرجال المدمنين، وبالاخص النساء المتقدمات في السن. وأن الأقراص لا يتم تناولها بشكل علني، فإنها لهذا السبب لا تظهر في المجتمع كعادة سببية تنتهي عشوائياً تتناول الأدوية. مدمنوا الأدوية يأتون من حيث ترتيب نوعية الإدمان في المرتبة الثالثة بعد المدخنين و مدمني المشروبات الروحية.

العامل المسئية لمخاطر الإدمان

في حياة غالبية النساء هناك مواقف دقيقة وحساسة، فيها تكون الحاجة ماسة إلى أي نوع من الدعم. وتكثر خاصة في تلك المواقف الناتجة عن حالة ما والحيثيات المترتبة عليها: الولادة أو تنشئة الأطفال. بدء العام الجديد، الهجرة، الإنفصال، القاعد، أو موت شريك العمر هي بعض الأمثلة المقاربة. كذلك فقدان العمل أو ضغط الحياة اليومي يقودان في النهاية إلى ذات الدوامة - كأعباء العمل/ العائلة أو بسبب تبعات المسؤولية، حيث أن هناك أقرباء بحاجة إلى الرعاية والاهتمام.

من الممكن أيضاً ان تتأثر صحة المرأة بشكل سلبي من خلال بعض المواقف الحياتية (على سبيل المثال، الفقر، الشعور بالمرء بعدم الاستحسان او القدير في محبيه الاجتماعي، مشاكل في العمل، عدم وجود إقامة قانونية تكفل لصاحبها الشعور بالأمان) أو من خلال خسارة شيء ما، وفي نفس الوقت عدم معالجتها بطريقة احترافية، وصمدة تعود إلى فتررة طويلة (على سبيل المثال تجربة مريرة كالإعتداء الجنسي في الطفولة). كل هذا يمكن ان يطفو على السطح ويسبب الاماً مختلفة سواء روحية أو جسدية، والتي يمكن اختصارها أو تعريفها تحت فهوم مضائق أو إعاقات كائنة. (قارن بالربع الأول).

الأقراص المهدئة، والمسكنة للألم، والمساعدة على النوم تعد بمثابة الوسيط أو الحل السريع. وهي تبدو كما لو أنها تجعل الحياة أسهل، وهي بفعاليتها تبدو كنوع من أنواع الحماية. وبفضلها ترجع الحيوية والطاقة إلى الحياة. هذه الأدوية (توصف عادة بالمؤثرة بالمزاج) لها صفة مشتركة، وهي أنها تساعد بسرعة ضد الأعراض، ولكن ليس ضد المسبب لهذه الأعراض.

النوم - والعقاقير المهدئة:

المخاطر

Arabisch