



Schweizerischer Impfplan 2017: Zusammenfassung

Alter	Basisimpfungen									Ergänzende Impfungen		
	Diphtherie Starrkrampf	Keuchhusten	Kinderlähmung	Haemophilus Influenza Type B	Hepatitis B	Masern Mumps Röteln	Humane Papilloma- viren (HPV)	Varizellen (Wilde Blattern)	Grippe	Pneumo- kokken	Meningo- kokken	Humane Papilloma- viren (HPV)
2 Monate					2							
4 Monate					2							
6 Monate					2							
12 Monate												
12–15 Monate					2							
15–24 Monate												
4–7 Jahre												
11–15 Jahre							3	4				3
25–29 Jahre								4				5
45 Jahre												
≥ 65 Jahre	1											

Zur Präzisierung des Alters: 4–7 Jahre bedeutet vom 4. Geburtstag bis zum Tag vor dem 8. Geburtstag.

1. Eine Auffrischimpfung ist alle 10 Jahre empfohlen.
2. Die Hepatitis-B-Impfung kann bereits bei Säuglingen verabreicht werden.
3. Die Impfung gegen HPV ist eine Basisimpfung für Mädchen und eine ergänzende Impfung für Jungen von 11 bis 14 Jahre.
4. Empfohlen für Jugendliche und Erwachsene < 40 Jahre, die die Varizellen anamnetisch nicht durchgemacht haben.
5. Die Impfung gegen HPV ist eine ergänzende Impfung für junge Frauen und Männer bis 26 Jahre (d. h. bis zum Tag vor dem 27. Geburtstag): Nach dem ersten Geschlechtsverkehr muss ein Entscheid für oder gegen eine Impfung individuell gefällt werden.

Wurde eine Impfung nicht im empfohlenen Alter durchgeführt, kann eine Nachholimpfung zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt sein. Weitere Impfungen können je nach persönlicher Situation (z. B. Schwangerschaft, chronische Erkrankung, erhöhtes Expositions- oder Übertragungsrisiko) empfohlen werden.