

## INSTRUÇÕES DE USO

### MOUNJARO® tirzepatida



**Caneta aplicadora de uso único de 2,5 mg/0,5 mL**

**Caneta aplicadora de uso único de 5 mg/0,5 mL**

**Caneta aplicadora de uso único de 7,5 mg/0,5 mL**

**Caneta aplicadora de uso único de 10 mg/0,5 mL**

**Caneta aplicadora de uso único de 12,5 mg/0,5 mL**

**Caneta aplicadora de uso único de 15 mg/0,5 mL**

#### Uso semanal

*Lilly*

#### Informações importantes que você precisa saber antes de aplicar MOUNJARO

Leia estas Instruções de Uso e a Bula ao Paciente antes de utilizar a sua Caneta Aplicadora MOUNJARO e toda vez que adquirir uma nova. Pode haver informações novas. Estas informações não substituem a conversa com seu médico sobre a sua condição médica ou o seu tratamento.


Fale com seu médico sobre como aplicar MOUNJARO do modo correto.

- MOUNJARO é uma caneta aplicadora de uso único.
- MOUNJARO é utilizado 1 vez por semana.
- Injete somente sob a pele (via subcutânea).
- Você ou outra pessoa podem injetar o medicamento na sua barriga (abdome) ou coxa.
- Outra pessoa pode aplicar a sua injeção na parte posterior do seu braço.

#### Armazenamento e manuseio

- Armazene sua Caneta aplicadora (Caneta) na geladeira entre 2°C e 8°C.
- Você pode armazenar sua Caneta a temperatura ambiente abaixo de 30°C por até 21 dias no total.
- **Não** congele sua Caneta. Em caso de congelamento da Caneta, descarte a Caneta e utilize uma Caneta nova.
- Armazene sua Caneta na embalagem original para proteger a Caneta da luz.
- A Caneta possui partes de vidro. Tenha cuidado ao manuseá-la. Caso derrube a Caneta sobre uma superfície dura, **não** a utilize. Use uma Caneta nova para sua injeção.
- Mantenha sua Caneta MOUNJARO fora do alcance das crianças.

#### Guia das partes



## Preparando para injetar MOUNJARO

**Retire** a Caneta da geladeira.

Não retire a tampa cinza da base até que você esteja pronto para aplicar a injeção.

**Verifique** o rótulo da Caneta para confirmar que você está com o medicamento e a dose certa e que não esteja expirado.

**Inspecione** a Caneta para confirmar que ela não está danificada.

Tenha certeza que o medicamento:


- não está congelado
- não está turvo
- é incolor a levemente amarelo
- não apresenta partículas

**Lave** suas mãos.


## Escolha seu local de injeção

Seu médico pode ajudá-lo a escolher o local de injeção que é melhor para você.






Você ou outra pessoa podem injetar o medicamento na sua barriga (abdome) ou coxa.



Outra pessoa deve aplicar sua injeção na parte posterior do seu braço. Mude (alterne) seu local de injeção a cada semana. Você poderá usar a mesma região do seu corpo, mas certifique-se de escolher um local de injeção diferente nessa região.

**Passo  
1**      **Puxe para fora a tampa cinza da base**



Certifique-se de que a Caneta esteja **Travada**.


**Não** destrave a Caneta antes de posicionar a base transparente sobre a sua pele e estar pronto para aplicar a injeção.

**Puxe** a tampa cinza da base para fora em linha reta e descarte-a em seu lixo doméstico.


**Não** coloque a tampa cinza de volta à base – isso pode danificar a agulha.

**Não** toque a agulha.

**Passo  
2**      **Posicione a Base Transparente na pele, depois Destrave**



**Posicione** a base transparente de forma plana contra a sua pele no local da injeção.



**Destrave** girando o anel de travamento.

**Passo  
3 Pressione e Segure por até 10 segundos**



**Pressione e Segure** o botão de injeção roxo.

**Ouça** para o:

- Primeiro clique = injeção iniciada
- Segundo clique = injeção concluída



Você saberá que a sua injeção está concluída quando o êmbolo cinza estiver visível.

Após sua injeção, coloque a Caneta usada em um recipiente para materiais perfurocortantes.

**Descarte da sua Caneta usada**

- Coloque sua Caneta usada em um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes imediatamente após o uso. **Não jogue (descarte) Canetas em seu lixo doméstico.**
- Caso não tenha um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes, você poderá usar um recipiente de uso doméstico que:
  - seja feito de um plástico resistente;
  - possa ser fechado com uma tampa bem ajustada e resistente a perfurações, que impeça a saída de materiais perfurocortantes;
  - fique em posição vertical e estável durante o uso;
  - seja à prova de vazamentos;
  - e seja devidamente rotulada para advertir sobre os resíduos perigosos no interior do recipiente.
- Quando seu recipiente para descarte de materiais perfurocortantes estiver quase cheio, você terá de seguir as diretrizes da sua comunidade para o modo correto de descartar o seu recipiente para descarte de materiais perfurocortantes. Pode haver leis locais sobre como você deverá descartar agulhas e seringas usadas.
- **Não recicle seu recipiente para descarte de materiais perfurocortantes usado.**



**Perguntas frequentes**

**O que devo fazer se vir bolhas de ar em minha Caneta?**

Bolhas de ar são normais.

**O que devo fazer se minha Caneta não estiver a temperatura ambiente?**

Não é necessário aquecer a Caneta até a temperatura ambiente.

**O que acontece se eu destravar a Caneta e pressionar o botão de injeção roxo antes de retirar a tampa cinza da base?**

**Não** retire a tampa cinza da base. Descarte a Caneta e pegue uma Caneta nova.

**O que devo fazer se houver uma gota de líquido na ponta da agulha quando eu retirar a tampa cinza da base?**

Uma gota de líquido na ponta da agulha é normal. **Não** toque a agulha.

**Preciso segurar o botão de injeção para baixo até que a injeção seja concluída?**

Isso não é necessário, mas pode ajudá-lo a manter a Caneta firme contra sua pele.

**Escutei mais de 2 cliques durante minha injeção—2 cliques altos e 1 clique baixo. Recebi minha injeção completa?**

Algumas pessoas podem ouvir um clique baixo imediatamente antes do segundo clique alto. Esse é o funcionamento normal da Caneta. **Não** retire a Caneta da sua pele até escutar o segundo clique alto.

**Não sei se minha Caneta funcionou corretamente.**



Verifique se você recebeu sua dose. Sua dose foi administrada corretamente se o êmbolo cinza estiver visível. Consulte também o **Passo 3** das instruções.

Caso não veja o êmbolo cinza, entre em contato com o Lilly SAC 0800 701 0444 para mais instruções. Até lá, armazene sua Caneta de modo seguro para evitar acidentes com a agulha.

**O que devo fazer se houver uma gota de líquido ou sangue na minha pele após minha injeção?**

Isso é normal. Pressione uma bola de algodão ou gaze sobre o local da injeção. **Não** esfregue o local da injeção.

#### **Outras informações**

- Caso tenha problemas de visão, **não** use sua Caneta sem a ajuda de uma pessoa treinada para usar a Caneta aplicadora MOUNJARO.

#### **Onde obter mais informações**

- Em caso de dúvidas ou problemas com sua Caneta aplicadora MOUNJARO, entre em contato com a Lilly pelo Lilly SAC 0800 701 0444 ou ligue para o seu médico.
- Para mais informações sobre a Caneta aplicadora MOUNJARO, visite nosso website [www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br).

#### **DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.1260.0202

#### **Produzido por:**

Eli Lilly and Company – Indianápolis – EUA  
ou

Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co. KG – Ravensburg – Alemanha

#### **Importado e Registrado por:**

Eli Lilly do Brasil Ltda.  
Av. Morumbi, 8264 - São Paulo, SP  
CNPJ 43.940.618/0001-44

MOUNJARO é uma marca registrada da Eli Lilly and Company.

Copyright© 2024, Eli Lilly and Company. Todos os direitos reservados.

A Caneta aplicadora MOUNJARO cumpre os requerimentos vigentes de exatidão de dose e funcionais da ISO 11608-1 e 11608-5.

Lilly SAC 0800 701 0444

sac\_brasil@lilly.com

www.lilly.com.br

**Este documento foi aprovado pela Anvisa em 24/09/2024.**