

## INSTRUÇÕES DE USO

**MOUNJARO®**  
tirzepatida

**Frasco-ampola de uso único de 2,5 mg/0,5 mL**

**Frasco-ampola de uso único de 5 mg/0,5 mL**

**Frasco-ampola de uso único de 7,5 mg/0,5 mL**

**Frasco-ampola de uso único de 10 mg/0,5 mL**

**Frasco-ampola de uso único de 12,5 mg/0,5 mL**

**Frasco-ampola de uso único de 15 mg/0,5 mL**

**Uso semanal**



### **Informações importantes que você precisa saber antes de administrar MOUNJARO**

**Leia estas INSTRUÇÕES DE USO e a bula antes de usar MOUNJARO, solução injetável em frasco-ampola (frasco) de uso único, e toda vez que adquirir um novo frasco.** Pode haver informações novas. Estas informações não substituem a conversa com seu profissional de saúde sobre sua condição médica ou seu tratamento.

**Não compartilhe suas agulhas ou seringas com outras pessoas. Você pode transmitir uma infecção grave a outras pessoas ou contrair delas uma infecção grave.**


Converse com seu profissional de saúde sobre como administrar MOUNJARO da maneira correta.

- MOUNJARO é um frasco-ampola de uso único.
- MOUNJARO é usado uma vez por semana.
- Aplique apenas sob a pele (por via subcutânea).
- Você ou outra pessoa podem aplicar na sua barriga (abdome), coxas ou na parte detrás do seu braço.
- Você pode precisar de ajuda de outra pessoa se quiser injetar na parte detrás do seu braço.


### **Reúna os materiais necessários para aplicar sua injeção**

- 1 frasco-ampola de uso-único de MOUNJARO
- 1 seringa e 1 agulha (conforme recomendada pelo seu profissional de saúde)
- 1 lenço umedecido com álcool
- gaze
- 1 recipiente para objetos perfurocortantes para descartar agulhas e seringas usadas. Consulte **“Descarte das suas agulhas e seringas usadas”** no final destas instruções.

## Frasco-ampola



## Seringa



A agulha e a seringa recomendadas pelo seu profissional de saúde podem aparentar diferente da agulha e da seringa destas INSTRUÇÕES DE USO.

### Preparando para administrar MOUNJARO




**Retire o frasco** da geladeira.








Lave suas mãos com água e sabão.



**Verifique o rótulo do frasco de MOUNJARO** para garantir que você está com o medicamento e a dose correta e que este não expirou.

Verifique o líquido no frasco. MOUNJARO deve parecer incolor a levemente amarelo. **Não use** se estiver congelado, turvo, com partículas ou com a cor errada.

**Sempre use uma seringa e agulha estéril nova para cada aplicação para prevenir infecções e o entupimento das agulhas.**


<p><b>Passo 1:</b></p> <p>Retire a tampa protetora de plástico do frasco, mas <b>não</b> remova a rolha de borracha.</p>	
<p><b>Passo 2:</b></p> <p>Limpe a rolha de borracha com um lenço umedecido com álcool.</p>	
<p><b>Passo 3:</b></p> <p>Remova a embalagem externa da seringa.</p>	





<p><b>Passo 4:</b></p> <p>Remova a embalagem externa da agulha. A seringa recomendada pelo seu profissional de saúde pode ter uma agulha pré-acoplada. Em caso afirmativo, vá para o passo 6.</p>	
<p><b>Passo 5:</b></p> <p>Coloque a agulha no topo da seringa e gire até que esteja apertada e firmemente presa.</p>	
<p><b>Passo 6:</b></p> <p>Remova a tampa da agulha puxando-a para fora.</p>	
<p><b>Passo 7:</b></p> <p>Segure a seringa com a agulha apontando para cima. Puxe o êmbolo para baixo para aspirar uma pequena quantidade de ar para dentro da seringa.</p>	
<p><b>Passo 8:</b></p> <p>Insira a agulha através da rolha de borracha do frasco.</p>	
<p><b>Passo 9:</b></p> <p>Pressione o êmbolo totalmente para dentro. Isso injeta ar no frasco, facilitando a retirada da solução do frasco.</p>	
<p><b>Passo 10:</b></p> <p>Vire o frasco de MOUNJARO e a seringa ao contrário. Ao confirmar que a ponta da agulha está dentro do medicamento MOUNJARO, puxe lentamente o êmbolo para baixo para retirar toda a solução de MOUNJARO do frasco. O frasco é preenchido para permitir a administração de uma dose única de 0,5 mL de MOUNJARO. <b>Não fracionar (dividir) a dose.</b></p>	

<p><b>Passo 11:</b></p> <p>Se houver bolhas de ar, bata levemente na seringa algumas vezes para permitir que as bolhas de ar subam para o topo.</p> <p>Pressione lentamente o êmbolo para cima até que uma gota de MOUNJARO apareça na ponta da agulha. Esta gota indica que a sua injeção está pronta para uso.</p>	
<p><b>Passo 12:</b></p> <p>Puxe a seringa para fora da rolha de borracha do frasco.</p>	

## Aplicando MOUNJARO

- Aplique exatamente como seu profissional de saúde lhe mostrou.
- Mude (alterne) o seu local de injeção dentro da área escolhida para cada dose para ajudar a prevenir depressões na pele ou espessamento da pele (lipodistrofia)() e caroços na pele (amiloidose localizada cutânea) nos locais de injeção..
- **Não** aplique onde a pele apresentar depressões, espessamento ou caroços.
- **Não** aplique onde a pele estiver sensível, roxa, escamosa ou dura, ou com cicatrizes ou machucada.
- **Não** misture MOUNJARO com qualquer outro medicamento.
- **Não** aplique MOUNJARO no mesmo local de injeção usado para outros medicamentos.

<p><b>Passo 13:</b></p> <p>Escolha o seu local de injeção.</p> <p>Você ou outra pessoa podem aplicar MOUNJARO sob a pele (por via subcutânea) na área da sua barriga (abdome), coxas ou na parte detrás do seu braço.</p> <p>Você pode precisar de ajuda de outra pessoa se quiser injetar na parte detrás do seu braço.</p> <p>Antes de aplicar sua injeção, prepare o local de injeção conforme orientação do seu profissional de saúde e limpe sua pele.</p>	
---	---

<p><b>Passo 14:</b></p> <p>Aperte suavemente e segure uma dobra de pele onde você aplicará sua injeção entre o polegar e o indicador.</p> <p>A dobra da pele levantada não deve ser espremida com tanta força que cause dor ou branqueamento da pele (quando a pele fica branca ou pálida quando pressionada).</p>	
<p><b>Passo 15:</b></p> <p>Insira a agulha na sua pele.</p>	
<p><b>Passo 16:</b></p> <p>Pressione o êmbolo para baixo para injetar toda a solução da seringa para receber uma dose completa. A ponta do êmbolo deve estar no fundo da seringa.</p> <p>Após a sua injeção, a agulha deve permanecer sob a pele por pelo menos 5 segundos para garantir que você injetou todo o seu medicamento.</p>	
<p><b>Passo 17:</b></p> <p>Retire a agulha da sua pele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se você vir sangue depois de retirar a agulha da sua pele, pressione o local da injeção com um pedaço de gaze ou lenço umedecido com álcool suavemente. <b>Não</b> esfregue a área.</li> <li>• <b>Não</b> recolocar a tampa da agulha. Recolocar a tampa na agulha pode levar a um ferimento por picada de agulha.</li> </ul>	

### Descarte das suas agulhas e seringas usadas

- Deposite a sua seringa e agulha usadas em um recipiente para descarte de objetos perfurocortantes imediatamente após o uso. **Não** jogue fora (descarte) agulhas e seringas soltas no lixo doméstico.
- Se você não tiver um recipiente para descarte de objetos perfurocortantes, coloque as agulhas usadas em um recipiente de plástico resistente com tampa segura. Pergunte ao seu profissional de saúde sobre as opções de descarte adequado de agulhas, seringas e recipientes para objetos cortantes usados.
- **Não** recicle seu recipiente para descarte de objetos perfurocortantes usado.

### Armazenamento e manuseio

- Armazene todos os frascos fechados em geladeira de 2°C a 8°C.
- Você pode armazenar o frasco fechado em temperatura ambiente abaixo de 30°C por até 21 dias.
- **Não** congelar. **Não** usar MOUNJARO se tiver sido congelado.

- Conservar o frasco na embalagem original para proteger da luz.
- Jogue fora todos os frascos abertos após o uso, mesmo que haja qualquer sobra de medicamento no frasco.
- **Não** armazenar o frasco após aberto.

### **Outras informações**

- Se você tiver problemas de visão, **não** use o frasco sem a ajuda de uma pessoa treinada para usar o frasco de MOUNJARO.

**Mantenha os frascos de MOUNJARO, seringas, agulhas e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.**

### **Onde aprender mais**

Se você tiver alguma dúvida ou problema com o seu frasco de MOUNJARO, entre em contato com a Lilly pelo telefone 0800 701 0444 ou com o seu profissional de saúde para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre o frasco MOUNJARO, visite nosso site em [www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br).

### **DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.1260.0202

### **Produzido por:**

BSP Pharmaceuticals S.p.A. – Latina Scalo – Itália

### **Importado e Registrado por:**

Eli Lilly do Brasil Ltda.

Av. Morumbi, 8264 – São Paulo, SP

CNPJ 43.940.618/0001-44

MOUNJARO é uma marca registrada da Eli Lilly and Company.

Copyright © 2026, Eli Lilly and Company. Todos os direitos reservados.

Lilly SAC 0800 701 0444

[sac\\_brasil@lilly.com](mailto:sac_brasil@lilly.com)

[www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br)

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO - COM RETENÇÃO DA RECEITA.**

**Este documento foi aprovado pela Anvisa em 13/02/2026.**

