

Анкилостома


Анкилостомы – распространенные паразиты, обитающие в тонком кишечнике собак и кошек.

- Личинки анкилостомы могут проникать в кожу человека.
- Дети часто заражаются анкилостомой, когда ходят босиком по зараженной почве или берут в рот грязные зараженные предметы.
- У человека они вызывают поражения кожи в местах проникновения, кишечное кровотечение, анемию, боли в брюшной полости и диарею.
- Наиболее часто анкилостома вызывает у молодых животных, а иногда и у взрослых, анемию, если в организме находится большое количество паразитов. Другими симптомами заражения может быть расстройство кишечника, бледные десны, диарея с кровью, потеря веса и, в некоторых случаях, задержка в росте, переваренная кровь в стуле и плохое состояние шерсти.

Как передаются анкилостомы?

Собака или кошка могут заразиться, проглотив личинку с зараженной почвы, или от личинки, самостоятельно прошедшей через кожный покров животного. Щенки могут заразиться сразу после рождения через молоко матери. В отличие от щенков, котята не могут заразиться через молоко матери.

Понимание жизненного цикла анкилостом у собак и кошек – ключ к избавлению



Взрослые паразиты живут в тонком кишечнике кошек и собак, где они откладывают яйца, которые распространяются в окружающей среде с фекалиями животного. Через несколько недель личинка выводится из яйца, готовая заражать животное. После заражения личинка мигрирует в кишечник, превращаясь там во взрослую особь, способную откладывать яйца. Некоторые личинки не достигают кишечника, но остаются в других органах в инкапсулированном виде. Впоследствии, такие стимулы как беременность могут активировать личинку, она вернется в кишечник и превратится во взрослую особь.

Болезни

Личинки, попадающие в организм через кожу, вызывают сильный зуд и раздражение. Миграция через респираторную систему может привести к раздражению дыхательных путей и кашлю.

Взрослые гельминты атакуют стенки кишечника крючковидными зубами и питаются кровью и тканями, вызывая недомогание, диарею с кровью и анемию. Ситуация ухудшается тем, что эти гельминты имеют сильную склонность к миграции на внутреннюю поверхность кишечника, оставляя кровавые раны, которые представляют особую опасность для щенков и котят. Присутствие 500 гельминтов у 2кг щенка может вызвать у него потерю половины всего объема крови за день, что приведет к смерти.

Лечение инфестации

Так как **щенки** заражаются при рождении и продолжают постоянно заражаться через молоко матери и окружающую среду, очень важно начать защиту от гельминтов немедленно. Рекомендуется проводить дегельминтизацию щенков на 2, 4, 8 и 12 неделе жизни, а потом предпочтительно на месячной основе или минимум раз в 3 месяца до конца жизни.

Нужно проводить лечение лактирующих сук в это же время. Это позволит оградить щенков от повторного заражения и избежать появления яиц гельминтов в фекалиях, а, следовательно - заражения окружающей среды.

Так как **кошки** заражаются анкилостомами из окружающей среды, нужно начинать лечение в максимально короткий срок и продолжать постоянно. Главная цель дегельминтизации в данном случае - сократить количество откладываемых яиц, до того как котенку исполнится 6 месяцев.

Первые 6 месяцев жизни котенка рекомендуется проводить дегельминтизацию один раз в 2 недели – месяц, после 2 - 4 раза в год до конца жизни животного. Так как кормящие кошки могут распространять паразитов, их нужно дегельминтизировать одновременно с пометом. Несмотря на все рекомендации, заражение Анкилостомами до сих пор широко распространено. Нужен постоянный контроль, так как Анкилостома может вызвать зооноз у человека.

Большое количество продуктов доступно для лечения и контроля над наиболее распространенными и опасными гельминтами и предлагает полную защиту питомца. Убедитесь в том, что выбранный вами продукт является наиболее подходящим для вашего животного, особенно если речь идет о простоте использовании эффективности и безопасности (особенно при лечении совсем юных особей).