

Для облегчения болевого синдрома при тонзиллофарингите и вирусных фарингитах **оправдано применение местных препаратов в качестве симптоматического лечения**<sup>1</sup>

## Дифференциальная диагностика боли в горле<sup>2</sup>

Характеристика боли в горле	Сопровождающие симптомы	Диагностика	Диагноз
Боль в горле сильная, невозможно глотать пищу (при фарингоскопии гнойные налеты на миндалинах)	Повышение температуры тела до 38 °С и выше, увеличиваются лимфоузлы на шее, кашель и насморк отсутствуют	Стрептотест, культуральный посев, общий анализ мочи	<b>Тонзиллофарингит</b>
Симптомы те же, но не помогают антибиотики	Увеличение печени и селезенки, полиаденит (шейные, паховые, подмышечные лимфоузлы)	Общий анализ крови – моноцитары, IgM к вирусу Эпштейна-Барр	<b>Инфекционный мононуклеоз</b>
Боль в горле сильная, но прием пищи не затруднен	Есть кашель и насморк, повышается температура тела до 38 °С, заболевание начинается с насморка и кашля, а позже присоединяется боль в горле	Стрептотест	<b>ОРВИ</b>
Боль в горле очень сильная, невозможно проглотить воду и слюну (при фарингоскопии асимметрия мягкого неба, гнойные налеты на небных миндалинах)	Тризм жевательной мускулатуры, изменяется голос, повышается температура тела до 38 °С и выше, увеличиваются лимфоузлы на шее	Стрептотест, общий анализ крови, культуральный посев, общий анализ мочи	<b>Паратонзиллярный абсцесс</b>
Боль в горле не очень интенсивная, больше першение	Иногда кашель	Стрептотест, анкета ИСР	<b>Хронический фарингит, возможно, ларингофарингеальный рефлюкс</b>
Боль в горле очень сильная, сложно проглотить слюну, но прием пищи не затруднен. Боль усиливается ночью	Может быть кашель и насморк, но начинается заболевание с першения в горле	Стрептотест, анкета ИСР	<b>Обострение ларингофарингеального рефлюкса, возможно обострение гастрита или гастроудоденита</b>
Дискомфорт в горле, пациент все время ощущает свое горло. При фарингоскопии казеозные пробки в лакунах небных миндалин	Кашель, может повышаться температура тела до 37-37,2 °С, слабость, потливость, боли в коленных и локтевых суставах	Стрептотест, культуральный посев, антистрептолизин О, ревматоидный фактор, С-реактивный белок	<b>Хронический тонзиллит, токсическая форма</b>

[Больше полезной информации — на Academy Plus >](#)

RU-NXR-2300055

ИСР — индекс симптомов рефлюкса.

1. Полякова А. С., Таточенко В. К. Еще раз о термине «Вирусно-бактериальная инфекция» // Научный здоровья детей. — М.: Медицинский совет, 2015. — № 14.

2. Анготова И. Б. Дифференциальная диагностика болей в горле // Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Медицинский совет № 15, 2014 г.

Гексорал® Табс — ЛСР-002626/07 от 14.03.2008 г. Гексорал® аэрозоль — П N01410/01 от 10.08.2010 г. МНН: гексэтидин. Показания: в качестве симптоматического средства. Симптоматическое лечение при воспалительно-инфекционных заболеваниях полости рта и гортани, профилактика инфекционных осложнений до и послеоперативных вмешательств на полости рта и гортани и при травмах, гигиена полости рта. Противопоказания: повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; эрозивно-десквамозные поражения слизистой оболочки полости рта; детский возраст до 3 лет. Побочные действия: могут проявляться со стороны желудочно-кишечного тракта, иммунной и нервной систем, органов грудной клетки и средостения, а также общие расстройства и нарушения в месте введения. Подробную информацию смотрите в инструкции. ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17, стр.2, тел. 8 (495) 726-55-55. Сентябрь 2021 г. www.hexoral.ru

RU-NXR-2100057

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ. НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕРОПРИЯТИЯ.