

Алгоритм диагностики СРК¹

Оценка характера жалоб и наличия симптомов тревоги

Есть ли симптомы тревоги?

Соответствие боли Римским критериям IV

Лабораторные исследования (по показаниям): клинический анализ крови; СОЭ; С-реактивный белок; анализ кала на скрытую кровь; анализ кала на фекальный кальпротектин; анализ кала на кишечные инфекции; исследование кала на токсины А и В клостридии; определение антител к тканевой трансглутаминазе.

Инструментальные исследования (по показаниям): водородный дыхательный тест с глюкозой или лактулозой — для выявления синдрома избыточного бактериального роста; ЭГДС с биопсией; колоноскопия с биопсией; УЗИ ОБП.

Дополнительные исследования с целью исключения органического заболевания

да

нет

Есть отклонения в результатах обследования?

- Установление диагноза СРК
- Проверка наличия симптомов тревоги на каждом визите

ОБП — органы брюшной полости,
СРК — синдром раздраженного кишечника,
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия.

1. Адаптировано из документа: Клинические рекомендации МЗ РФ «Синдром раздраженного кишечника» [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/190_2 свободный

RU-IM-2400071