

Алгоритм диагностики диареи¹

Лабораторное исследование кала

Анализ кала на яйца глистов, простейших

Есть

Нет

Лечить

Лейкоциты/фекальный кальпротектин

Повышены

Не повышены

- Инфекционные болезни, вызываемые шигеллами, сальмонеллами, кампилобактериями, *Clostridium difficile* и др., — см. посевы кала
- ЯК, БК, микроскопический колит, дивертикулит — выполнить колоноскопию, рентгеноскопию и эндоскопию тонкой кишки

- Общая переменная гипогаммаглобулинемия — см. иммуноглобулины А, М, G
- Гиполактазия — см. лактазу в биоптате тонкой кишки
- Целиакия и другие болезни нарушенного всасывания — выполнить биопсию СOTК

Кровь

Есть

Нет

- Инфекционные болезни, вызываемые шигеллами, сальмонеллами, кампилобактериями и др., — см. посевы кала
- ЯК, БК, микроскопический колит, дивертикулит — выполнить колоноскопию, рентгеноскопию, эндоскопию тонкой кишки

БК — болезнь Крона,
НЭО — нейроэндокринная опухоль,
СРК — синдром раздраженного кишечника,
ЯК — язвенный колит.

1. Адаптировано из статьи: Парфенов А. И. Четыре варианта патогенеза и терапии диареи // Терапевтический архив. 2015. № 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chetyre-varianta-patogeneza-i-terapii-diarei>

RU-IM-2400071