

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

ДОКТОР МОМ® ФИТО

Регистрационный номер: П N016277/01

Торговое наименование: ДОКТОР МОМ® ФИТО

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

Состав на 20 г мази

Активные вещества:

Камфора.....1,05 г

Левоментол.....0,61 г

Ореха мускатного масло.....0,11 мл

Скипидарное масло.....1,11 мл

Тимол.....0,02 г

Эвкалиптовое масло..... 0,30 мл

Вспомогательное вещество:

Белый мягкий парафин.....ск. треб. до 20,0 г

Описание

Полупрозрачная мазь белого или почти белого цвета с запахом левоментола и камфоры.

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство природного происхождения

Код АТХ: R05X

Фармакологические свойства

Оказывает местнораздражающее, отвлекающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению

Симптоматическая терапия острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком, чувством заложенности носа, а также при мышечных болях, болях в спине, головных болях.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повреждения кожных покровов или раздражение, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого применения препарата, включая ожоги, экзему, дерматиты и гнойные заболевания кожи;
- бронхиальная астма;
- детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Способ применения

Только для наружного применения!

- при насморке или заложенности носа нанесите мазь на кожу крыльев носа (рис. 1);
- при болях в мышцах, спине нанесите мазь на болезненную область. Для достижения лучшего результата прикройте болезненную область теплой повязкой (рис. 2);
- при головной боли нанесите мазь на кожу височной области (рис. 3).



Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3

Побочное действие

Аллергические реакции.

Нежелательные реакции, выявленные при пострегистрационном применении лекарственного препарата, были классифицированы следующим образом:

Очень частые $\geq 1/10$

Частые $\geq 1/100$ и $< 1/10$

Не частые $\geq 1/1000$ и $< 1/100$

Редкие $\geq 1/10000$ и $< 1/1000$

Очень редкие $< 1/10000$

Отдельные сообщения неуточненной частоты (частота возникновения не может быть оценена на основании имеющихся данных).

Системные реакции. *Очень редко:* гиперчувствительность (аллергические реакции), анафилактический шок.

Со стороны дыхательной системы. *Очень редко:* бронхоспазм.

Местные реакции. *Очень редко:* аллергический дерматит.

Передозировка

Случаев передозировки при применении препарата в рекомендуемых дозах не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сведений о взаимодействии с другими лекарственными средствами нет.

Особые указания

Если симптомы заболевания сохраняются или наблюдается ухудшение состояния, или возникают новые симптомы, необходимо прекратить использование препарата и обратиться к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте. В случае проглатывания препарата ребенком следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки носа и полости рта, а также на поврежденные участки кожи.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности – не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 20 г в банку из полипропилена, укупоренную алюминиевой фольгой, ламинированной полиэтиленом с навинчиваемой крышкой.

Одна банка вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.), Индия/ Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India

Фактический адрес производственной площадки: Участок № 304-308, Г.И.Д.К. Индастриал Эриа, Город: Паноли - 394 116, Округ: Бхаруч, Индия/ Plot No. 304-308, G.I.D.C. Industrial Area, City: Panoli - 394 116, Dist: Bharuch, India

Организация, принимающая претензии:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. (495) 726-55-55.