

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### *antimicotico same 1% crema*

clotrimazolo

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3-4 settimane.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Antimicotico Same e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Antimicotico Same
3. Come usare Antimicotico Same
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Antimicotico Same
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Antimicotico Same e a cosa serve**

Antimicotico Same è una crema da applicare sulla pelle che contiene il principio attivo clotrimazolo, antimicotico (antifungino) attivo contro funghi e batteri. Antimicotico Same è indicato:

- in tutte le infezioni della pelle causate da funghi e lieviti: queste possono essere localizzate tra le dita (piede d'atleta-tinea pedis), in zone prive di peli (tinea corporis), nella zona inguinale (tinea inguinale-eczema marginato di Hebra), o possono presentare macchie irregolari ( pityriasis versicolor);
- nelle infezioni della pelle quali le piodermiti primitive e l'eritrasma (macchie squamose di colore rosa-marrone sulla pelle);
- a scopo preventivo e curativo di infezioni sovrapposte della pelle dovute a lieviti (saccaromiceti) e batteri Gram-positivi.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3-4 settimane.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Antimicotico Same**

##### **Non usi Antimicotico Same**

- se è allergico al clotrimazolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Antimicotico Same.

- L'uso, specie se prolungato, dei prodotti da applicare sulla pelle può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (allergia a uno o più componenti). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico (veda paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati").

- Usi Antimicotico Same sotto il diretto controllo del medico nel caso in cui abbia un'infezione molto estesa.
- Consulti il medico se ha già sofferto in passato di questi disturbi (recidive di micosi) e se dopo 3-4 settimane di utilizzo continuativo non osserva risultati apprezzabili.
- Eviti il contatto del medicinale con gli occhi.

### **Bambini**

Nella primissima infanzia il prodotto va somministrato sotto il diretto controllo del medico. Nelle dermatiti da pannolino non è consigliato l'uso di pannolini non traspiranti (ad effetto "occlusivo") dopo l'applicazione della crema.

### **Altri medicinali e Antimicotico Same**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali comunemente utilizzati insieme ad Antimicotico Same.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è in gravidanza utilizzi questo medicinale in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Antimicotico Same non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Antimicotico Same contiene alcool cetilstearilico e alcool benzilico**

Alcool cetilstearilico può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Questo medicinale contiene 10 mg di alcool benzilico per grammo. Alcool benzilico può causare reazioni allergiche e lieve irritazione locale.

### **3. Come usare Antimicotico Same**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi Antimicotico Same 2 o 3 volte al giorno, frizionando leggermente fino ad assorbimento della crema.

Non utilizzi grandi quantità di prodotto per ogni applicazione perché non è necessario.

Nel trattamento di infezioni come l'eritrasma e la pityriasis versicolor prosegua la terapia per almeno 3 settimane, mentre nel trattamento di tutte le altre infezioni fungine (micosi) prosegua la cura per almeno 4 settimane, anche se si verifica la scomparsa dei sintomi infiammatori.

Per evitare recidive, comuni nelle micosi, segua le seguenti norme igieniche:

- cambi frequentemente la biancheria intima, gli asciugamani e li disinfecti con prodotti chimici o con alta temperatura;
- eviti di scambiare con altre persone i vestiti e la biancheria;
- tratti contemporaneamente con una terapia di tavolette vaginali la partner, ecc.

Non ingerisca questo medicinale. In caso di ingestione/assunzione accidentale di Antimicotico Same avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

L'applicazione sulla pelle di Antimicotico Same non dà luogo ad assorbimento per cui l'ipotesi di effetti a carico dell'organismo è altamente improbabile.

Durante l'impiego di Antimicotico Same si possono manifestare raramente reazioni di intolleranza locale quali: irritazioni, sensazione di bruciore e prurito, dermatite allergica da contatto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse](http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### 5. Come conservare Antimicotico Same

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

##### Cosa contiene Antimicotico Same

- Il principio attivo è clotrimazolo. 100 g di crema contengono 1 g di clotrimazolo.
- Gli altri componenti sono: sorbitan monostearato, polisorbato 60, cetil palmitato, alcool cetilstearilico, 2-ottildodecanolo, alcool benzilico, acqua depurata.

##### Descrizione dell'aspetto di Antimicotico Same e contenuto della confezione

Antimicotico Same è una crema contenuta in un tubo da 30 grammi.

##### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

##### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Savoma Medicinali S.p.A. - Via Baganza, 2/A - 43125 Parma

##### Produttore

Doppel Farmaceutici S.r.l. – Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

##### Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Gennaio 2022



Laboratori Farmaceutici Savoma Medicinali S.p.A. - Parma