

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

LACTEOL 10 miliardi polvere orale e 5 miliardi capsule rigide
LACTOBACILLUS LB. (*Lactobacillus fermentum* e *Lactobacillus delbrueckii*)

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui gli effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è LACTEOL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere LACTEOL
3. Come prendere LACTEOL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare LACTEOL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è LACTEOL e a cosa serve

LACTEOL contiene come principio attivo il *Lactobacillus* LB che appartiene al gruppo dei batteri lattici (produttori di acido lattico) che sono normalmente presenti nell'intestino. Questi batteri favoriscono le ottimali condizioni della mucosa dell'intestino e impediscono lo sviluppo di altri batteri che possono causare diarrea.

LACTEOL è indicato per il trattamento della diarrea in caso di alterazioni della flora batterica dell'intestino nel bambino e nell'adulto.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere LACTEOL

Non prenda LACTEOL

- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere LACTEOL.

Si rivolga al Suo medico o farmacista se la diarrea persiste oltre 2 o 3 giorni dall'inizio della terapia.

Bambini

Il prodotto deve essere usato unitamente a terapia reidratante, in particolare nei bambini di età inferiore ai due anni.

Questa terapia può essere necessaria anche nei bambini al di sopra dei 2 anni.

Il medico stabilirà se i liquidi dovranno essere somministrati per bocca (via orale) o direttamente in vena (via endovenosa) a seconda della gravità della diarrea, dell'età e delle condizioni di salute del paziente.

Nel caso di sintomi nei lattanti, è necessario consultare il medico prima di iniziare il trattamento.

Altri medicinali e LACTEOL

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali.

LACTEOL con cibi e bevande

Non sono state segnalate interazioni di LACTEOL con alimenti.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

I dati relativi all'uso di LACTEOL in donne in gravidanza non sono sufficienti.

A scopo precauzionale, è preferibile evitare l'uso di LACTEOL durante la gravidanza

Allattamento

Esistono informazioni insufficienti sull'escrezione di LACTEOL e suoi metaboliti nel latte materno.

A scopo precauzionale, è preferibile evitare l'uso di LACTEOL durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

LACTEOL non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

LACTEOL capsule rigide contiene lattosio

Questo medicinale contiene lattosio, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

LACTEOL bustine contiene lattosio e saccarosio

Questo medicinale contiene lattosio e saccarosio, due tipi di zuccheri. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere LACTEOL

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Dose, modo e frequenza di somministrazione

• Lacteol capsule rigide

Ingerisca una capsula bevendo dell'acqua.

La dose raccomandata è di 2-4 capsule al giorno.

Nei casi più gravi (diarree acute):

- il primo giorno: la dose è di 2 capsule, 3 volte al giorno;

- dal secondo giorno fino a 2 giorni dopo la scomparsa dei sintomi: la dose è di 2 capsule, 2 volte al giorno.

• Lacteol bustine

Sciolga stemperando il contenuto di una bustina in mezzo bicchiere d'acqua.

La dose raccomandata è di 1-2 bustine al giorno.

Nei casi più gravi (diarrea acuta):

- il primo giorno: la dose è di 1 bustina, 3 volte al giorno;

- dal secondo giorno fino a 2 giorni dopo la scomparsa dei sintomi: la dose è di 1 bustina, 2 volte al giorno.

Non superi le dosi indicate senza consiglio del medico. Usi solo per brevi periodi di trattamento.

Uso nei bambini

Il contenuto della capsula o della bustina può essere sciolto nel biberon con acqua o latte.

Se prende più LACTEOL di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di assunzione/ingestione accidentale di una dose eccessiva di LACTEOL avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere LACTEOL

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con LACTEOL

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati con l'uso di questo medicinale.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare LACTEOL

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Lacteol capsule: conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Lacteol bustine: nessuna speciale precauzione per la conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene LACTEOL 5 miliardi capsule rigide

- Il principio attivo è polvere di *Lactobacillus LB (Lactobacillus fermentum e Lactobacillus delbrueckii)*. Ogni capsula rigida contiene 170 mg di polvere di *Lactobacillus LB* (corpi microbici inattivati e liofilizzati) in mezzo di cultura fermentato, corrispondenti a 5 miliardi di *Lactobacillus LB*.

- Gli altri componenti sono: mezzo di coltura neutralizzato e liofilizzato, lattosio monoidrato, calcio carbonato, acido silicico, talco, magnesio stearato, lattosio anidro, gelatina.

Cosa contiene LACTEOL 10 miliardi polvere orale

- Il principio attivo è polvere di *Lactobacillus LB (Lactobacillus fermentum e Lactobacillus delbrueckii)*. Ogni bustina contiene 340 mg di polvere di *Lactobacillus LB* (corpi microbici inattivati e liofilizzati) in mezzo di cultura fermentato corrispondenti a 10 miliardi di *Lactobacillus LB*.

- Gli altri componenti sono: mezzo di coltura neutralizzato e liofilizzato, lattosio monoidrato,

calcio carbonato, acido silicico, aroma banana-arancia, saccarosio.

Descrizione dell'aspetto di LACTEOL e contenuto della confezione

LACTEOL 5 miliardi capsule rigide

Confezione contenente 20 capsule rigide per uso orale.

LACTEOL 10 miliardi polvere orale

Confezione contenente 10 bustine per uso orale.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

BRUSCHETTINI s.r.l. - Via Isonzo, 6, 16147 - Genova (Italia)

Produttore

ADARE PHARMACEUTICAL S.A.S –Route De Bû, 78550 - Houdan (Francia)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 08 marzo 2023