

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

FARINGOTRICINA 2,5 mg compresse orodispersibili

tirotricina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è FARINGOTRICINA e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FARINGOTRICINA
3. Come usare FARINGOTRICINA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FARINGOTRICINA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è FARINGOTRICINA e a che cosa serve

FARINGOTRICINA contiene la tirotricina, un antibiotico in grado di bloccare la crescita dei batteri. Questo medicinale è usato nel trattamento topico (locale) delle infezioni batteriche della mucosa che riveste la bocca (mucosa orale). Queste infezioni, chiamate stomatiti di origine batterica, possono colpire le gengive, la lingua e le labbra.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare FARINGOTRICINA

Non usi FARINGOTRICINA

- se è allergico alla tirotricina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FARINGOTRICINA.

L'uso, specie se prolungato, di questo medicinale può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell'organismo a sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico, che le consiglierà una terapia adeguata.

Interrompa il trattamento e consulti il medico anche se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni perché l'infezione potrebbe essere causata da batteri contro i quali la tirotricina non è efficace.

Bambini

Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale nei bambini nella primissima infanzia. In questa fascia di età questo medicinale deve essere somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto il controllo del medico.

Altri medicinali e FARINGOTRICINA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è in gravidanza o sta allattando, usi questo medicinale solo dopo aver consultato il medico e sotto il suo controllo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

FARINGOTRICINA contiene glucosio, lattosio e saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come usare FARINGOTRICINA

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 compressa ogni mezzora – 1 ora, da lasciar sciogliere lentamente in bocca.

La dose massima è di 10 compresse al giorno. Non superare la dose massima.

Durata del trattamento

Il trattamento deve continuare per due o più giorni, ma comunque per brevi periodi.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati si sono manifestati raramente:

- annerimento della lingua;
- infiammazione della lingua (glossite);
- reazioni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell'organismo a questo medicinale).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FARINGOTRICINA

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo “Scadenza”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FARINGOTRICINA

- Il principio attivo è tirotricina. Ogni compressa orodispersibile contiene 2,5 mg di tirotricina.
- Gli altri componenti sono mentolo, amido di mais, gomma arabica, glucosio, lattosio, magnesio stearato, saccarosio.

Descrizione dell’aspetto di FARINGOTRICINA e contenuto della confezione

FARINGOTRICINA 2,5 mg compresse orodispersibili si presenta in una scatola da 20 compresse orodispersibili in blister.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 9 gennaio 2015