

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

**ABIMONO 600 mg ovulo vaginale  
ABIMONO 1 % crema vaginale**

Isoconazolo nitrato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è ABIMONO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ABIMONO
3. Come usare ABIMONO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ABIMONO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è ABIMONO e a cosa serve**

ABIMONO contiene isoconazolo nitrato, un antimicrobico per uso ginecologico.

ABIMONO è indicato nelle **donne adulte** nel trattamento locale di infezioni causate da funghi quali le infezioni vulvo-vaginali, anche se associate ad infezioni causate da batteri. Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

**2. Cosa deve sapere prima di usare ABIMONO**

**Non usi ABIMONO**

- se è allergica ad isoconazolo nitrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è allergico ad altri medicinali usati per trattare le infezioni causate da funghi.

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare ABIMONO.

ABIMONO è solo per **uso locale vaginale. Non ingerisca.**

Quando usa Abimono è importante sapere:

eviti il contatto con gli occhi.

Si lavi accuratamente le mani dopo l'uso del medicinale.

- Durante il trattamento di micosi vaginali e nei giorni immediatamente seguenti, per evitare una reinfezione, cambi quotidianamente e strilizzi, mediante bollitura gli asciugamani e la biancheria (preferibilmente di cotone).
- Per lo stesso motivo, consulti il medico sull'opportunità di un contemporaneo trattamento locale del partner.
- L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a reazioni allergiche (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati"). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico che istituirà la terapia idonea.

Durante l'uso di questo medicinale possono svilupparsi funghi e/o batteri contro i quali questo medicinale non è in grado di agire. Pertanto si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo il periodo di trattamento prescritto dal medico.

### **Altri medicinali e ABIMONO**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note finora interazioni di Abimono con altri medicinali. Tuttavia è consigliabile avvisare il medico se sta prendendo:

- Medicinali per fluidificare il sangue (anticoagulanti) come il warfarin.

Sono possibili reazioni di sensibilità crociata tra isoconazolo, miconazolo, econazolo e tioconazolo.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

### **Gravidanza**

Se è in corso una gravidanza l'applicatore per la somministrazione di ABIMONO deve essere utilizzato con cautela (vedere paragrafo 3 "Come usare ABIMONO").

### **Allattamento**

Non è noto se il principio attivo di Abimono passi nel latte materno. Il rischio nel lattante non può essere escluso.

### **Fertilità**

Non vi sono dei dati che dimostrino che la fertilità sia compromessa dallo'uso di Abimono

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

ABIMONO non influenza la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

### **ABIMONO 1 % crema vaginale contiene alcool cetilstearyllico**

Può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

### **3. Come usare ABIMONO**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

L'applicatore monouso viene utilizzato per inserire la crema profondamente nella vagina. Questo è preferibile prima di coricarsi ed in posizione supina, a gambe lievemente piegate.

Non usi ABIMONO durante il periodo mestruale.

Se è in gravidanza, usi il dispositivo applicatore con cautela e solo nel modo che le viene indicato dal medico.

Durante il trattamento con questo medicinale anche il suo partner dovrebbe usare ABIMONO 1% crema. La crema deve essere applicata sull'organo genitale, in particolare su glande e prepuzio, due volte al giorno per circa una settimana.

L'uso contemporaneo di preservativi in lattice o diaframmi con preparati antimicrobici vaginali può diminuire l'efficacia del contraccettivo in lattice. Pertanto, prodotti come Abimono non devono essere utilizzati insieme a diaframmi o preservativi in lattice. Pazienti che utilizzano spermicidi devono consultare il proprio medico poiché ogni trattamento vaginale locale può rendere inattivo lo spermicida.

### **ABIMONO 600 mg ovulo vaginale**

#### **Quanto**

La dose raccomandata è di 1 ovulo.

*Come*

Inserisca l'ovulo profondamente in vagina.

ABIMONO 1% crema vaginale

*Quanto*

La dose raccomandata è di 1 applicazione al giorno, per una settimana.

*Istruzioni per l'uso*

- Rimuova il tappo del tubo e avviti l'applicatore sul tubo
- Spinga lo stantuffo progressivamente fino alla posizione d'arresto
- Riempia l'applicatore di crema praticando leggera pressione sul tubo
- rimuova l'applicatore dal tubo e riposizioni il tappo
- Inserisca l'applicatore pieno, profondamente in vagina e lo svuoti in cavità spingendo lo stantuffo
- Estragga l'applicatore e lo getti.

Se pensa che l'effetto di Abimono sia troppo forte o troppo debole, contatti il medico o il farmacista.

**Se usa più ABIMONO di quanto deve**

In caso di assunzione/ingestione accidentale o di applicazione eccessiva di Abimono, si rivolga al medico o il farmacista o raggiunga l'ospedale più vicino.

**Se dimentica di usare ABIMONO**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose quando se ne ricorda, semplicemente usi la dose successiva e prosegua il trattamento come prescritto.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

**4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se durante il trattamento con ABIMONO manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati **INTERROMPA** il trattamento e consulti il medico.:

- reazione allergica
- bruciore e irritazione e dolore vaginale
- crampi nella parte bassa della pancia
- eruzione della pelle
- mal di testa

**Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione al [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

**5. Come conservare ABIMONO**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

ABIMONO 600 mg ovulo vaginale

Conservare a temperatura non superiore ai 30 °C.

ABIMONO 1% crema vaginale

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### Cosa contiene ABIMONO 600 mg ovulo vaginale

- il principio attivo è isoconazolo nitrato. Ogni ovulo contiene 0,6 g di isoconazolo nitrato;
- gli altri componenti sono: acido bórico, gliceridi semisintetici.

### Cosa contiene ABIMONO 1% crema vaginale

- il principio attivo è isoconazolo nitrato. 100 g di crema contengono 1 g di isoconazolo nitrato;
- gli altri componenti sono: sorbitan monostearato, poliossietilen sorbitanmonostearato, **alcool cetilsteárico** (vedere il paragrafo "ABIMONO contiene alcool cetilsteárico"), vaselina bianca, isopropil miristato, acido bórico, acqua purificata.

### Descrizione dell'aspetto di ABIMONO e contenuto della confezione

#### ABIMONO 600 mg ovulo vaginale

Si presenta in ovulo per uso ginecologico confezionato in blister in confezione da 1 ovulo.

#### ABIMONO 1% crema vaginale

Si presenta in crema di colore bianco per uso ginecologico confezionata in un tubo da 30 g. Ogni confezione contiene il tubo e 6 applicatori monouso.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Farmitalia S.r.l.  
Viale Alcide De Gasperi 165/B  
95127 Catania

### Produttore

#### ABIMONO 600 mg ovulo vaginale

Special Product's Line S.p.A.  
Via Fratta Rotonda Vado Largo 1  
03012 Anagni (FR)

#### ABIMONO 1% crema vaginale

Special Product's Line s.p.a.  
Via Fratta Rotonda Vado Largo 1  
03012 Anagni (FR).

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il  
Novembre 2018**