

## **Foglio illustrativo: informazioni per l'utente**

### **Amukine Med 0,05% spray cutaneo, soluzione**

Sodio ipoclorito

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è Amukine Med e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Amukine Med
3. Come usare Amukine Med
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Amukine Med
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è Amukine Med e a che cosa serve**

Amukine Med contiene sodio ipoclorito, un antisettico per uso locale.

Amukine Med è indicato per:

- disinfettare e pulire lesioni lievi della pelle come ferite superficiali di piccole dimensioni, piaghe da decubito (lesioni della pelle che interessano le parti del corpo sottoposte a pressione per periodi prolungati) di lieve entità, bruciate (ustioni) di lieve entità (I grado);
- disinfettare i genitali esterni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Amukine Med**

##### **Non usi Amukine Med**

Se è allergico al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Amukine Med è solo per uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a reazioni allergiche (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati"). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico che istituirà la terapia idonea.

La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue ecc.) riduce l'attività dell'antisettico.

L'applicazione del prodotto può sciogliere grumi di sangue e causare sanguinamento.

Eviti il contatto con gli occhi.

### **Altri medicinali e Amukine Med**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Questo medicinale può essere utilizzato in corso di gravidanza e allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non pertinente.

## **3. Come usare Amukine Med**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Amukine Med 0,05% spray cutaneo è pronto all'uso.

Applichi lo spray localmente:

- direttamente sull'area da trattare (ferite, piaghe, bruciature),
- su compresse di garza,
- su bendaggi.

Eroghi lo spray fino a inumidire uniformemente l'area da trattare.

Una singola erogazione equivale a 0,7 ml di soluzione.

La disinfezione può essere ripetuta qualora lo si ritenga necessario, per non più di 6 volte al giorno.

Usi questo medicinale solo per brevi periodi di trattamento.

### **Se usa più Amukine Med di quanto deve**

L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, che possono portare anche a morte. In caso di ingestione accidentale del prodotto consulti immediatamente un medico o si rechi al più vicino ospedale.

### **Se dimentica di usare Amukine Med**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **Se interrompe il trattamento con Amukine Med**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se durante il trattamento con Amukine Med manifesta una reazione allergica **INTERROMPA** immediatamente il trattamento e consulti il medico.

I seguenti effetti indesiderati sono stati segnalati con l'uso di Amukine Med:

- intolleranza (bruciore o irritazione);
- arrossamento e prurito della pelle venuta a contatto con il medicinale (dermatite allergica da contatto).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare Amukine Med**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
Conservi il flacone ben chiuso per proteggere il medicinale dalla luce.  
Reinserisca il cappuccio di protezione sull'erogatore dopo ogni uso.  
Non usi questo medicinale dopo 6 mesi dalla prima apertura.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è sul flacone dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene Amukine Med**

100 ml di soluzione contengono

Il principio attivo è il sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g).

Gli altri componenti sono: sodio cloruro, sodio idrossido, sodio bicarbonato, acqua depurata.

#### **Descrizione dell'aspetto di Amukine Med e contenuto della confezione**

Amukine Med 0,05% spray cutaneo soluzione si presenta in forma di soluzione per uso esterno, che viene erogata attraverso un dispositivo spray.

Il contenuto della confezione è di 200 ml.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Angelini Pharma S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

#### **Produttori**

A.C.R.A.F. S.p.A. Via Pontasso, 13 – 16015 Casella (Genova)

A.C.R.A.F. S.p.A. Via Vecchia del Pinocchio, 22 60131 ANCONA

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato ad luglio 2025**