

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### CANTABILIN 300 mg compresse rivestite

Imecromone

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Cantabilin e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Cantabilin
3. Come prendere Cantabilin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Cantabilin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è CANTABILIN e a cosa serve**

Cantabilin contiene il principio attivo imecromone, che fa parte di un gruppo di medicinali utilizzati per la terapia biliare. È usato per trattare i disordini della colecisti e della produzione di bile.

Cantabilin è usato per il trattamento di:

- alterazione del flusso della bile dalla cistifellea (discinesia biliare)
- indigestione (dispepsia) causata da produzione di bile alterata
- spasmi delle vie biliari e della valvola che regola il deflusso della bile (sfintere di Oddi)

Cantabilin è anche usato come coadiuvante per il trattamento di:

- infiammazione della colecisti
- calcoli biliari (litiasi colecistica)
- dopo la rimozione chirurgica della colecisti
- problemi da lievi a moderati della funzione epatica (insufficienza epatica da lieve a moderata).

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere CANTABILIN**

##### **Non prenda Cantabilin:**

- se è allergico all'imecromone o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Cantabilin se ha:

- un'ostruzione delle vie biliari
- gravi problemi di funzionalità epatica.

##### **Altri medicinali e Cantabilin**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gli effetti di Cantabilin sul feto o sul neonato allattato al seno sono sconosciuti, quindi l'uso di Cantabilin durante la gravidanza o l'allattamento non è raccomandato.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Cantabilin non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

### **Cantabilin contiene giallo tramonto, saccarosio e glucosio.**

Il prodotto contiene:

- giallo tramonto, un agente colorante che può causare reazioni allergiche
- glucosio liquido e saccarosio; se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **3. Come prendere CANTABILIN**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 - 2 compresse due o tre volte al giorno.

Non superi la dose giornaliera raccomandata.

### **Se prende più Cantabilin di quanto deve**

Se lei o qualcun altro ha accidentalmente preso troppe compresse di Cantabilin, informi il medico o vada al più vicino ospedale, portando con sé la confezione, se possibile.

### **Se dimentica di prendere Cantabilin**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

S

Effetti indesiderati comuni (possono interessare tra 1 e 10 persone su 100):

- diarrea

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- reazioni anafilattiche, inclusi orticaria, prurito, difficoltà a respirare, gonfiore del viso, delle labbra, della gola o della lingua (edema), che possono evolvere a shock anafilattico

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare CANTABILIN**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Cantabilin:**

Il principio attivo è imecromone; ogni compressa contiene 300 mg

Gli altri componenti sono:

amido di mais, cellulosa microcristallina, gomma arabica, silice precipitata, magnesio stearato, talco, destrina, glucosio liquido, saccarosio, eritrosina (E 127), giallo tramonto (E 110), cera carnauba.

*Vedere fine della sezione 2 per ulteriori informazioni su giallo tramonto, saccarosio e glucosio.*

### **Descrizione dell'aspetto di Cantabilin e contenuto della confezione**

Cantabilin compresse rivestite sono confezionate in blister da 30 o 40 compresse.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

GRÜNENTHAL ITALIA S.r.l.

Via Carlo Bo,11 – 20143 Milano

Italia

### **Produttore**

FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A.

Stabilimento di produzione: Origgio (VA)

Via Di Vittorio 2

Italia

Per qualsiasi informazione su questo medicinale, contatti il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in Luglio 2015**