

CRYSTACIDE

Perossido di idrogeno all'1% (p/p)
Crema all'1%

Composizione:

1g di crema contiene:

Principio attivo

Perossido di idrogeno 10mg.

Eccipienti

Gliceril monolaurato, Gliceril monomiristato, macrogol stearato 5000, Propilene glicol, Acido citrico anidro, Idrossido di sodio, Acido solforico, Ossalato di sodio, Acido salicilico, Disodio edetato, Sodio pirofosfato, Sodio stannato, Acqua purificata.

Forma farmaceutica

Crema.

Categoria farmacoterapeutica

Disinfettante.

Titolare dell'A.I.C.

Giuliani S.p.a. – Via Palagi, 2 – 20129 Milano

Fabbricato da

Bioglan AB - Malmoe - Svezia.

Indicazioni terapeutiche

CRYSTACIDE CREMA è formulata per l'applicazione topica nel trattamento di infezioni cutanee superficiali primarie e secondarie causate da organismi sensibili al perossido di idrogeno.

Controindicazioni

Ipersensibilità nota ad uno o più eccipienti del prodotto.

Opportune precauzioni d'impiego

Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso in cui il prodotto venga a contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con abbondante acqua fredda. Il perossido di idrogeno può sbiancare i tessuti. L'acido salicilico è un lieve irritante e può causare dermatiti.

Crystacide Crema contiene inoltre glicol propilenico che può causare irritazione cutanea.

Gravidanza ed allattamento: Usare sotto controllo medico.

Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi genere

CRYSTACIDE CREMA è incompatibile con lo iodio, i permanganati e altri agenti ossidanti più forti.

Dose, modo e tempo di somministrazione

CRYSTACIDE CREMA è contenuta in tubetti di polietilene colorati con diossido di titanio e muniti di tappo in polipropilene. Ciascun tubetto è contenuto in una confezione di cartone stampato in formato da 25 g, 40 g, 10 g, 5 g.

Uso negli adulti, anziani e bambini

CRYSTACIDE CREMA si applica 2 - 3 volte al giorno sulla parte infetta della pelle. Sulla ferita può comparire una pellicola asciutta che può essere tolta lavando la parte con acqua.

Durata del trattamento

Il periodo di trattamento non deve protrarsi per più di 3 settimane.

Effetti indesiderati

CRYSTACIDE CREMA é generalmente ben tollerata e non é associata ad alcun effetto collaterale grave. Una lieve sensazione di bruciore può tuttavia essere avvertita per breve tempo dopo l'applicazione. Nel caso di irritazione cutanea prolungata o di altri effetti indesiderati anche se non descritti nel foglio illustrativo, il paziente é invitato ad informare il proprio Medico o Farmacista e chiedere se si deve interrompere l'applicazione del farmaco.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Attenzione

Non utilizzare il farmaco oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Precauzioni per la conservazione del medicinale

Conservare a temperatura inferiore a 25° C in un luogo asciutto.

Data di ultima revisione del Foglietto Illustrativo

Giugno 2016