

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Guaiacalcium complex 0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo

dropropizina + potassio solfoguaiacolato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Guaiacalcium complex e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Guaiacalcium complex
3. Come prendere Guaiacalcium complex
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Guaiacalcium complex
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Guaiacalcium complex e a che cosa serve

Guaiacalcium complex contiene dropropizina e potassio solfoguaiacolato. Questo medicinale si usa per calmare la tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Guaiacalcium complex

Non prenda Guaiacalcium complex

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- in gravidanza, durante l'allattamento (vedere Gravidanza e allattamento);
- nei bambini al di sotto dei 13 anni d'età.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Guaiacalcium complex.

A causa della presenza di etanolo (alcol), usi particolare cautela se uno dei seguenti casi la riguardano:

- se ha malattie di fegato;
- se soffre d'epilessia;
- se ha problemi di alcolismo;
- se ha subito traumi o soffre di malattie cerebrali.

Bambini e adolescenti

Questo medicinale può essere usato solo nei bambini al di sopra dei 13 anni d'età.

Altri medicinali e Guaiacalcium complex

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Guaiacalcium complex con alcol

L'alcool contenuto nel medicinale può modificare o aumentare l'effetto di altri farmaci.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda questo medicinale se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale può raramente causare sonnolenza. Non deve guidare, utilizzare macchinari complessi o svolgere qualsiasi altra attività potenzialmente pericolosa fino a quando non saprà se questo medicinale altera la sua capacità di svolgere queste attività.

Guaiacalcium complex contiene etanolo

Questo medicinale contiene 6,3 vol. % di etanolo (alcol), ad es. fino a 0,76 g per dose, equivalenti a 20 ml di birra, 7,9 ml di vino per dose.

Può essere dannoso per gli alcolisti.

Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento e nei bambini (per i quali il prodotto è comunque controindicato) e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

Guaiacalcium complex contiene metile para-idrossibenzoato. Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Guaiacalcium complex contiene saccarosio. Questo medicinale contiene 6 g di saccarosio per dose. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

3. Come prendere Guaiacalcium complex

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico, o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata **negli adulti e negli adolescenti oltre i 13 anni di età** è di 1 cucchiaio 2 o 3 volte al giorno.

Modo d'uso: nella stagione fredda si consiglia di prendere lo sciroppo caldo, diluendo la dose in acqua, tè o latte molto caldi.

Durata del trattamento: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico.

Se usa più Guaiacalcium complex di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Guaiacalcium complex **avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.**

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Raramente sono stati segnalati casi di nausea ed altri lievi disturbi dello stomaco e dell'intestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Guaiacalcium complex

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Guaiacalcium complex

I principi attivi sono dropropizina e potassio solfoguaiacolato.

100 ml di sciroppo contengono:

- Principi attivi: Dropropizina 0,144 g, Potassio solfoguaiacolato 2 g.
- Gli altri componenti sono aconito radice estratto fluido, lauro ceraso (acqua distillata aromatica), grindelia estratto fluido, balsamo tolù estratto fluido, etanolo 95%, caramello naturale, estratto aromatico, saccarosio, metile paraidrossibenzoato, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Guaiacalcium complex e contenuto della confezione

Guaiacalcium complex si presenta in un flacone da 200 ml in vetro scuro con tappo in alluminio.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

DMS Farmaceutici S.p.A. - Via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio (CO)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 5 dicembre 2014