

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. Denominazione del medicinale veterinario

Drontal 20 mg + 230 mg compresse per gatti

2. Composizione

Una compressa contiene:

Sostanze attive:

Praziquantel	20 mg
Pirantel embonato	230 mg

Compressa rivestita di colore bianco-giallastro con linea di frattura su entrambi i lati

3. Specie di destinazione

Gatto.



4. Indicazioni per l'uso

Per il trattamento delle infestazioni miste del gatto da nematodi e cestodi, provocate da:

Ascaridi: *Toxocara cati* (sin. *mystax*), *Toxascaris leonina*.

Anchilostomi: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*.

Cestodi: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella* spp.

5. Controindicazioni

Non usare in casi di ipersensibilità alle sostanze attive o a uno degli eccipienti.

Il medicinale veterinario non deve essere impiegato durante la gravidanza.

Non usare in gattini al di sotto delle 4 settimane di età.

Non usare contemporaneamente a composti a base di piperazina.

6. Avvertenze speciali

Avvertenze speciali:

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Per assicurare un dosaggio corretto, gli animali dovrebbero essere pesati.

Poiché l'infestazione da cestodi nel gatto non compare prima della 3^a settimana di vita il trattamento con il medicinale veterinario è indicato solo dopo la 3^a settimana di vita.

La resistenza di parassiti ad una particolare classe di antelmintici potrebbe svilupparsi a seguito dell'uso frequente, ripetuto di un antelmintico della stessa classe.

L'echinococcosi rappresenta un pericolo per l'uomo. In caso di echinococcosi devono essere seguite specifiche linee guida per il trattamento e il follow up e per la salvaguardia delle persone. Consultare un esperto o un istituto di parassitologia.

Non utilizzare in animali gravemente debilitati o con grave compromissione della funzionalità epatica o renale.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Le persone con nota ipersensibilità al praziquantel e al pirantel embonato devono somministrare il medicinale veterinario con cautela.

Lavare le mani dopo l'uso. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di irritazione oculare, rivolgersi ad un medico. Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il medicinale veterinario.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza:

Non usare durante gravidanza.

Sovradosaggio:

Sintomi di sovradosaggio non si evidenziano con dosi fino a 5 volte la dose raccomandata. Il primo sintomo atteso di intossicazione è il vomito.

7. Eventi avversi

Gatti:

<i>Molto rari (< 1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)</i>
Disturbi del tratto digerente ¹ (ipersalivazione ¹ , vomito ¹)
Disturbi neurologici ¹ (atassia ¹)

¹Lievi e transitori

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o il suo rappresentante locale utilizzando i recapiti

riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione:
<https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Via di somministrazione:

Uso orale.

Posologia:

Per assicurare un corretto dosaggio, determinare il peso corporeo con la massima accuratezza possibile.

La dose è di 5 mg di praziquantel e 57,5 mg di pirantel embonato per kg di peso corporeo. Questo corrisponde a 1 compressa ogni 4 kg di peso corporeo.

La compressa può essere frazionata secondo necessità

Somministrare le compresse direttamente oppure avvolgendole in un pezzo di carne o salsiccia oppure con il mangime sminuzzandole.

Non sono necessari provvedimenti dietetici.

Per somministrazione unica.

9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione

Da non impiegare negli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

10. Tempi di attesa

Non pertinente.

11. Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola e sul blister dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

13. Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni

A.I.C. n. 100315011 - Scatola da 2 compresse.

A.I.C. n. 100315023 - Scatola da 6 compresse.

A.I.C. n. 100315047 - Scatola da 8 compresse.

A.I.C. n. 100315050 - Scatola da 24 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

03/2026

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

16. Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
France
Tél: +33 3 84 62 55 55

Fabbricanti responsabili del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel
Germania

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
France
Tél: +33 3 84 62 55 55

Rappresentante locale e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

Vetoquinol Italia S.r.l.
Via Luigi Galvani 18
47122 Forlì (FC) - Italia
Tel: +39 0543 46 24 11

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Vetoquinol logo