

## Foglio illustrativo

LACRINORM® "0,01%+0,2% gel oftalmico"  
Tubo 10 g

### **Composizione**

100 g di gel contengono: Benzalconio cloruro 0,01 g; Acido poliacrilico 0,2 g

*Eccipienti:* Sorbitolo; acqua per preparazioni iniettabili

### **Forma farmaceutica**

Gel oftalmico, tubo da 10 g

### **Categoria farmacoterapeutica**

Disinfettante per uso oftalmico. Lubrificante

### **Titolare A.I.C.**

FARMIGEA S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 – Pisa

**Concessionario esclusivo per la vendita:** OFTAGEN Srl – Via G.B. Oliva 6, 56121 - Pisa

### **Prodotto e controllato da**

FARMIGEA SpA Via G. B. Oliva 8, 56121 - Pisa

### **Indicazioni terapeutiche**

Disinfezione della mucosa oculare. Lubrificante, umettante dell'occhio con insufficienza lacrimale (Sindrome dell'occhio secco)

### **Controindicazioni**

Ipersensibilità verso i componenti.

### **Precauzioni di impiego**

Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tale caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

Non utilizzare LACRINORM durante l'indossaggio delle lenti a contatto, ma tra un indossaggio e l'altro. In caso di applicazione attendere 15 minuti prima di indossare le lenti a contatto.

### **Interazioni**

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti oculari

### **Avvertenze**

Non usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. L'ingestione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

### **Dose, modo e tempi di somministrazione**

1 goccia nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì (l'ultima prima di coricarsi).

Durante l'applicazione tenere il tubetto perpendicolare e non obliquo, perché, solo così si ottiene una goccia regolare.  
Non superare le dosi consigliate.

#### **Effetti indesiderati**

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Subito dopo l'applicazione si può verificare un lieve appannamento della vista che è dovuto alla densità del gel; tale appannamento tuttavia scompare molto rapidamente.

Comunicare al proprio medico o al proprio farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.

#### **Attenzione**

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il prodotto non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

#### **Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini**

**Ultima revisione del testo da parte dell'AIFA: Aprile 2009**