

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### DAFNEGIN® 0,2% Soluzione Vaginale Ciclopiroxolamina

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è DAFNEGIN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare DAFNEGIN
3. Come usare DAFNEGIN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DAFNEGIN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Che cos'è DAFNEGIN e a cosa serve

DAFNEGIN contiene il principio attivo ciclopiroxolamina che appartiene alla categoria dei medicinali antimicotici (attivi contro i funghi) ed antibatterici.

DAFNEGIN è utilizzato, insieme ad altri farmaci, nella terapia delle patologie vulvo-vaginali da Candida. Può essere impiegato anche dopo un'altra terapia vaginale, allo scopo di ridurre il rischio di recidive.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

#### 2. Cosa deve sapere prima di usare DAFNEGIN

##### Non usi DAFNEGIN

- se è allergico alla ciclopiroxolamina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare DAFNEGIN.

E' consigliabile praticare l'irrigazione in posizione stesa o semiseduta cercando di mantenere la soluzione per alcuni minuti nella vagina.

L'uso, specie se prolungato, di medicinali per uso vaginale può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tale evenienza occorre sospendere il trattamento ed adottare idonee misure terapeutiche.

Per prevenire una nuova infezione dopo che è già guarita, sarebbe opportuno che anche il suo partner venisse sottoposto a controllo medico.

#### Altri medicinali e DAFNEGIN

Non sono note interazioni con altri medicinali.

#### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**


Non sono stati riscontrati effetti negativi sulla guida di veicoli e sull'utilizzo di macchinari.

### **3. Come usare DAFNEGIN**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi quotidianamente la soluzione vaginale, preferibilmente al mattino, per un periodo di cinque giorni, utilizzando l'intero flacone con le seguenti modalità d'uso:

- A) Tenere il flacone per l'anello e piegare il cappuccio fino a rottura del sigillo di sicurezza (fig. 1)
- B) Estrarre la cannula sino al suo arresto in modo da avvertire lo scatto del giusto posizionamento (fig. 2)
- C) Introdurre la cannula in vagina e premere le pareti del flacone in modo da permetterne il completo svuotamento.



Si consiglia di eseguire l'operazione di irrigazione in posizione distesa e lentamente.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Dafnegin soluzione vaginale è generalmente ben tollerata, tuttavia raramente possono manifestarsi prurito, bruciore o irritazione locale.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare DAFNEGIN**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene DAFNEGIN**

- Il principio attivo è la Ciclopiroxolamina. 100 ml di soluzione vaginale contengono 200 mg di ciclopiroxolamina.
- Gli altri componenti sono: polietilenglicole 300, poliglicoleum, undebenzofene, polisorbato 20, acido lattico, e acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di DAFNEGIN e contenuto della confezione**

Soluzione vaginale – 5 flaconi con cannula da 150 ml.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

S&R Farmaceutici S.P.A.-Via dei Pioppi, 2-06083 Bastia Umbra -(Perugia) - Italia

*Produttore*

New.Fa.Dem. S.r.l Viale Ferrovie dello Stato – Zona ASI 80014 Giugliano in Campania (NA)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Luglio 2023**