

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Recotuss Sedativo 2 mg/ml sciroppo

destrometorfano bromidrato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5-7 giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Recotuss Sedativo e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Recotuss Sedativo
3. Come prendere Recotuss Sedativo
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Recotuss Sedativo
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Recotuss Sedativo e a cosa serve

Recotuss Sedativo contiene il principio attivo destrometorfano bromidrato.

Appartiene alla classe di medicinali chiamati calmanti (sedativi) della tosse.

Recotuss Sedativo si usa nel trattamento sintomatico della tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5-7 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Recotuss Sedativo

Questo medicinale può portare a dipendenza. Pertanto il trattamento dovrà essere di breve durata.

Non prenda Recotuss Sedativo

- se è allergico al destrometorfano bromidrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è allergico ad altre sostanze appartenenti alla stessa famiglia del destrometorfano bromidrato (che è il principio attivo di Recotuss Sedativo); in particolare ad altri medicinali contro la tosse come dimemorfano, codeina e diidrocodeina;
- se sta prendendo, o ha preso nelle due settimane precedenti, medicinali usati per la depressione (antidepressivi) (vedere "Altri medicinali e Recotuss Sedativo").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Recotuss Sedativo.

Usi Recotuss Sedativo solo dopo aver consultato il medico se:

- ha difficoltà respiratorie (asma);
- è per un bambino di età inferiore a due anni (vedere "Bambini");
- è in gravidanza o sta allattando (vedere "Gravidanza e allattamento");

- è molto debole (debitato).

Parli con il medico o il farmacista prima di assumere Recotuss Sedativo:

- se si stanno assumendo medicinali come alcuni antidepressivi o antipsicotici: Recotuss Sedativo può interagire con questi medicinali e si possono verificare alterazioni dello stato mentale (ad es. agitazione, allucinazioni, coma) e altri effetti come temperatura corporea superiore a 38° C, aumento frequenza cardiaca, pressione arteriosa instabile, esagerazione dei riflessi, rigidità muscolare, mancanza di coordinazione e/o sintomi gastrointestinali (ad es. nausea, vomito, diarrea).

Bambini

Nel caso di bambini di età inferiore a due anni usi Recotuss Sedativo solo dopo aver consultato il medico.

Altri medicinali e Recotuss Sedativo

Informi il medico o il farmacista se lei sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare informi il medico se lei sta assumendo o ha recentemente assunto:

- medicinali per trattare la depressione come fluoxetina, paroxetina, sertralina e bupropione (vedere paragrafo 2“Non prenda Recotuss Sedativo”);
- medicinali per trattare i dolori gravi o per ridurre i sintomi da astinenza nei casi di dipendenza (metadone);
- medicinali per trattare malattie psichiatriche (aloperidolo, tioridazina, perfenazina);
- medicinali per trattare i disturbi del ritmo del cuore (amiodarone, chinidina, propafenone);
- medicinali per trattare le anomalie del ritmo cardiaco (flecainide);
- medicinali per ridurre il livello di calcio nel sangue e trattare una disfunzione dell’organismo dovuta ad una ridotta secrezione dell’ormone che regola tali livelli nel sangue (iperparatiroidismo) come cinacalcet;
- medicinali usati per impedire lo sviluppo dei funghi (miceti) (terbinafina).
- l’uso concomitante di Recotuss Sedativo con medicinali sedativi come benzodiazepine o farmaci correlati aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà nella respirazione (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita. Per questo motivo, l’uso concomitante deve essere preso in considerazione solo quando non sono possibili altre opzioni di trattamento. Tuttavia se il medico le prescrive Recotuss Sedativo insieme a medicinali sedativi, la dose e la durata del trattamento concomitante devono essere limitate dal medico. Informi il medico di tutti i medicinali sedativi che sta assumendo e segua attentamente le raccomandazioni del medico sul dosaggio. Potrebbe essere utile informare amici o parenti di fare attenzione a segni e sintomi sopra indicati. Si rivolga al medico quando si verificano tali sintomi.

Recotuss Sedativo con alcool

Non esageri con l’uso di alcool mentre sta prendendo Recotuss Sedativo.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

In gravidanza e durante l’allattamento Recotuss Sedativo deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui i rischi e i benefici derivanti dal trattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Recotuss Sedativo può causare sonnolenza per cui la sua capacità di attenzione e vigilanza potrebbero diminuire durante la guida di autoveicoli e l’utilizzo di macchinari.

Recotuss Sedativo contiene saccarosio, etanolo e metile p-idrossibenzoato e sorbitolo

- **saccarosio:** se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale;

- **etanolo:** questo medicinale contiene 8.7 vol% di etanolo (alcool), ad es. fino a 350 mg per misurino, equivalenti a 9 ml di birra, 4 ml di vino per misurino. Può essere dannoso per gli alcolisti. Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie del fegato o epilessia;
- **metile p-idrossibenzoato:** può causare reazioni allergiche (anche ritardate);
- **sorbitolo:** questo medicinale contiene 0.5 mg di sorbitolo per misurino di sciroppo equivalente a 0.1 mg/ml.

3. Come prendere Recotuss Sedativo

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti: la dose raccomandata è un misurino per volta (tacca “5 ml” del cucchiaino dosatore incluso nella confezione), da assumere tre o quattro volte al giorno.

Non usi Recotuss Sedativo per più di 5-7 giorni.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Non superi le dosi raccomandate senza il consiglio del medico.

Uso nei bambini

Bambini al di sopra dei due anni: la dose raccomandata è mezzo misurino per volta (tacca “2,5 ml” del cucchiaino dosatore incluso nella confezione), da assumere tre o quattro volte al giorno.

Nel caso di bambini di età inferiore a due anni consulti il medico prima di iniziare il trattamento.

Nei bambini in caso di sovradosaggio possono verificarsi eventi avversi gravi, inclusi disturbi neurologici. Le persone che si prendono cura dei pazienti non dovranno superare la dose raccomandata.

Se prende più Recotuss Sedativo di quanto deve

Come sintomi di sovradosaggio si possono verificare confusione mentale e forte eccitamento.

Alte dosi possono provocare difficoltà nel respirare (depressione respiratoria).

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Recotuss Sedativo avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se si assume più Recotuss Sedativo del dovuto, si possono manifestare i seguenti sintomi: nausea e vomito, contrazioni muscolari involontarie, agitazione, confusione, sonnolenza, disturbi cognitivi, movimenti oculari involontari e rapidi, disturbi cardiaci (battito cardiaco accelerato), disturbi di coordinazione, psicosi con allucinazioni visive e ipereccitabilità.

Altri sintomi in caso di sovradosaggio massivo possono essere: coma, gravi problemi respiratori e convulsioni.

Rivolgersi al medico o all'ospedale immediatamente se si verifica uno dei sintomi sopracitati.

Se dimentica di prendere Recotuss Sedativo

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Recotuss Sedativo

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Durante la terapia possono verificarsi:

- sonnolenza

- disturbi allo stomaco e all'intestino (nausea, vomito)
- vertigini.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente passeggeri. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Recotuss Sedativo

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Recotuss Sedativo

- Il principio attivo è destrometorfano bromidrato. Un ml di sciroppo contiene 2,0 mg di destrometorfano bromidrato (pari a 1,541 mg di destrometorfano)
- Gli altri componenti sono: etanolo, sorbitolo soluzione, saccarosio, glicerolo, metile p-idrossibenzoato, aroma limone, aroma menta, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Recotuss Sedativo e contenuto della confezione

Recotuss Sedativo si presenta in forma di flacone in vetro contenente uno sciroppo da prendere per bocca. Il contenuto della confezione è di 100 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 – Milano.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 07/2021