

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

STRIKE[®] pasta orale 38 g/100 g per equini
Pyrantel Pamoato

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio
ACME s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (RE)

Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione
ACME DRUGS s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9/A - 42025 Cavriago (RE)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

STRIKE[®] pasta orale 38 g/100 g per equini
Pyrantel Pamoato

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 g di prodotto contengono:

Principio attivo: pyrantel pamoato: 38 g pari a 13,2 g di pyrantel base

Eccipienti: glicole propilenico
metil-p-idrossibenzoato
altri: qb a 100 g

4. INDICAZIONI

Trattamento delle infestazioni gastrointestinali degli equini sostenute da grandi strongili (*Strongylus vulgaris*, *S. edentatus*, *S. equinus*), piccoli strongili (*Triodontophorus* spp., *Cyathostominae*) e cestodi (*Tenie*: *Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna*).

5. CONTROINDICAZIONI

L'impiego è sconsigliato negli animali gravemente debilitati.
Non usare in animali con ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Gli effetti indesiderati più frequentemente osservati sono correlati con l'apparato gastrointestinale in particolare: anoressia, vomito, diarrea.

Nei soggetti gravemente debilitati gli effetti nicotinici del pyrantel risultano maggiormente pronunciati.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Equini

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

6,6 mg di pyrantel base /kg p.v./die, pari a 5 g di pasta orale per 100 kg di peso vivo, in unica somministrazione è efficace nelle infestazioni da nematodi; ad un dosaggio doppio è efficace nelle infestazioni da cestodi.

Infestazioni sostenute da grandi e piccoli strongili

Somministrare con un unico trattamento 5 g di pasta orale per 100 kg di peso dell'equino.

Infestazioni sostenute da cestodi (TENIE)


Somministrare con un unico trattamento 10 g di pasta per 100 kg di peso dell'equino.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Utilizzo della siringa da 35 g e da 50 g:

Predisporre la siringa per l'erogazione della dose corretta in base al peso dell'equino.

La precisa erogazione della dose da somministrare si ottiene posizionando il margine anteriore della ghiera dello stantuffo in corrispondenza del peso dell'equino riportato sulla scala graduata riferita alle infestazioni da strongili o da cestodi (tenie).



10. TEMPO DI ATTESA

Carne e visceri: zero (0) giorni

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in contenitore chiuso.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 30 giorni

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti, il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico delle feci.

Può svilupparsi resistenza dei parassiti a qualsiasi classe di antelmintici dopo un uso frequente e ripetuto di un antelmintico di quella classe.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Negli animali debilitati o fortemente infestati, il prodotto deve essere usato solo dopo una valutazione del rischio / beneficio del veterinario.

Emorragie digestive (diarrea, feci sanguinolente) possono derivare dal trattamento con antelmintici in caso di infestazioni pesanti.

Il principio attivo non è noto per causare particolari reazioni avverse negli animali giovani.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

In caso di ingestione, versamento sulla cute, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Indossare dei guanti per somministrare il prodotto. In caso di contatto accidentale lavare le mani accuratamente.

Le persone con nota ipersensibilità ad uno qualsiasi degli eccipienti devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Strike pasta orale è ben tollerato durante tutte le fasi della gravidanza e della lattazione così come nello svezzamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nei soggetti particolarmente debilitati la concomitante somministrazione del prodotto associata ad altri farmaci colinergici potrebbe accentuare gli effetti nicotinosimili del Pyrantel potenziandone la sua tossicità.

Non usare contemporaneamente con piperazina, in quanto gli effetti antelmintici del pyrantel possono essere contrastati dalla piperazina.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non si sono verificati sintomi di alcun genere in seguito a somministrazioni fino a 6 volte superiori alla dose terapeutica per 3 giorni consecutivi.

A dosaggi superiori a quelli consigliati è stato registrato un aumento significativo dei valori di ALT.

Incompatibilità

In assenza di studi sulla compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere somministrato contemporaneamente ad altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Dicembre 2015