



Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

IPER G, gocce orali soluzione

Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale omeopatico perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio e come il medico o il farmacista le ha detto di fare

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni



Contenuto di questo foglio

1. Cos'è IPER G
2. Cosa deve sapere prima di prendere IPER G
3. Come prendere IPER G
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare IPER G
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Bambini e adolescenti

IPER G non deve essere somministrato ai bambini al di sotto dei 12 anni di età.

Altri medicinali e IPER G

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Non utilizzi IPER G se è in corso una gravidanza, o se sta allattando con latte materno. Se sospetta o sta pianificando una gravidanza chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

IPER G contiene 30 vol % etanolo (alcool).

0,14 mL di prodotto equivalgono a 5 gocce (0,14 mL=5gocce) e contengono 33,6 mg di etanolo.

Questo medicinale contiene 240 mg di alcol (etanolo), in ogni mL. La quantità in 1 mL di questo medicinale è equivalente a 6 mL di birra o 2,4 mL di vino.

L'alcol contenuto in questo medicinale omeopatico potrebbe avere influenza sui bambini. Questi effetti possono includere il sentirsi assonniati e sbalzi di umore. Può anche alterare la capacità di concentrazione e di fare attività fisica. La quantità di alcol in questo medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Questo perché l'alcol può alterare la capacità di giudizio e quanto velocemente si reagisce agli stimoli. Se è affetto da epilessia o ha problemi di fegato, parli con il medico o il farmacista

1. Cos'è IPER G

IPER G è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al medico o al farmacista.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere IPER G

Non prenda IPER G

- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere IPER G.

Consultare il medico se i sintomi persistono.



prima di assumere questo medicinale. L'alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali. Se ha una dipendenza da alcol, parli con il medico prima di assumere questo medicinale.

3. Come prendere IPER G

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. Uso orale. Assuma le gocce diluite in poca acqua o direttamente in bocca.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Istruzioni per l'apertura

Per aprire il flacone spingere il tappo verso il basso e, contemporaneamente, ruotarlo in senso antiorario.



4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare IPER G

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione

particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Il prodotto dopo apertura ha una validità di 6 mesi.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene IPER G

30 mL di gocce orali, soluzione contingono: Propranololo D8 2,21 mL, Rauwolfia D6 2,21 mL, Passiflora D4 2,21 mL, Sarsaparilla D4 0,21 mL, Arnica D6 0,21 mL, Valeriana D3 0,21 mL, Melissa officinalis D2 2,37 mL, Aurum metallicum C6 2,37 mL, Baryta carbonica C6 2,21 mL, Baryta carbonica C15 2,21 mL, Baryta carbonica C30 2,21 mL, Nux vomica C6 2,37 mL, Phosphorus C6 2,21 mL, Phosphorus C15 2,21 mL, Phosphorus C30 2,21 mL, Sulfur C6 2,37 mL.

Gli altri componenti sono etanolo 96% V/V e acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di IPER G e contenuto della confezione

IPER G è una soluzione, contenuta in un flacone di vetro munito di contagocce.

E' disponibile in flacone da 30 mL.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

GUNA S.p.a.
Via Palmanova 71
20132 Milano (MI)
Italia
Tel.: 02 280 181
email: info@guna.it

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 03/2021