

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

TRANS-VER-SAL 3,75 mg/ 6 mm cerotti transdermici
TRANS-VER-SAL 13,5 mg/ 12 mm cerotti transdermici
TRANS-VER-SAL 36,3 mg/ 20 mm cerotti transdermici
Acido salicilico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi degli effetti indesiderati, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è TRANS-VER-SAL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare TRANS-VER-SAL
3. Come usare TRANS-VER-SAL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TRANS-VER-SAL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è TRANS-VER-SAL e a cosa serve

TRANS-VER-SAL è un cerotto da utilizzare sulla pelle che contiene acido salicilico. L'acido salicilico appartiene a un gruppo di medicinali che svolgono la loro azione eliminando gli strati più superficiali della pelle, accelerandone così il naturale ricambio.

TRANS-VER-SAL è indicato per il **trattamento di:**

- verruche comuni (formazioni della pelle causate da un'infezione virale, caratterizzate dallo stesso colore della pelle e da una tipica superficie ruvida),
- callosità e duroni (ispessimento diffuso e indurimento dello strato superficiale della pelle, accompagnato o meno da dolore dovuto a compressione o attrito).

2. Cosa deve sapere prima di usare TRANS-VER-SAL

Non usi TRANS-VER-SAL

- se è allergico ad acido salicilico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di diabete (una malattia caratterizzata da un aumento del glucosio nel sangue);
- se soffre di insufficienza circolatoria (incapacità del cuore e della circolazione di rispondere alle richieste dell'organismo).
- sul viso, sulla zona ano-genitale e sulle mucose.
- su nevi, verruche seborroiche e condilomi.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare TRANS-VER-SAL.

- Eviti l'applicazione sulla pelle sana circostante la parte interessata,
- Non usi sulla pelle irritata, infetta od arrossata.
- Eviti il contatto con gli occhi e le mucose.

Non usi TRANS-VER-SAL per trattamenti prolungati. Se dopo un breve periodo di trattamento non si raggiungono risultati apprezzabili, consulti il medico.

Non usi TRANS-VER-SAL per prevenire la formazione di verruche.

Il trattamento con TRANS-VER-SAL, specialmente se prolungato può causare **reazioni allergiche**. Se manifesta questo effetto indesiderato, **interrompa** il trattamento ed **informi immediatamente il medico** che stabilirà la terapia più adatta per lei (vedere paragrafo 4).

Bambini ed adolescenti

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Altri medicinali e TRANS-VER-SAL

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti di usare TRANS-VER-SAL insieme ad altri medicinali cheratolitici (medicinali che facilitano l'esfoliazione della pelle) per non aumentare l'azione corrosiva del medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

TRANS-VER-SAL può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti sulla capacità di guidare e sull'utilizzo di macchinari.

TRANS-VER-SAL contiene glicole propilenico

Cerotto transdermico dal diametro di 6 mm: questo medicinale contiene 11.25 mg di glicole propilenico per cerotto.

Cerotto transdermico dal diametro di 12 mm: questo medicinale contiene 40.5 mg di glicole propilenico per cerotto.

Cerotto transdermico dal diametro di 20 mm: questo medicinale contiene 108.9 mg di glicole propilenico per cerotto.

3. Come usare TRANS-VER-SAL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.


Questo medicinale è solo per *uso esterno*.

Applichi 1 cerotto transdermico sulla zona interessata alla sera, lo lasci agire per tutta la notte e lo rimuova il mattino seguente.

Ripeta l'applicazione ogni 24 ore, fino a quando la verruca sarà stata eliminata.

Non superi le dosi consigliate.

Istruzioni per l'uso di TRANS-VER-SAL



1. Preparazione della zona da trattare

Pulisca la pelle fino ad ammorbidire la superficie della verruca con la limetta a smeriglio fornita all'interno della confezione.

2. Preparazione del cerotto transdermico medicato

Tolga un cerotto transdermico dal supporto trasparente, lasciando il film plastico sulla parte superiore. Se il cerotto transdermico è più grande della verruca, lo riduca ad un formato sufficiente per coprire solo la superficie della verruca. E' importante che il cerotto transdermico venga tagliato con precisione in modo da evitare che venga a contatto con la pelle sana intorno alla verruca.

3. Umidificazione della verruca

Applichi una goccia di acqua tiepida sulla verruca, tenendo asciutta la pelle circostante.

4. Applicazione del cerotto transdermico medicato

Applichi il cerotto transdermico medicato al momento di coricarsi, facendo aderire la parte appiccicosa.

5. Fissaggio del cerotto transdermico medicato

Usi un cerotto per fissare il cerotto transdermico medicato una volta applicato.

Se usa più TRANS-VER-SAL di quanto deve

In caso di ingestione accidentale di TRANS-VER-SAL avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se interrompe il trattamento con TRANS-VER-SAL

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, TRANS-VER-SAL può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Il trattamento con TRANS-VER-SAL, specialmente se prolungato, può causare **reazioni allergiche**. Se manifesta questo effetto indesiderato, **interrompa il trattamento ed informi immediatamente il medico** che stabilirà la terapia più adatta per lei.

Gli ulteriori effetti indesiderati che possono verificarsi durante l'uso di TRANS-VER-SAL sono:

Effetti che riguardano il sito di applicazione

bruciore o irritazione.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TRANS-VER-SAL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad.. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TRANS-VER-SAL

- Il principio attivo è acido salicilico (3,75 mg nel cerotto transdermico dal diametro di 6 mm; 13,5 mg nel cerotto transdermico dal diametro di 12 mm; 36,3 mg nel cerotto transdermico dal diametro di 20 mm)
- Gli altri componenti sono gomma di Karaya, **glicole propilenico** (vedere paragrafo "TRANS-VER-SAL contiene glicole propilenico"), polietilene glicole 300, Germaben II.

Descrizione dell'aspetto di TRANS-VER-SAL e contenuto della confezione

TRANS-VER-SAL è un cerotto transdermico del diametro di 6, 12 o 20 mm.

TRANS-VER-SAL è disponibile in diverse confezioni che contengono rispettivamente:

- 20 cerotti transdermici, 24 cerotti di fissaggio ed una limetta;
- 16 cerotti transdermici, 18 cerotti di fissaggio ed una limetta;
- 10 cerotti transdermici, 10 cerotti di fissaggio ed una limetta.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Difa Cooper S.p.A. - Via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

Produttore

Toll Manufacturing Services, S.L. - C/Aragoneses 2- Alcobendas Madrid

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Marzo 2024