

## **Foglio illustrativo: informazioni per l'utente**

### **Amukine Med 0,05% soluzione cutanea**

Sodio ipoclorito

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è Amukine Med e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Amukine Med
3. Come usare Amukine Med
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Amukine Med
6. Contenuto della confezione e altre altre informazioni

#### **1. Cos'è Amukine Med e a cosa serve**

Amukine Med contiene sodio ipoclorito, un antisettico per uso locale.

Amukine Med è indicato per:

- disinfettare e pulire lesioni lievi della pelle come ferite superficiali di piccole dimensioni, piaghe da decubito (lesioni della pelle che interessano le parti del corpo sottoposte a pressione per periodi prolungati) di lieve entità, bruciate (ustioni) di lieve entità (I grado);
- disinfettare i genitali esterni

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Amukine Med**

##### **Non usi Amukine Med**

- Se è allergico al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Amukine Med è solo per uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a reazioni allergiche (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati"). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico che istituirà la terapia idonea.

La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue, ecc.) può ridurre l'attività dell'antisettico.

L'applicazione topica del prodotto può sciogliere grumi di sangue e causare sanguinamento.

Eviti il contatto con gli occhi.

### **Altri medicinali e Amukine Med**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di altri antisettici o di detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Questo medicinale può essere utilizzato in corso di gravidanza e allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non pertinente

## **3. Come usare Amukine Med**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Amukine Med 0,05% soluzione cutanea è pronta all'uso.

Applichi la soluzione localmente mediante:

- lavaggio o bagno,
- compresse imbevute,
- bendaggi inumiditi.

La disinfezione può essere ripetuta qualora lo si ritenga necessario, per non più di 6 volte al giorno.

Usi questo medicinale solo per brevi periodi di trattamento.

### **Se usa più Amukine Med di quanto deve**

L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, che possono portare anche a morte. In caso di ingestione accidentale del prodotto consulti immediatamente un medico, o si rechi al più vicino ospedale.

### **Se dimentica di usare Amukine Med**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **Se interrompe il trattamento con Amukine Med**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se durante il trattamento con Amukine Med manifesta una reazione allergica **INTERROMPA** immediatamente il trattamento e consulti il medico.

I seguenti effetti indesiderati potrebbero verificarsi con l'uso di Amukine Med:

- intolleranza (bruciore o irritazione);
- arrossamento e prurito della pelle venuta a contatto con il medicinale (dermatite allergica da contatto).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o, al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Amukine Med**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservi a temperatura inferiore a 30°C.

Conservi il flacone in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

Reinserisca il cappuccio di protezione sull'erogatore dopo ogni uso.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è sul flacone dopo {SCAD}. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Amukine Med**

#### 100 ml di soluzione contengono

Il principio attivo è il sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g).

Gli altri componenti sono: cloruro di sodio, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Amukine Med e contenuto della confezione**

Amukine Med 0,05% soluzione cutanea si presenta in forma di soluzione per uso esterno.

Il contenuto della confezione è di 250, 500 o 1000 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

### **Produttore**

A.C.R.A.F. S.p.A. Via Pontasso, 13 – 16015 Casella (Genova).

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a febbraio 2021**