

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

CORYFIN TOSSE SEDATIVO 15 mg/5 ml sciroppo dropipizina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è CORYFIN TOSSE SEDATIVO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere CORYFIN TOSSE SEDATIVO
3. Come prendere CORYFIN TOSSE SEDATIVO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CORYFIN TOSSE SEDATIVO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è CORYFIN TOSSE SEDATIVO e a cosa serve

CORYFIN TOSSE SEDATIVO contiene il principio attivo dropipizina, appartenente alla classe dei sedativi della tosse, ed è utilizzato per calmare la tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere CORYFIN TOSSE SEDATIVO

Non prenda CORYFIN TOSSE SEDATIVO

- Se è allergico alla dropipizina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se la sua tosse è accompagnata da molto catarro (ipersecrezione bronchiale) o ha difficoltà ad eliminarlo (ridotta funzione mucociliare).
- Se è in gravidanza o sta allattando con latte materno.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere CORYFIN TOSSE SEDATIVO.

Non prenda CORYFIN TOSSE SEDATIVO per lunghi periodi di tempo.

Consulti il medico prima di prendere CORYFIN TOSSE SEDATIVO se soffre di problemi ai reni.

Bambini

CORYFIN TOSSE SEDATIVO deve essere usato nei bambini con meno di 6 anni solo dopo aver consultato il medico.

Altri medicinali e CORYFIN TOSSE SEDATIVO

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni di CORYFIN TOSSE SEDATIVO con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda CORYFIN TOSSE SEDATIVO nel primo trimestre di gravidanza o se sta allattando con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

CORYFIN TOSSE SEDATIVO può causare sonnolenza. Faccia particolare attenzione prima di mettersi alla guida di veicoli o di usare macchinari.

CORYFIN TOSSE SEDATIVO contiene:

- **saccarosio:** questo medicinale contiene 5 g di saccarosio (zucchero) in 10 ml, equivalenti a due cucchiaini da thè. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.
- **p-ossibenzoato di metile:** può causare reazioni allergiche (anche ritardate).
- **acido benzoico:** questo medicinale contiene 9 mg di acido benzoico in 10 ml, equivalenti a due cucchiaini da thè.
- **alcol benzilico:** questo medicinale contiene 0,40 mg di alcol benzilico in 10 ml equivalenti a due cucchiaini da thè. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche. L'alcool benzilico è stato associato al rischio di gravi effetti indesiderati inclusi problemi respiratori (sindrome da respiro agonico) nei bambini piccoli. Non usi per più di una settimana nei bambini piccoli (meno di 3 anni di età) se non diversamente raccomandato dal medico o dal farmacista.
Chieda consiglio al medico o al farmacista se è in gravidanza o sta allattando. Questo perché grandi quantità di alcol benzilico possono accumularsi nel corpo e causare effetti indesiderati (come l'acidosi metabolica).
Chieda consiglio al medico o al farmacista se ha una patologia al fegato o ai reni. Questo perché grandi quantità di alcol benzilico possono accumularsi nel corpo e causare effetti indesiderati (come l'acidosi metabolica).

3. Come prendere CORYFIN TOSSE SEDATIVO

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

- Adulti e ragazzi oltre i 13 anni: 10 ml 3 - 4 volte al giorno.

Uso nei bambini e negli adolescenti

- Bambini da 6 mesi a un anno: 1,25 ml 3 - 4 volte al giorno.
- Bambini da 1 a 3 anni: 2,5 ml 3 - 4 volte al giorno.
- Bambini da 3 a 13 anni: 5 ml 3 - 4 volte al giorno.

5 ml di sciroppo corrispondono a 15 mg di dropopizina.

Non superi le dosi consigliate. Prenda questo medicinale solo per brevi periodi di trattamento.

Se prende più CORYFIN TOSSE SEDATIVO di quanto deve

Se ha preso una dose eccessiva di questo medicinale contatti il medico.

Se dimentica di prendere CORYFIN TOSSE SEDATIVO

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Raramente sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati con l'uso di CORYFIN TOSSE SEDATIVO:

- nausea o altri lievi disturbi allo stomaco o all'intestino;
- debolezza (spossatezza), diminuzione delle normali attività (torpore);
- mal di testa e vertigini.

In questi casi interrompa il trattamento e informi il medico.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CORYFIN TOSSE SEDATIVO

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede particolari precauzioni per la conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CORYFIN TOSSE SEDATIVO

- Il principio attivo è dropropizina. Un flacone contiene 450 mg di dropropizina. Un millilitro di sciroppo ne contiene 3 mg.
- Gli altri componenti sono: acido benzoico, acido citrico, aroma di ribes (contiene alcol benzilico), aroma di amarena (contiene alcol benzilico), saccarosio, p-ossibenzoato di metile, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di CORYFIN TOSSE SEDATIVO e contenuto della confezione

Questo medicinale si presenta in forma di sciroppo per uso orale. Il contenuto della confezione è di 1 flacone da 150 ml e misurino graduato.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Via Provinciale per Lecco, 78

22038 Tavernerio (CO)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il gennaio 2025