

**Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore****BRUNICROM 2% collirio, soluzione**  
Sodio cromoglicato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Brunicrom e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Brunicrom
3. Come usare Brunicrom
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Brunicrom
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è BRUNICROM e a che cosa serve**

Brunicrom contiene il principio attivo sodio cromoglicato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antiallergici che attenuano i sintomi delle allergie.

Questo medicinale è indicato per prevenire le reazioni allergiche degli occhi come la congiuntivite allergica e la cheratocongiuntivite primaverile.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

**2. Cosa deve sapere prima di usare Brunicrom****Non usi Brunicrom:**

- se è allergico al sodio cromoglicato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Brunicrom.

Questo medicinale è disponibile in contenitori monodose sterili che non contengono conservanti, pertanto può essere usato anche da persone che portano lenti a contatto.

Eviti di toccare l'occhio con il beccuccio del contenitore.

Elimini il contenitore dopo l'uso

**Altri medicinali e Brunicrom**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Se utilizza un altro collirio, lasci trascorrere almeno 15 minuti tra l'applicazione di Brunicrom e dell'altro medicinale.

**Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Non usi questo medicinale durante il primo trimestre di gravidanza, tranne in caso di assoluta necessità.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono noti effetti di questo medicinale sulla capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

### **3. Come usare Brunicrom**

Usi Brunicrom seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 gocce, da introdurre nell'occhio (sacca congiuntivale inferiore), 4 volte al giorno. Eviti di toccare l'occhio con il beccuccio del contenitore.

Per un uso corretto del medicinale, segua attentamente le istruzioni:

- stacchi un flaconcino monodose dalla striscia (Figura A);
- scuota il beccuccio per liberarlo dal liquido;
- apra il flaconcino monodose, ruotando l'aletta e contemporaneamente tirando (Figura B);
- capovolga il flaconcino ed eserciti una leggera pressione sullo stesso, in modo da far uscire il medicinale goccia a goccia;
- elimini il contenitore monodose dopo l'uso.




Figura A




Figura B

Ogni contenitore contiene una quantità di collirio sufficiente per trattare entrambi gli occhi 1 sola volta.

Quando possibile, il trattamento con questo medicinale deve essere iniziato prima che si manifesti la reazione allergica e deve essere continuato con regolarità fino a che lei è in contatto con la sostanza che le provoca allergia o comunque fino alla scomparsa dei sintomi.

#### **Se usa più Brunicrom di quanto deve**

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Brunicrom avverte immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di usare Brunicrom**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- bruciore e prurito transitori degli occhi.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare Brunicrom**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non conservare a temperature superiore a 25°C.

Conservare nel contenitore originale e al riparo dalla luce del sole.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene Brunicrom**

- Il principio attivo è sodio cromoglicato. 100 ml di soluzione contengono 2 g di sodio cromoglicato.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro (isotonizzante), acqua depurata.

##### **Descrizione dell'aspetto di Brunicrom e contenuto della confezione**

20 contenitori monodose da 0,3 ml in bustine termosaldate.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Bruschettini S.r.l. - Via Isonzo, 6 - 16147 Genova – Italia

##### **Produttore**

Laboratoire Unither – Espace Industriel Nord - 151, rue André Durouchez - CS28028 80084 AMIENS  
CEDEX 02 - FRANCIA

##### **Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Dicembre 2015