

Foglio Illustrativo: Informazioni per il Paziente

Simeticone Angelini 42 mg, compresse masticabili Simeticone

Legga attentamente questo foglio prima di assumere questo medicinale poiché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda sempre questo medicinale esattamente come descritto in questo foglio o secondo quanto indicato dal medico o dal farmacista.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista
- Se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato, informi il medico o il farmacista. Questo comprende ogni possibile effetto non elencato in questo foglio. Vedere sezione 4
- Se non si sente meglio o peggiora, contatti il suo medico.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Simeticone Angelini e a che cosa serve
2. Cosa è necessario sapere prima di prendere Simeticone Angelini
3. Come prendere Simeticone Angelini
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Simeticone Angelini
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cosa è Simeticone Angelini e a cosa serve

Contro la flatulenza.

Simeticone Angelini contiene simeticone come principio attivo. Simeticone appartiene al gruppo di farmaci che riducono la presenza di gas nello stomaco e nell'intestino.

Bambini dai 12 anni in su ed adulti

Simeticone Angelini è utilizzato nel trattamento di gonfiore addominale, flatulenza e meteorismo (sintomi correlati a presenza di gas).

2. Ce cosa è necessario sapere prima di prendere Simeticone Angelini

Non prenda Simeticone Angelini

Se è allergico al simeticone o ad uno qualsiasi degli eccipienti di questo medicinale (elencati nel paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Chieda al medico o al farmacista prima di prendere Simeticone Angelini

Se ha difficoltà nel masticare compresse.

Simeticone Angelini non deve essere preso quando si sospettino perforazione o ostruzione intestinale (ileo).

Bambini

Simeticone Angelini compresse, non deve essere somministrato ai bambini al di sotto di 12 anni a causa delle limitate informazioni disponibili in materia di sicurezza.

Altri medicinali e Simeicone Angelini

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Simeicone Angelini compresse non deve essere assunto con olio di paraffina, olio minerale usato come lassativo.

Simeicone Angelini con cibo e bevande

Nessun effetto.

Gravidanza e allattamento

Se è in stato di gravidanza o sta allattando al seno, se pensa di essere incinta o sta pianificando una gravidanza, avvisi il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale.

Gravidanza:

Non sono disponibili dati riguardanti l'uso di simeicone in donne in gravidanza. Tuttavia, dato che simeicone non viene assorbito dal tratto gastrointestinale, il rischio potenziale è molto basso. Poiché non esistono dati relativi al periodo di gravidanza, chiedi consiglio al medico prima di prendere Simeicone Angelini.

Allattamento:

Non è nota l'escrezione di simeicone nel latte materno. Tuttavia, poiché simeicone non viene assorbito dal tratto gastrointestinale, il rischio è molto basso. Chiedi consiglio al medico prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Nessun effetto.

Simeicone Angelini contiene saccarosio.

I pazienti diabetici o pazienti a regime dietetico povero di zucchero, devono essere informati che Simeicone Angelini contiene saccarosio (435 mg per compressa).

Se è a conoscenza di essere intollerante verso alcuni zuccheri, contatti il medico prima di prendere Simeicone Angelini.

3. Come Prendere Simeicone Angelini

Prenda sempre questo medicinale seguendo esattamente quanto indicato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 o 2 compresse, tre o quattro volte al giorno per i bambini dai 12 anni in su e di 2 compresse da assumere 4 volte al giorno per gli adulti. Le compresse devono essere masticate e prese dopo i pasti.

La durata del trattamento non deve superare i 10 giorni.

Uso nei bambini

Simeicone Angelini non deve essere assunto dai bambini al di sotto dei 12 anni a causa delle informazioni limitate sulla sua sicurezza.

Se prende più Simeicone Angelini di quanto deve

Chiedi al medico o al farmacista cosa fare.

Se dimentica di prendere Simeicone Angelini

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza di una singola dose.

Se interrompe il trattamento con Simecicone Angelini

Nessun effetto.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista .

4. Possibili Effetti Indesiderati

Come tutti i medicinali, anche questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100): diarrea, dolore addominale, ostruzione intestinale (ileo), nausea o vomito.

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000): ipersensibilità quali eruzione cutanea, prurito edema della faccia e della lingua, difficoltà nella respirazione (almeno 1 caso su 10.000 pazienti). In caso di comparsa di uno o più di questi sintomi, si rivolga al medico o al farmacista per chiedere cosa fare. Non interrompa in nessun caso il trattamento prima di avere chiesto al medico o al farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili". La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Simecicone Angelini

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. *. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Conservare a temperatura inferiore a 30 ° C.

Non usi questo medicinale se nota che il blister è stato danneggiato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione ed altre informazioni

Cosa contiene Simecicone Angelini

Il principio attivo è il simeticone. Ogni compressa masticabile contiene 42 mg di simeticone. Gli eccipienti sono: saccarosio, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato e vanillina.

Descrizione dell'aspetto di Simecicone Angelini e contenuto della confezione

Simecicone Angelini è una compressa masticabile di forma rotonda, biconvessa, di colore giallastro.

Scatole da 20, 50 o 60 compresse.

Non tutte le confezioni potrebbero essere commercializzate

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70
00181 Roma

Produttore

OM PHARMA S. A.
R. da Indústria, 2 - Quinta Grande
2610-088 Amadora - Lisboa – Portugal

Questo medicinale è autorizzato negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Portogallo:	Disflat
Austria:	AeroOM 42 mg Kautabletten
Bulgaria:	Aero-OM
Repubblica Ceca:	AeroOM
Germania:	Aero-OM
Ungheria:	Aero-OM
Olanda:	Aero-OM
Polonia:	Aero-OM
Italia:	Simeticone Angelini

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il dicembre 2016.