

Informazioni per l'utilizzatore

CITROSIL 0,175% spray cutaneo, soluzione  
(benzalconio cloruro)

**Legga attentamente quanto riportato sulla confezione prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto sulla confezione o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questa confezione. Potrebbe aver bisogno di leggerla di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati su questa confezione, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

**Contenuto delle informazioni riportate:**

1. Che cos'è CITROSIL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CITROSIL
3. Come usare CITROSIL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CITROSIL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è CITROSIL e a cosa serve**

Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un'ampia serie di sostanze note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione si esplica sui batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie fungine. Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite superficiali, escoriazioni, abrasioni).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

**2. Cosa deve sapere prima di usare CITROSIL**

**Non usi CITROSIL**

se è allergico al benzalconio cloruro o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

CITROSIL non deve essere somministrato nei bambini di età inferiore a 1 anno.

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CITROSIL.

- Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio.
- L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.
- Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.
- Il prodotto è solo per uso esterno.
- Non usare per trattamenti prolungati. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.
- Non usare per la disinfezione di mucose.

**Altri medicinali e CITROSIL**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità. Durante il periodo di allattamento al seno, evitare l'applicazione del prodotto sul seno per evitare l'ingestione del prodotto da parte del lattante.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **3. Come usare CITROSIL**

Nebulizzare sulla parte da trattare

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato su questa confezione o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulta il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

Se usa più CITROSIL di quanto deve

Alle normali condizioni d'uso non sono stati riportati danni da sovradosaggio. L'ingestione accidentale può provocare nausea e vomito. I sintomi di intossicazione conseguenti all'ingestione di grandi quantità può avere gravi conseguenze come ad esempio problemi respiratori con possibilità di cianosi (ridotto apporto di ossigeno nel sangue), depressione del sistema nervoso, abbassamento della pressione arteriosa e coma.

Se dimentica di usare CITROSIL

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con CITROSIL

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati derivano da segnalazioni spontanee, pertanto non è sempre possibile definirne la frequenza.

E' possibile il verificarsi di intolleranza (bruciore o irritazione) che non richiede modifica di trattamento. Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare CITROSIL**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

Cosa contiene CITROSIL

- Il principio attivo è benzalconio cloruro.
- Gli altri componenti sono: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di CITROSIL e contenuto della confezione  
Flacone da 100 ml.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Società Italo Britannica  
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni  
Via Pellicceria, 8 – 50123 Firenze  
Tel. +39 055 88351  
Fax + 39 055 8835325  
[mail@manetti-roberts.boltongroup.it](mailto:mail@manetti-roberts.boltongroup.it)

**Produttore**

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA s.r.l.  
Via Vicenza, 67  
36015 Schio (VI), Italy  
Tel +39 0445670088  
Fax +390445673537  
[info@sellafarmaceutici.it](mailto:info@sellafarmaceutici.it)

- DOPPEL FARMACEUTICI s.r.l. – Piacenza  
Via Martiri delle Foibe, 1

29016 Cortemaggiore (PC), Italy  
Tel +39 0523 8335200  
Fax +39 0523 8335299  
[info@doppel.it](mailto:info@doppel.it)

Questo testo è stato aggiornato il  
Dicembre 2019