

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### FLUICARE 750 mg/15 ml sciroppo Carbocisteina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FLUICARE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere FLUICARE
3. Come usare FLUICARE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FLUICARE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Che cos'è FLUICARE e a cosa serve

FLUICARE sciroppo è un mucolitico: fluidifica cioè i depositi di muco viscoso nelle vie respiratorie e ne facilita l'eliminazione. FLUICARE sciroppo si usa per il trattamento delle affezioni respiratorie acute caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa (catarro).

#### 2. Cosa deve sapere prima di prendere FLUICARE

##### Non prenda FLUICARE

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- in caso di ulcera gastroduodenale;
- in caso di gravidanza ed allattamento.

##### Avvertenze e precauzioni

L'aumento dell'espettorato, che può osservarsi fin dai primi giorni e che dimostra la lisi delle secrezioni patologiche, si attenua rapidamente. In caso di manifestazioni di ipersensibilità occorre interrompere il trattamento.

Si raccomanda cautela nei pazienti anziani, pazienti asmatici con una storia di problematiche respiratorie gravi, pazienti debilitati, in quelli con una storia di ulcera gastroduodenale e in quelli che stanno assumendo farmaci noti per causare sanguinamento gastrointestinale. Lei deve interrompere il trattamento con carbocisteina in caso di sanguinamento gastrointestinale.

**Questo medicinale non deve essere usato in associazione con sedativi della tosse e/o medicinali che inibiscono la secrezione bronchiale.**

#### Altri medicinali e FLUICARE

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono state riportate interazioni con altri medicinali.

### **Gravidanza e allattamento**

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

FLUICARE sciroppo non deve essere usato durante la gravidanza e l'allattamento. L'uso va anche evitato nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

FLUICARE sciroppo non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **FLUICARE contiene sorbitolo e metile para-idrossibenzoato**

FLUICARE contiene il 64,4% di sorbitolo. Quando assunto ai dosaggi raccomandati ciascuna dose fornisce circa 3 g di sorbitolo.

Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei prenda questo medicinale. Può causare problemi gastrointestinali e avere un lieve effetto lassativo.

FLUICARE contiene metile para-idrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

## **3. Come prendere FLUICARE**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

L'uso di Fluicare sciroppo è riservato agli adulti.

### **Quanto**

2-3 cucchiai al giorno con un intervallo di 8 ore tra una assunzione e l'altra (1 cucchiaio da tavola corrisponde a 15 ml = 750 mg).

Attenzione: non superare le dosi indicate

### **Quando e per quanto tempo**

Fluicare sciroppo può essere assunto indipendentemente dai pasti.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Come**

Fluicare sciroppo si assume per via orale.

### **Se prende più FLUICARE di quanto deve**

A forti dosi, oltre la posologia indicata, si può talvolta avere la comparsa di disturbi gastrointestinali, dolore gastrico, nausea, diarrea.

Non esiste un antidoto specifico: nel caso, è consigliata lavanda gastrica seguita da terapia di supporto specifica.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di FLUICARE avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, FLUICARE può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

- Possono verificarsi:

- vertigini e fenomeni digestivi (gastralgie, nausea, diarrea); in tal caso si consiglia di ridurre la posologia o di interrompere la terapia.
- Anomalie del sangue: leucopenia (riduzione dei globuli bianchi), granulocitopenia (riduzione di alcuni tipi di globuli bianchi), trombocitopenia (riduzione delle piastrine), anemia, generalmente reversibili possono sopravvenire eccezionalmente nei soggetti sulfamidosensibili durante il trattamento con sulfaniluree.
- Irritazioni e malattie della pelle (sindrome di Steven-Johnson; dermatite bollosa; eritema multiforme; eruzione tossica cutanea . (In tali casi interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea).
- Sanguinamento gastrointestinale (in tali casi interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea).

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

*Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se notate la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informate il medico o il farmacista.*

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse](http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare FLUICARE**

Conservare il medicinale a temperatura inferiore ai 25°C.

Dopo la prima apertura del flacone, il prodotto deve essere consumato entro 10 giorni. La quantità eccedente deve essere buttata.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola sia questo foglio illustrativo.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i farmaci che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene FLUICARE**

- Il principio attivo è carbocisteina. 100 mL di sciroppo contengono 5 g di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: aroma lampone, metile para-idrossibenzoato, sorbitolo 70%, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di FLUICARE e contenuto della confezione**

FLUICARE si presenta in forma di Sciroppo.

Il contenuto della confezione è un flacone da 150 ml.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immisione in commercio**

Proge Farm S.r.l.

Largo Donegani 4/A – 28100 Novara

### **Produttore**

Francia Farmaceutici s.r.l – Via Pestegalli, 7 - Milano

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Gennaio 2022**