

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO – ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO COMBINATI

Sacca in PVC da:

3000 ml

4000 ml

Sacca in PVC free da:

500 ml

1000 ml

2000 ml

5000 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Ringer Lattato ACME soluzione per infusione per cavalli, bovini, cani e gatti

2. COMPOSIZIONE

Ogni ml contiene:

Acido lattico mg 2,60 - Sodio idrossido mg 1,17- Sodio cloruro mg 6,00 - Potassio cloruro mg 0,40 - Calcio cloruro mg 0,204 come calcio cloruro biidrato mg 0,27

mEq/l: (Na⁺) 132 - (K⁺) 5 - (Ca⁺) 4 - (Cl⁻) 112- (Lattato come HCO₃⁻) 29.0

mOsm/l (teor.): 280 **pH** 5.5/7.0

Soluzione sterile, apirogena, isotonica, limpida e incolore.

3. CONFEZIONI

500 ml

1000 ml

2000 ml

3000 ml

4000 ml

5000 ml

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cavallo, bovino, cane e gatto

5. INDICAZIONI PER L'USO

Indicazioni per l'uso

Reidratazione nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti; alcalinizzante quando è necessario correggere stati acidotici lievi o moderati.

6. CONTROINDICAZIONI

Controindicazioni

Non usare in animali con insufficienza cardiaca, condizioni associate ad iperkalemia.

Usare con cautela in caso di scompenso cardiaco congestizio, insufficienza renale grave e in stati clinici associati a edemi e ritenzione idrosalina. insufficienza epatica.

Non usare in casi in cui il metabolismo del lattato è gravemente compromesso, come avviene nelle disfunzioni epatiche o negli stati di anossia da shock o scompenso cardiaco.

Non usare in animali con acidosi metabolica grave.

Non usare in animali con alcalosi metabolica grave.

Non usare in concomitanza con trasfusione di sangue, nella stessa via venosa, a causa del rischio di coagulazione.

7. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali

Avvertenze speciali:

Usare per una sola ed ininterrotta somministrazione.

Non riutilizzare residui.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione

Viene consigliata "una somministrazione in vene di grosso calibro a velocità perfusionale controllata". La soluzione rimane nello spazio extracellulare: va, quindi, somministrata con cautela quando vi sia tendenza a ipervolemia come ad esempio nei disturbi cardiaci, renali, epatici.

Usare con cautela in pazienti in trattamento con farmaci ad azione inotropa cardiaca o con farmaci corticosteroidi o corticotropinici.

Monitorizzare il bilancio dei fluidi, gli elettroliti e l'equilibrio acido-base.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Non pertinente.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Non pertinente.

Gravidanza e allattamento:

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio rischio del medico veterinario responsabile

Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione:

Dati non disponibili

Sovradosaggio

Il sovradosaggio può causare sovraccarico cardiovascolare ed edema polmonare che può portare ad irrequietezza, tosse e poliuria. In caso di overdose la velocità di infusione dovrebbe essere drasticamente ridotta o l'infusione interrotta.

Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego:

Non pertinente

Incompatibilità principali

Non miscelare con farmaci a base di bicarbonato, fosfati, solfati e tetracicline.

8. EVENTI AVVERSI

Cavallo, bovino, cane e gatto.

Frequenza indeterminata (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)	Trombosi Flebiti Necrosi tissutale
---	--

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questa etichetta, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati in questa etichetta o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

9. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Uso endovenoso, sottocutaneo, intraperitoneale

Posologia

Cavalli e bovini: 3000 – 30000 ml al giorno

Puledri e vitelli: 1500 – 15000 ml al giorno

Cani: 150 – 3000 ml al giorno

Gatti: 10 – 300 ml al giorno

10. RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Raccomandazioni per una corretta somministrazione

Usare per una sola e ininterrotta somministrazione.

Viene consigliata “una somministrazione in vene di grosso calibro a velocità perfusionale controllata”.

Non riutilizzare residui.

11. TEMPI DI ATTESA

Cavalli e bovini:

Carni e frattaglie: zero giorni

Latte: zero ore

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

Non conservare a temperatura superiore ai 25° C.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla sacca

13. PRECAUZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO

Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato.

Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

14. CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 100351168	Sacca in PVC 500 ml	GTIN 08008448004514
A.I.C. n. 100351156	Sacca in PVC 1000 ml	GTIN 08008448004521
A.I.C. n. 100351067	Sacca in PVC 2000 ml	GTIN 08008448004538
A.I.C. n. 100351079	Sacca in PVC 3000 ml	GTIN 08008448004545
A.I.C. n. 100351081	Sacca in PVC 4000 ml	GTIN 08008448004552
A.I.C. n. 100351093	Sacca in PVC 5000 ml	GTIN 08008448004569

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

16. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DELL'ETICHETTA

Data dell'ultima revisione dell'etichetta

12/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella Banca dati dei medicinali dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

17. RECAPITI

Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

ACME s.r.l.

Via Libero Grassi, 9

IT – 42025 Cavriago (RE) – Italy

Tel. +39 0522941919

email: farmacovigilanza.acme@acmedrugs.com

Fabbricante responsabile del rilascio del lotto
S.A.L.F. S.p.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, Cenate Sotto (BG)

18. ALTRE INFORMAZIONI

19. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO”
--

Solo per uso veterinario

20. DATA DI SCADENZA

Exp. {mm/aaaa}

Dopo la perforazione, usare immediatamente.

21. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}