

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**DI MILL 0,1 mg/ml collirio, soluzione**

Benzalconio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è DI MILL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare DI MILL
3. Come usare DI MILL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DI MILL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è DI MILL e a cosa serve

DI MILL è un collirio contenente benzalconio cloruro, un disinfettante (antibatterico). Questo medicinale si usa per disinfettare l'occhio quando è irritato da polvere, fumo o smog.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare DI MILL**Non usi DI MILL**

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- in bambini al di sotto dei 12 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare DI MILL.

Non usare per trattamenti prolungati; consultare il medico se dopo alcuni giorni di trattamento non nota miglioramenti.

Eviti l'applicazione se ha problemi ad una parte dell'occhio chiamata "cornea" (infiammazioni, ferite o abrasioni corneali).

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale (topico) può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell'organismo a sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso **interrompa il trattamento** e consulti il medico per iniziare una terapia adatta.

L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta mortali (vedere paragrafo 3 "Se usa più DI MILL di quanto deve"). **In caso di ingestione accidentale consulti immediatamente un medico.**

Il prodotto è solo per uso esterno e quindi non deve essere ingerito.

Il principio attivo di questo medicinale, benzalconio cloruro, può causare irritazione agli occhi.

Altri medicinali e DI MILL

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di altri disinfettanti e detergenti.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

DI MILL contiene benzalconio cloruro (Vedere paragrafo “Avvertenze e precauzioni”)

Questo medicinale contiene 0,006 mg di benzalconio cloruro per dose equivalente a 0,1 mg/ml.

Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.

Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.

3. Come usare DI MILL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 2 gocce in ciascun occhio da instillare 2 o 3 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Per un uso corretto:

Durante l'instillazione eviti di toccare gli occhi con la punta del contagocce di questo medicinale.

Non usi questo medicinale mentre indossa le lenti a contatto.

Eviti il contatto con **lenti a contatto morbide**. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle.

È nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

Se usa più DI MILL di quanto deve

Alle dosi raccomandate e in caso di uso corretto (instillazione nell'occhio), non sono noti sintomi da sovradosaggio.

In caso di ingestione accidentale si possono manifestare nausea e vomito.

Se ha ingerito accidentalmente questo medicinale **avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale** perché può andare incontro a gravi conseguenze come:

- difficoltà o blocco della capacità di respirare (dispnea, cianosi, asfissia) per il blocco dei muscoli che permettono la respirazione;
- depressione del sistema nervoso centrale;
- abbassamento della pressione sanguigna (arteriosa);
- coma.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Questo medicinale può causare sensazione di bruciore e irritazione degli occhi (intolleranza). Questi sintomi non devono preoccupare, perché sono privi di conseguenze.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web:

https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse_

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare DI MILL

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale NON può essere usato oltre 15 giorni dopo la prima apertura.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo “Scad.”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene DI MILL

- Il principio attivo è benzalconio cloruro. 1 ml di collirio contiene 0,1 mg di benzalconio cloruro.
- Gli altri componenti sono sodio cloruro, acqua distillata sterile di *Matricaria Chamomilla* e di *Hamamelis Virginiana*, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di DI MILL e contenuto della confezione

DI MILL si presenta come una soluzione in un flacone da 10 ml con beccuccio contagocce.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Produttore

Bruschettini S.r.l. – Via Isonzo, 6 – 16147 Genova.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il gennaio 2022