

**TOCALFA**  
**Vitamina A + E**  
**50.000 U.I. + 50 mg**  
**Capsule molli**  
**Associazione di vitamine liposolubili**

**COMPOSIZIONE:**

1 capsula molle da g 0,271 contiene: *Principi attivi:* Retinolo esteri soluz. conc. U.I. 50.000, d,l Alfa-Tocoferil acetato mg 50; *Eccipienti:* olio per preparazioni iniettabili, gelatina, glicerolo, etile p-idrossibenzoato sodico, propile p-idrossibenzoato sodico.

**FORMA FARMACEUTICA:**

Capsule molli - scatola da 20.

**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA:**

Associazione di vitamine liposolubili.

**TITOLARE AIC**

Difa Cooper S.p.A.

Via Milano 160

21042 Caronno Pertusella (VA)

**PRODOTTO, CONTROLLATO E CONFEZIONATO DA:**

Catalent Italy S.p.A.

Via Nettunense Km 20,100 Aprilia Latina

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**

Condizioni associate a stati carenziali di Vitamina A ed E.

**CONTROINDICAZIONI:**

Ipersensibilità nota verso i componenti.

**PRECAUZIONI PER L'USO:**

Al fine di evitare la comparsa di segni e sintomi di iperdosaggio impiegare il prodotto per il periodo di tempo ritenuto strettamente necessario. Le preparazioni contenenti vitamina E debbono essere usate con attenzione nei diabetici e nei soggetti con insufficienza cardiaca, poiché questa vitamina può ridurre il fabbisogno di insulina e di digitale.

#### AVVERTENZE:

Dosi molto elevate di vitamina A negli animali sono teratogene e sono state associate in casi isolati a malformazioni nell'uomo. Quantitativi giornalieri di vitamina A più elevati di 10.000 U.I. vanno evitati in gravidanza (specie nei primi mesi) e si deve consultare il medico per i consigli circa la quantità totale di vitamina A assumibile attraverso diverse fonti. Il prodotto, contenendo vitamina A ad alte dosi, non deve, pertanto, essere utilizzato in corso di gravidanza.

Il prodotto può essere assunto senza rischio dai pazienti affetti da celiachia.

#### POSOLOGIA:

1-2 capsule molli al giorno.

Frequenza della somministrazione: cicli di 30-90 giorni intervallati da opportuni periodi di sospensione. Il ciclo terapeutico può essere ripetuto durante l'anno in caso di necessità.

Durata del trattamento: nelle terapie molto prolungate, specie se per diversi anni, non eccedere nel numero e nella durata dei cicli terapeutici per ogni anno, allo scopo di non incorrere nel rischio di iperdosaggio cronico da vitamina A.

#### EFFETTI INDESIDERATI:

Il prodotto utilizzato alle dosi consigliate è in genere ben tollerato; solo in caso di somministrazione continua e ad alte dosi possono comparire segni e sintomi di ipervitaminosi A (anoressia, epatosplenomegalia, turbe cutanee, ecc.). In caso di comparsa di effetti indesiderati diversi da quelli precedentemente descritti, comunicarlo al proprio medico o farmacista.

**ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.**

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Approvato nel luglio 1996 dal Ministero della Sanità.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: Maggio 2022